





LIOTECA LUCCHESI - PALLI

III. SALA

1

VIII

9

SCAFFALE.....

PLUTEO.....

N.° CATENA.....

LIOTECA ·
ESI · PALLI ·



Gr. Sala I. VIII. 9

101 VIII 9



OPERE
DI
GALILEO GALILEI.

3

OPERE

DI

GALILEO GALILEI

NOBILE FIORENTINO.

VOLUME NONO.



MILANO

Dalla Società Tipografica de' CLASSICI ITALIANI
contrada del Cappuccio,
ANNO 1811.



GIORNATA QUARTA.



Salv. **A** tempo arriva ancora il Signor Simpl. però senza interpor quiete venghiamo al moto, ed ecco il Testo del nostro Autore.

DE MOTU PROJECTORUM.

Quæ in motu æquabili contingunt decidentia, itemque in motu naturaliter accelerato super quascunque planorum inclinationes, supra consideravimus. In hac, quam modo aggredior, contemplatione, præcipua quædam symptomata, eaque scitu digna in medium afferre conabor, eademque firmis demonstrationibus stabilire,

quæ mobili accidunt dum motu ex duplici latione composito, æquabili nempe, et naturaliter accelerato, movetur: hujusmodi autem videtur esse motus ille, quem de projectis dicimus; cujus generationem talem constituo.

Mobile quoddam super planum horizontale projectum mente concipio omni secluso impedimento: jam constat ex his, quæ fusius alibi dicta sunt, illius motum æquabilem, et perpetuum super ipso plano futurum esse, si planum in infinitum extendatur: si vero terminatum, et in sublimi positum intelligamus, mobile, quod gravitate præditum concipio, ad plani terminum delatum, ulterius progrediens, æquabili, atque indelebili priori lationi superaddet illam, quam a propria gravitate habet deorsum propensionem, indeque motus quidam emerget compositus ex æquabili horizontali, et ex deorsum naturaliter accelerato, quem projectionem voco. Cujus accidentia nonnulla demonstrabimus; quorum primum sit.

THEOR. I. PROP. I.

Projectum dum fertur motu composito ex horizontali aequabili, et ex naturaliter accelerato deorsum, lineam semiparabolicam describit in sua latione.

Sagr. È forza, Sig. Salviati, in grazia di me, ed anco credo io del Sig. Simplicio far qui un poco di pausa; conciossiachè io non mi son tanto inoltrato nella Geometria, ch'io abbia fatto studio in Apollonio, se non in quanto so, ch'ei tratta di queste Parabole, e dell'altre sezioni coniche, senza la cognizione delle quali, e delle lor passioni, non credo, che intendere si possano le dimostrazioni di altre proposizioni a quelle aderenti. E perchè già nella bella prima proposizione ci vien proposto dall'Autore doversi dimostrare la linea descritta dal Progetto esser Parabolica, mi vo immaginando, che non dovendosi trattar di altro, che di tali linee, sia assolutamente necessario avere una perfetta intelligenza, se non di tutte le passioni di tali figure dimostrate da Apollonio, almeno di quelle, che per la presente scienza son necessarie.

Salv. V. S. si umilia molto, volendosi far nuovo di quelle cognizioni, le quali non è gran tempo, che ammesse come ben sapute: allora dico, che nel trattato delle Resistenze avemmo bisogno della notizia di certa proposizione di Apollonio, sopra la quale ella non mi mosse difficoltà.

Sagr. Può essere o che io la sapessi per ventura, o che io la supponessi per una volta tanto, che ella mi bisognò in tutto quel trattato: ma qui dove mi immagino di avere a sentir tutte le dimostrazioni circa tali linee, non bisogna, come si dice, bever grosso, buttando via il tempo, e la fatica.

Simp. E poi rispetto a me, quando bene, come credo, il Sig. Sagredo fusse ben corredato di tutti i suoi bisogni, a me cominciano già a giugner come nuovi gli stessi primi termini: perchè sebbene i nostri Filosofi hanno trattata questa materia del Moto de' Progetti, non mi sovvien, che si siano ristretti a definire, quali sieno le linee da quelli descritte, salvo che assai generalmente sien sempre linee curve, eccetto che nelle proiezioni perpendicolari sursum. Però quando quel poco di Geometria, che io ho appreso da Euclide da quel tempo in qua, che noi avemmo altri discorsi, non sia bastante per rendermi capace delle cognizioni necessarie per l'intelligenza delle seguenti dimostrazioni, mi

converrà contentarmi delle sole proposizioni credute, ma non sapute.

Salv. Anzi voglio io, che le sappiate mercè dell'istesso Autor dell'opera, il quale quando già mi concedè di veder questa sua fatica, perchè io ancora in quella volta non aveva in pronto i libri di Apollonio, s'ingegnò di dimostrarmi due passioni principalissime di essa Parabola senza veruna altra precognizione, delle quali sole siamo bisognosi nel presente trattato; le quali son bene anco provate da Apollonio, ma dopo molte altre, che lungo sarebbe a vederle; ed io voglio, che abbreviamo assai il viaggio, cavando la prima immediatamente dalla pura, e semplice generazione di essa Parabola, e da questa poi pure immediatamente la dimostrazione della seconda. Venendo dunque alla prima:

Intendasi il cono retto, la cui base sia il cerchio $I B K C$ (Fig. 1.), e vertice il punto L , nel quale, segato con un piano parallelo al lato $L K$, nasca la sezione $B A C$ detta Parabola; la cui base $B C$ seghi ad angoli retti il diametro $I K$ del cerchio $I B K C$, e sia l'asse della Parabola $A D$ parallelo al lato $L K$; e preso qualsivoglia punto F nella linea $B F A$, tirisi la retta $F E$ parallela alla $B D$. Dico, che il quadrato della $B D$ al quadrato della $F E$ ha la medesima proporzione, che l'asse $D A$ alla parte $A E$. Per lo punto E intendasi passare un piano parallelo al

cerchio I B K C, il quale farà nel cono una sezione circolare, il cui diametro sia la linea G E H. E perchè sopra il diametro I K del cerchio I B K la B D è perpendicolare, sarà il quadrato della B D eguale al rettangolo fatto dalle parti I D, D K. E parimente nel cerchio superiore, che s'intende passare per i punti G F H, il quadrato della linea F E è eguale al rettangolo delle parti G E H. Adunque il quadrato della B D al quadrato della F E ha la medesima proporzione, che il rettangolo I D K al rettangolo G E H. E perchè la linea E D è parallela alla H K, sarà la E H eguale alla D K, che pur son parallele: e però il rettangolo I D K al rettangolo G E H avrà la medesima proporzione, che la I D alla G E, cioè, che la D A alla A E: adunque il rettangolo I D K al rettangolo G E H, cioè il quadrato B D al quadrato F E ha la medesima proporzione, che l'asse D A alla parte A E, che bisognava dimostrare.

L'altra proposizione pur necessaria al presente trattato così faremo manifesta. Seguiamo la Parabola, della quale sia prolungato fuori l'asse C A (Fig. 11.) in D, e preso qualsivoglia punto B, per esso intendasi prodotta la linea B C parallela alla base di essa Parabola. E posta la D A eguale alla parte dell'asse C A, dico, che la retta tirata per i punti D, B, non cade dentro alla Parabola, ma fuori, sicchè so-

lamente la tocca nell'istesso punto B. Imperocchè, se è possibile, caschi dentro segandola sopra, o prolungata segandola sotto. Ed in essa sia preso qualsivoglia punto G, per lo quale passi la retta F G E. E perchè il quadrato F E è maggiore del quadrato G E, maggior proporzione avrà esso quadrato F E al quadrato B C, che il quadrato G E al medesimo B C. E perchè per la precedente il quadrato F E al quadrato B C sta come la E A alla A C, adunque maggior proporzione ha la E A alla A C, che il quadrato G E al quadrato B C, cioè che il quadrato E D al quadrato D C (essendochè nel triangolo D G E come la G E alla parallela B C, così sta E D a D C.) ma la linea E A alla A C, cioè alla A D, ha la medesima proporzione, che 4 rettangoli E A D a 4 quadrati di A D, cioè al quadrato C D (che è eguale a 4 quadrati di A D) adunque 4 rettangoli E A D al quadrato C D avranno maggior proporzione, che il quadrato E D al quadrato D C; adunque 4 rettangoli E A D saranno maggiori del quadrato E D: il che è falso, perchè son minori: imperocchè le parti E A, A D della linea E D non sono eguali. Adunque la linea D B tocca la Parabola in B, e non la sega; il che si doveva dimostrare.

Simpl. Voi procedete nelle vostre dimostrazioni troppo alla grande; ed andate sempre, per quanto mi pare, supponendo,

che tutte le proposizioni di Euclide mi sian così familiari e pronte, come gli stessi primi assiomi, il che non è. E pur ora l'uscirmi addosso, che 4 rettangoli $E A D$ son minori del quadrato $D E$, perchè le parti $E A$, $A D$ della linea $E D$ non sono eguali, non mi quieto, ma mi lascia sospeso.

Sale. Veramente tutti i Matematici non vulgari suppongono, che il lettore abbia prontissimi almeno gli Elementi di Euclide: e qui per supplire al vostro bisogno basterà ricordarvi una proposizione del secondo, nella quale si dimostra, che quando una linea è segata in parti eguali, ed in diseguali, il rettangolo delle parti diseguali è minore del rettangolo delle parti eguali (cioè, del quadrato della metà) quanto è il quadrato della linea compresa tra i segmenti. Onde è manifesto, che il quadrato di tutta, il quale contiene 4 quadrati della metà, è maggiore di 4 rettangoli delle parti diseguali. Ora di queste due proposizioni dimostrate, prese dagli Elementi Conici, conviene, che tenghiamo memoria, per l'intelligenza delle cose seguenti nel presente trattato: che di queste sole, e non di più si serve l'Autore. Ora possiamo ripigliare il testo per vedere in qual maniera ci vien dimostrando la sua prima proposizione, dove egli intende di provarci la linea descritta dal mobile grave, che mentre ci discende con moto compo-

sto dell'equabile orizzontale, e del naturale
descendente, sia una Semiparabola.

Intelligatur horizontalis linea, seu planum $A B$ (Fig. III.) in sublimi positum: super quo ex A in B motu æquabili feratur mobile: deficiente vero plani fulcimento in B superveniat ipsi mobili a propria gravitate motus naturalis deorsum juxta perpendicularem $B N$. Intelligatur insuper plano $A B$ in directum posita linea $B E$, tanquam temporis effluxus, seu mensura, super qua ad libitum notentur partes quotlibet temporis æquales, $B C$, $C D$, $D E$, atque ex punctis B , C , D , E , intelligantur productæ lineæ perpendiculo $B N$ æquidistantes: in quarum prima accipiatur quælibet pars $C I$; cujus quadrupla sumatur in sequenti $D F$, nonupla $E H$, et consequenter in reliquis secundum rationem quadratorum ipsarum, $C B$, $D B$, $E B$, seu dicamus, in ratione earundem linearum duplicata. Quod si mobili ultra B versus C æquabili latione lato descensum perpendicularem secundum quantitatem $C I$ superadditum intelligamus, reperietur tempore $B C$ in termino I constitutum. Ulterius autem procedendo, tempore $D B$, duplo scilicet $B C$, spatium descensus deorsum erit spatii primi $C I$ quadruplum; demonstratum enim est in primo tractatu, spatia peracta a gravi motu naturaliter accelerato esse in duplicata ratione temporum. Pariterque consequenter spatium $E H$ peractum

tempore BE erit ut g adeo ut manifeste constet, spatia EH , DF , CI , esse inter se ut quadrata linearum EB , DB , CB . Ducantur modo a punctis I , F , H , rectæ IO , FG , HL , ipsi EB æquidistantes; erunt HL , FG , IO lineæ lineis EB , DB , CB , singulæ singulis æquales; nec non ipsæ BO , BG , BL ipsis CI , DF , EH æquales. Eritque quadratum HL ad quadratum FG , ut linea LB ad BG ; et quadratum FG ad quadratum IO , ut GB ad BO . Ergo puncta I , F , H , sunt in una eademque linea Parabolica. Similiter quo demonstrabitur, assumptis quibuscunque temporis particulis æqualibus cujuslibet magnitudinis, loca mobilis simili motu composito lati iisdem temporibus in eadem linea parabolica reperiri. Ergo patet propositum.

Salv. Questa conclusione si raccoglie dal converso della prima delle due proposizioni poste di sopra: imperocchè descritta per esempio la Parabola per li punti B , H , se alcuno delli due F , I non fusse nella descritta linea parabolica, sarebbe dentro, o fuori; e per conseguenza la linea FG sarebbe o minore, o maggiore di quella, che andasse a terminare nella linea Parabolica: onde il quadrato della HL non al quadrato della FG ; ma ad altro maggiore, o minore avrebbe la medesima proporzione, che ha la linea LB alla BG , ma la ha al quadrato della FG ; adunque

il punto F è nella Parabolica ; e così tutti gli altri , ec.

Sagr. Non si può negare , che il discorso non sia nuovo , ingegnoso , e concludente , argomentando *ex suppositione* , supponendo cioè che il moto trasversale si mantenga sempre equabile , e che il naturale *deorsum* parimente mantenga il suo tenore di andarsi sempre accelerando secondo la proporzion duplicata dei tempi : e che tali moti , e loro velocità nel mescolarsi non si alterino , perturbino , ed impediscano , sicchè finalmente la linea del progetto non vada nella continuazion del moto a degenerare in un'altra specie ; cosa , che mi si rappresenta come impossibile. Imperocchè , stante che l'asse della Parabola nostra , secondo il quale noi supponghiamo farsi il moto naturale dei gravi , essendo perpendicolare all' Orizzonte , va a terminar nel centro della Terra , ed essendo che la linea Parabolica si va sempre allargando dal suo asse , niun progetto andrebbe giammai a terminar nel centro , o se vi andrebbe , come par necessario , la linea del progetto tralignerebbe in altra diversissima dalla Parabolica.

Simp. Io a queste difficoltà ne aggiungo dell' altre : una delle quali è , che noi supponghiamo , che il piano orizzontale , il quale non sia nè acclive , nè declive , sia una linea retta ; quasi che una simil linea sia in tutte le sue parti egualmente

distante dal centro; il che non è vero; perchè partendosi dal suo mezzo va verso le estremità sempre più, e più allontanandosi dal centro, e però ascendendo sempre; il che si tira in conseguenza esser impossibile, che il moto si perpetui, anzi che nè pur per qualche spazio si mantenga equabile, ma ben sempre vada languendo. In oltre è per mio credere impossibile lo schivar l'impedimento del mezzo, sicchè non levi l'equabilità del moto trasversale, e la regola dell'accelerazione nei gravi cadenti. Dalle quali tutte difficoltà si rende molto improbabile, che le cose dimostrate con tali supposizioni incostanti possano poi nelle praticate esperienze verificarsi.

Salv. Tutte le promosse difficoltà, e istanze son tanto ben fondate, che stimo essere impossibile il rimuoverle; ed io per me le ammetto tutte, come anco credo, che il nostro Autore esso ancora le ammetterebbe. E concedo, che le conclusioni così in astratto dimostrate si alterino in concreto, e si falsifichino a segno tale, che nè il moto trasversale sia equabile, nè l'accelerazione del naturale sia colla proporzione supposta, nè la linea del progetto sia Parabolica, ec. Ma bene all'incontro domando, che elle non contendano al nostro Autor medesimo quello, che altri grandissimi uomini hanno supposto, ancorchè falso. E la sola autorità di Archimede può quietare ogn'uno: il quale nelle sue Mec,

caniche, e nella prima quadratura della Parabola piglia come principio vero, l'ago della bilancia, o stadera essere una linea retta in ogni suo punto egualmente distante dal centro comune dei gravi; e le corde alle quali sono appesi i gravi esser tra di loro parallele. La qual licenza viene da alcuni scusata, perchè nelle nostre pratiche gli strumenti nostri, e le distanze, le quali vengono da noi adoperate, son così piccole in comparazione della nostra gran lontananza dal centro del globo terrestre, che ben possiamo prendere un minuto di un grado del cerchio massimo, come se fusse una linea retta, e due perpendicoli, che dai suoi estremi pendessero, come se fossero paralleli. Che quando nelle opere pratiche si avesse a tener conto di simili minuzie, bisognerebbe cominciare a riprendere gli Architetti, li quali col perpendicolo suppongono di alzar le altissime torri tra linee equidistanti. Aggiungo qui, che noi possiamo dire, che Archimede, e gli altri supposero nelle loro contemplazioni esser costituiti per infinita lontananza remoti dal centro: nel qual caso i loro assunti non erano falsi; e che però concludevano con assoluta dimostrazione. Quando poi noi vogliamo praticare in distanza terminata le conclusioni dimostrate, col suppor lontananza immensa, dobbiamo difalcar dal vero dimostrato quello, che impor-

ta il non esser stata la lontananza dal centro realmente infinita, ma ben tale, che domandar si può immensa in comparazione della piccolezza degli artificj praticati da noi, il maggior dei quali sarà il tiro dei Progetti, e di questi quello solamente dell' Artiglierie; il quale per grande che sia non passerà 4. miglia di quelle, delle quali noi siamo lontani dal centro quasi altrettante migliaja; ed andando questi a terminar nella superficie del globo terrestre, ben potranno solo insensibilmente alterar quella figura parabolica, la quale si concede, che sommamente si trasformerebbe nell' andare a terminar nel centro. Quanto poi al perturbamento procedente dall' impedimento del mezzo, questo è più considerabile, e per la sua tanto moltiplice varietà incapace di poter sotto regole ferme esser compreso, e datone scienza; attesochè, se noi metteremo in considerazione il solo impedimento, che arreca l' aria ai moti considerati da noi, questo si troverà perturbargli tutti, e perturbargli in modi infiniti, secondo che in infiniti modi si variano le figure, le gravità, e le velocità dei mobili Imperocchè quanto alla velocità, secondo che questa sarà maggiore, maggiore sarà il contrasto fattogli dall' aria, la quale anco impedirà più i mobili, secondo che saranno men gravi: talchè sebbene il grave discendente dovrebbe andare accelerandosi in duplicata proporzione del-

la durazion del suo moto; tuttavia per gravissimo che fusse il mobile, nel venir da grandissime altezze, sarà tale l'impedimento dell'aria, che gli torrà il poter crescere più la sua velocità, e lo ridurrà ad un moto uniforme, ed equabile: e questa adeguazione tanto più presto, ed in minori altezze si otterrà, quanto il mobile sarà men grave. Quel moto anco, che nel piano orizzontale, rimossi tutti gli altri ostacoli, dovrebbe essere equabile, e perpetuo, verrà dall'impedimento dell'aria alterato, e finalmente fermato: e qui ancora tanto più presto, quanto il mobile sarà più leggero. Dei quali accidenti di gravità, di velocità, ed anco di figura, come variabili in modi infiniti, non si può dar ferma scienza. E però per poter scientificamente trattar cotal materia bisogna astrar da essi, e ritrovate, e dimostrate le conclusioni astratte dagl'impedimenti servircene nel praticarle con quelle limitazioni, che l'esperienza ci verrà insegnando. E non però piccolo sarà l'utile, perchè le materie, e lor figure saranno elette le men soggette agl'impedimenti del mezzo: quali sono le gravissime, e le rotonde: e gli spazj, e le velocità per lo più non saranno sì grandi, che le loro esorbitanze non possano con facil tara esser ridotte a segno. Anzi pure nei Progetti praticabili da noi, che sieno di materie gravi, e di figura rotonda, ed anco di materie men gravi, e di figura

cilindrica, come frecce, lanciati con frombe, o archi, insensibile sarà del tutto lo svaro del lor moto dall'esatta figura Parabolica. Anzi (e voglio pigliarmi alquanto più di licenza) che negli artifizi da noi praticabili la piccolezza loro renda pochissimo notabili gli esterni, ed accidentari impedimenti, tra i quali quello del mezzo è il più considerabile, vi posso io con due esperienze far manifesto. Io farò considerazione sopra i movimenti fatti per l'aria, che tali son principalmente quelli dei quali noi parliamo, contro i quali essa aria in due maniere esercita la sua forza. L'una è coll'impedir più i mobili men gravi, che i gravissimi. L'altra è nel contrastar più alla velocità maggiore, che alla minore dell'istesso mobile. Quanto al primo; il mostrarci l'esperienza, che due palle di grandezza eguali, ma di peso l'una 10, o 12 volte più grave dell'altra, quali sarebbero per esempio una di piombo, e l'altra di rovere, scendendo dall'altezza di 150, e 200 braccia con pochissima differente velocità arrivano in terra, ci rende sicuri, che l'impedimento, e ritardo dell'aria in amendue è poco; che se la palla di piombo partendosi nell'istesso momento da alto coll'altra di legno, poco fusse ritardata, e questa molto, per assai notabile spazio dovrebbe il piombo nell'arrivare in terra lasciarsi addietro il legno, mentre è 10 volte più grave; il

che tuttavia non accade, anzi la sua anticipazione non sarà nè anco la centesima parte di tutta l'altezza. E tra una palla di piombo, ed una di pietra, che di quella pesasse la terza parte, o la metà, appena sarebbe osservabile la differenza del tempo delle lor giunte in terra. Ora perchè l'impeto, che acquista una palla di piombo nel cadere da un'altezza di 200 braccia (il quale è tanto, che continuandolo in moto equabile scorrerebbe braccia 400. in tanto tempo quanto fu quello della sua scesa) è assai considerabile rispetto alle velocità, che noi con archi, o altre macchine conferiamo a i nostri Progetti (trattone gl'impeti dipendenti dal fuoco) possiamo senza errore notabile concludere, e reputar come assolutamente vere le proposizioni, che si dimostreranno senza il riguardo dell'alterazion del mezzo. Circa poi all'altra parte, che è di mostrare, l'impedimento, che l'istesso mobile riceve dall'aria, mentre egli con gran velocità si muove, non esser grandemente maggiore di quello, che gli contrasta nel muoversi lentamente, ferma certezza ce ne porge la seguente esperienza. Suspendasi da due fili egualmente lunghi, e di lunghezza di 4, o 5 braccia due palle di piombo eguali; e attaccati i detti fili in alto si rimuovano amendue le palle dallo stato perpendicolare; ma l'una si allontani per 80, o più gradi, e l'altra non più che 4, o 5; sicchè lasciate in libertà

l'una scenda, e trapassando il perpendicolo descriva archi grandissimi di 160, 150, 140 gradi, ec. diminuendogli appoco appoco: ma l'altra scorrendo liberamente passi archi piccoli di 10, 8, 6, ec. diminuendogli essa ancora appoco appoco. Qui primieramente dico, che in tanto tempo passerà la prima li suoi gradi 180, 160, ec. in quanto l'altra li suoi 10, 8, ec. Dal che si fa manifesto, che la velocità della prima palla sarà 16, e 18 volte maggiore della velocità della seconda; sicchè quando la velocità maggiore più dovesse essere impedita dall'aria, che la minore, più rade devriano esser le vibrazioni negli archi grandissimi di 180, o 160 gradi, ec. che nei piccolissimi di 10, 8, 4, ed anco di 2, e di 1; ma a questo repugna l'esperienza: imperocchè, se due compagni si metteranno a numerare le vibrazioni, l'uno le grandissime, e l'altro le piccolissime, vedranno, che ne numereranno non pur le decine, ma le centinaia ancora, senza discordar di una sola, anzi di un sol punto. E questa osservazione ci assicura congiuntamente delle due proposizioni, cioè che le massime, e le minime vibrazioni si fanno tutte a una a una sotto tempi eguali, e che l'impedimento, e ritardamento dell'aria non opera più nei moti velocissimi, che nei tardissimi; contro a quello, che pur dianzi pareva, che noi ancora comunemente giudicassimo..

Sagr. Anzi, perchè non si può negare, che l'aria impedisca questi, e quelli, poichè e questi, e quelli vanno languendo, e finalmente finiscono, convien dire, che tali ritardamenti si facciano colla medesima proporzione nell'una, e nell'altra operazione. Ma che? L'aver a far maggior resistenza una volta, che un'altra, da che altro procede egli, fuor che dall'essere assalito una volta con impeto, e velocità maggiore, ed un'altra con minore? E se questo è, la quantità medesima della velocità del mobile è cagione, ed insieme misura della quantità della resistenza. Adunque tutti i moti, siano tardi, o veloci, son ritardati e impediti coll'istessa proporzione; notizia pare a me non disprezzabile.

Salv. Possiam per tanto anco in questo secondo caso concludere, che le fallacie nelle conclusioni, le quali astraendo dagli accidenti esterni si dimostreranno, sieno negli artifizi nostri di piccola considerazione, rispetto ai moti di gran velocità, dei quali per lo più si tratta, ed alle distanze, che non sono se non piccolissime in relazione alla grandezza del semidiametro, e dei cerchi massimi del globo terrestre.

Simp. Io volentieri sentirei la cagione per la quale V. S. sequestra i Progetti dall'impeto del fuoco, cioè, come credo, dalla forza della polvere, dagli altri progetti con frombe, archi, o balestre, circa il

non essere nell'istesso modo soggetti all'alterazione, ed impedimento dell'aria.

Salv. Muovemi l'eccessiva, e per modo di dire, furia soprannaturale, colla quale tali progetti vengono cacciati; che bene anco fuori d'iperbole mi par, che la velocità, colla quale vien cacciata la palla fuori di un moschetto, o di una artiglieria, si possa chiamar soprannaturale. Imperocchè scendendo naturalmente per l'aria da qualche altezza immensa una tal palla, la velocità sua mercè del contrasto dell'aria non si andrà accrescendo perpetuamente: ma quello, che nei cadenti poco gravi si vede in non molto spazio accadere, dico di ridursi finalmente a un moto equabile, accaderà ancora dopo la scesa di qualche migliaja di braccia in una palla di ferro, o di piombo, e questa terminata, ed ultima velocità si può dire esser la massima, che naturalmente può ottener tal grave per aria; la qual velocità io reputo assai minor di quella, che alla medesima palla viene impressa dalla polvere accesa. Del che una assai acconcia esperienza ci può render cauti. Sparisi da un'altezza di cento, o più braccia un archibuso con palla di piombo, all'ingiù perpendicolarmente sopra un pavimento di pietra; e col medesimo si tiri contro una simil pietra in distanza di un braccio o due, e vedasi poi qual delle due palle si trovi esser più ammaccata: imperocchè se la venuta da

alto si troverà meno schiacciata dell'altra, sarà segno, che l'aria gli avrà impedita, e diminuita la velocità conferitagli dal fuoco nel principio del moto; e che per conseguenza una tanta velocità non gli permetterebbe l'aria, che ella guadagnasse giammai venendo da quanto si voglia sublime altezza: che quando la velocità impressagli dal fuoco non eccedesse quella, che per se stessa naturalmente scendendo potesse acquistare, la botta all'ingiù dovrebbe più tosto esser più valida, che meno. Io non ho fatto tale esperienza, ma inclino a credere, che una palla di archibuso, o di artiglieria cadendo da un'altezza quanto si voglia grande, non farà quella percossa, che ella fa in una muraglia in lontananza di poche braccia, cioè di così poche, che il breve sdrucito, o vogliam dire scissura da farsi nell'aria, non basti a levar l'eccesso della furia soprannaturale impressagli dal fuoco. Questo soverchio impeto di simili tiri sforzati può cagionar qualche deformità nella linea del progetto; facendo il principio della Parabola meno inclinato, o curvo del fine. Ma questo poco, o niente può esser di pregiudizio al nostro Autore nelle praticabili operazioni: tra le quali principale è la composizione di una Tavola per i tiri, che dicono di Volata, la quale contenga le lontananze delle cadute delle palle tirate secondo tutte le diverse elevazioni. E perchè tali proiezioni si fanno

con Mortari, e con non molta carica; in questi non essendo soprannaturale l'impeto, i tiri segnano le lor linee assai esattamente.

Ma intanto procediamo avanti nel trattato, dove l'Autore ci vuole introdurre alla contemplazione, e investigazione dell'impeto del mobile, mentre si muove con moto composto di due. E prima del composto di due equabili, l'uno orizzontale, e l'altro perpendicolare.

THEOR. II. PROP. II.

Si aliquod mobile duplici motu æquali moveatur, nempe horizontali, et perpendiculi, impetus, seu momentum lationis ex utroque motu compositæ erit potentia æqualis ambobus momentis priorum motuum.

Moveatur enim aliquod mobile æqualiter duplici latione: et motioni perpendiculi respondeat spatium A B (Fig. IV.); lationi vero horizontali eodem tempore confectæ respondeat B C. Cum igitur per motus æquabiles conficiantur eodem tempore spatia A B, B C, erunt harum lationum momenta inter se, ut ipsæ A B, B C. Mobile vero, quod secundum hasce duas mu-

tationes movetur, describit diagonalem A C, erit momentum suæ velocitatis ut A C. Verum A C potentia æquatur ipsis A B, B C; ergo momentum compositum ex utrisque momentis A B, B C, est potentia tantum illis simul sumtis æquale; quod erat ostendendum.

Simp. È necessario levarmi un poco di scrupolo, che qui mi nasce, parendomi, che questo, che ora si conclude, repugni ad un'altra proposizione del trattato passato; nella quale si affermava, l'impeto del mobile venente dall' A in B essere eguale al venente dall' A in C, ed ora si conclude l'impeto in C esser maggiore, che in B.

Salv. Le proposizioni Sig. Simpl. sono amendue vere, ma molto diverse tra di loro. Qui si parla di un sol mobile mosso di un sol moto, ma composto di due, amendue equabili; e là si parla di due mobili mossi di moti naturalmente accelerati, uno per la perpendicolare A B, e l'altro per l'inclinata A C. In oltre i tempi qui vi non si suppongono eguali, ma il tempo per l'inclinata A C è maggiore del tempo per la perpendicolare A B; ma nel moto, del quale si parla al presente, i moti per le A B, B C, A C, s'intendono equabili, e fatti nell'istesso tempo.

Simp. Mi scusino, e seguano avanti, che resto acquietato.

Salv. Seguita l'Autore per incamminarci a intender quel, che accaggia intor-

no all' impeto di un mobile, mosso pur di un moto composto di due, uno cioè orizzontale, ed equabile, e l'altro perpendicolare, ma naturalmente accelerato, dei quali finalmente è composto il moto del progetto, e si descrive la linea Parabolica; in ciaschedun punto della quale si cerca di determinare quanto sia l' impeto del Progetto: per la cui intelligenza ci dimostra l' Autore il modo, o vogliamo dir metodo di regolare, e misurar cotale impeto sopra l' istessa linea, nella quale si fa il moto del grave discendente con moto naturalmente accelerato partendosi dalla quiete: dicendo:

THEOR. III. PROP. III.

Fiat motus per lineam AB (Fig. v.) ex quiete in A , et accipiat in ea quodlibet punctum C ; et ponatur ipsamet AC esse tempus, seu temporis mensura casus ipsius per spatium AC , nec non mensura quoque impetus, seu momenti in puncto C ex descensu AC acquisiti. Modo sumatur in eadem linea AB quodcunque aliud punctum, ut puta B in quo determinandum est de impetu acquisito a mobili per descensum AB , in ratione ad impetum, quem obtinuit in C , cujus mensura posita est AC . Ponatur AS , media proportionalis in-

ter B A, A C. Demonstrabimus, impetum in B ad impetum in C esse ut lineam S A ad A C. Sumantur horizontales C D, dupla ipsius A C; B E vero dupla B A. Constat ex demonstratis, cadens per A C conversum in horizonte C D, atque juxta impetum in C acquisitum motu æquabili delatum conficere spatium C D æquali tempore, atque ipsum A C motu accelerato confecit; similiterque B E confici eodem tempore atque A B. Sed tempus ipsius descensus A B est A S; ergo horizontalis B E conficitur tempore A S. Fiat ut tempus S A ad tempus A C, ita E B ad B L. Cumque motus per B E sit æquabilis, erit spatium B L peractum tempore A C secundum momentum celeritatis in B. Sed tempore eodem A C conficitur spatium C D secundum momentum celeritatis in C: momenta autem celeritatis sunt inter se ut spatia, quæ juxta ipsa momenta eodem conficiuntur tempore: ergo momentum celeritatis in C ad momentum celeritatis in B, est ut D C ad B L. Quia vero ut D C ad B E, ita ipsarum dimidia, nempe C A ad A B; ut autem E B ad B L, ita B A ad A S: ergo ex æquali, ut C D ad B L, ita C A ad A S, hoc est, ut momentum celeritatis in C ad momentum celeritatis in B, ita C A ad A S; hoc est, tempus per C A ad tempus per A B. Patet itaque ratio mensurandi impetum, seu celeritatis momentum super linea, in qua

fit motus descensus; qui quidem impetus ponitur augeri pro ratione temporis.

Hic autem, antequam ulterius progrediamur, præmonendum est, quod cum de motu composito ex æquabili horizontali, et ex naturaliter accelerato deorsum futurus sit sermo, (ex tali enim mixtione conflatur, ac designatur linea projecti, nempe Parabola;) necesse habemus definire aliquam communem mensuram, juxta quam utriusque motus velocitatem, impetum, seu momentum dimetiri valeamus. Cumque lationis æquabilis innumeri sint velocitatis gradus, quorum non quilibet fortuito, sed unus ex illis innumeris cum gradu celeritatis per motum naturaliter acceleratum acquisito sit conferendus, et conjungendus; nullam faciliorem viam excogitare potui pro eo eligendo, atque determinando, quam alium ejusdem generis assumendo. Ut autem clarius me explicem; intelligatur perpendicularis AC (Fig. vi.) ad horizontalem CB : AC vero esse altitudinem: CB autem amplitudinem Semiparabolæ AB ; quæ describitur a compositione duarum lationum; quarum una est mobilis descendantis per AC motu naturaliter accelerato ex quiete in A ; altera est motus transversalis æquabilis juxta horizontalem AD . Impetus acquisitus in C per descensum AC determinatur a quantitate ejusdem altitudinis AC , unus enim atque idem est semper impetus mobilis ex eadem altitudine

cadentis: verum in horizontali non unus, sed innumeri assignari possunt gradus velocitatis motuum æquabilium; ex quorum multitudine, ut illum quem elegero a reliquis segregare, et quasi digito monstrare possim, altitudinem CA in sublimi extendam, in qua, prout opus fuerit, sublimitatem AE firmabo, ex qua si cadens ex quiete in E mente concipiam, patet, impetum ejus in termino A acquisitum unum esse, cum quo idem mobile, per horizontalem AD conversum, ferri concepero; ejusque gradum celeritatis esse illum, quo in tempore descensus per E A spatium in horizontali duplum ipsius EA conficiet. Hæc præmonere necessarium visum est.

Advertatur insuper, semiparabolæ AB amplitudinem a me vocari horizontalem CB ;

Altitudinem, AC nempe, ejusdem Parabolæ axem.

Lineam vero EA , ex cujus descensu determinatur impetus horizontalis, sublimitatem appello.

His declaratis, ac definitis, ad demonstrandum me conféro.

Sagr. Fermate in grazia, perchè qui mi par, che convenga adornar questo pensiero dell' Autore colla conformità del concetto di Platone intorno al determinare le diverse velocità dei moti equabili delle conversioni dei moti celesti; il quale avendo per avventura avuto concetto, non potera

alcun mobile passare dalla quiete ad alcun determinato grado di velocità, nel quale ei debba poi equabilmente perpetuarsi; se non col passare per tutti gli altri gradi di velocità minori, o vogliam dire di tardità maggiori, che tra l'assegnato grado, e l'altissimo di tardità, cioè della quiete, intercedono, disse, che Iddio dopo aver creati i corpi mobili celesti per assegnar loro quelle velocità, colle quali poi dovessero con moto circolare equabile perpetuamente muoversi, gli fece, partendosi loro dalla quiete, muover per determinati spazj di quel moto naturale, e per linea retta, secondo il quale noi sensatamente vediamo i nostri mobili muoversi dallo stato di quiete accelerandosi successivamente. E soggiugne, che avendogli fatto guadagnar quel grado, nel quale gli piacque, che poi dovessero mantenersi perpetuamente, convertì il moto loro retto in circolare; il quale solo è atto a conservarsi equabile, rigirandosi sempre senza allontanarsi, o avvicinarsi a qualche prefisso termine da essi desiderato. Il concetto è veramente degno di Platone; ed è tanto più da stimarsi, quanto i fondamenti taciuti da quello, e scoperti dal nostro Autore col levargli la maschera, o sembianza poetica lo scuoprono in aspetto di verace istoria. E mi pare assai credibile, che avendo noi per le dottrine Astronomiche assai competente notizia delle grandezze degli orbi, e dei Pianeti, e delle

distanze loro dal centro, intorno al quale siaggirano, come ancora delle loro velocità, possa il nostro Autore (al quale il concetto Platonico non era ascosto) aver talvolta per sua curiosità avuto pensiero di andare investigando, se si potesse assegnare una determinata sublimità, dalla quale partendosi, come da stato di quiete, i corpi dei Pianeti, e mossi per certi spazj di moto retto, e naturalmente accelerato, convertendo poi la velocità acquistata in moti equabili, si trovassero corrispondere alle grandezze degli orbi loro, e ai tempi delle loro rivoluzioni.

Salv. Mi par sovvenire, che egli già mi dicesse aver una volta fatto il computo, ed anco trovato assai acconciamente rispondere alle osservazioni; ma non averne voluto parlare, giudicando, che le troppe novità da lui scoperte, che lo sdegno di molti gli hanno provocato, non accendessero nuove scintille. Ma se alcuno avrà simil desiderio, potrà per se stesso colla dottrina del presente trattato soddisfare al suo gusto. Ma seguitiamo la nostra materia; che è di dimostrare,

PROBL. I. PROP. IV.

Quomodo in datae Parabolae a Projecto descriptae punctis singulis impetus sit determinandus.

Sit Semiparabola B E C (Fig. vii.), cujus amplitudo C D, altitudo D B, quæ extensa iu sublimi occurrat tangenti Parabolam C A in A, et per verticem B sit horizonti, et C D parallela B I. Quod si amplitudo C D sit æqualis toti altitudini D A, erit B I æqualis B A, et B D. Et si temporis casus per A B; et momenti velocitatis acquisiti in B per descensum A B ex quiete in A, ponamus mensuram esse ipsammet A B; erit D C (dupla nempe B I) spatium, quod per impetum A B, per horizontalem conversum conficiet eodem tempore. Sed eodem tempore cadens per B D, ex quiete in B, conficit altitudinem B D, ergo mobile cadens ex quiete in A, per A B conversum cum impetu A B, per horizontalem conficit spatium æquale D C. Superveniente vero casu per B D, conficit altitudinem B D; et Parabola B C designatur: cujus impetus in termino C est compositus ex æquabili transversali; cujus momentum est ut A B, et ex altero momento acquisito in descensu B D in termino D seu C; quæ momenta æqualia sunt. Si ergo intel-

ligamus, A B alterius illorum esse mensuram, ut puta transversalis æquabilis: B I vero, quæ ipsi B D est æqualis, esse mensuram impetus acquisiti in D seu C: subtensa I A erit quantitas momenti compositi ex ambobus: erit ergo quantitas, seu mensura integri momenti, quo projectum veniens per Parabolam B C impetum facit in C. His retentis, accipiat in Parabola quodlibet punctum E, in quo de impetu Projecti determinandum sit. Ducatur horizontalis E F: et accipiat B G media proportionalis inter B D, B F. Cumque posita sit A B seu B D esse mensura temporis, et momenti velocitatis in casu si D ex quiete in B; erit B G tempus, seu mensura temporis, et impetus in F, venientis ex B. Si igitur ponatur B O æqualis B G; juncta diagonalis A O erit quantitas impetus in puncto E; est enim A B determinatrix posita temporis, et impetus in B, qui conversus in horizontali, semper servatur idem; B O vero determinat impetum in F seu E per descensum ex quiete in B, in altitudine B F, his autem A B, B O potentia æquipollet A O. Patet ergo, quod quærebatur.

Sagr. La contemplazione del componimento di questi impeti diversi, e della quantità di quell' impeto, che da tal mistione risulta, mi giugne tanto nuova, che mi lascia la mente in non piccola confusione. Non dico della mistione di due movimenti equa-

bili, benchè tra di loro diseguali, fatti uno per la linea orizzontale, e l'altro per la perpendicolare, che di questi resto capacissimo farsi un moto in potenza eguale ad amendue i componenti, ma mi nasce confusione nel mescolamento dell'orizzontale equabile, e perpendicolare naturalmente accelerato. Però vorrei che insieme digerissimo meglio questa materia.

Simp. Ed io tanto più ne son bisogno, quanto che non sono ancor totalmente quietato di mente, come bisogna nelle proposizioni, che sono come prinii fondamenti dell'altre, che gli seguono appresso. Voglio inferire, che anco nella mistione dei due moti equabili orizzontale, e perpendicolare vorrei meglio intendere quella potenza del lor composto. Ora, Sig. Salv. V. S. intende il nostro bisogno, e desiderio.

Salv. Il desiderio è molto ragionevole, e tenterò, se l'avere io più lungo tempo potuto pensarvi sopra, può agevolare la vostra intelligenza. Ma converrà comportarmi, e scusarmi, se nel discorrere anderò replicando buona parte delle cose sin qui poste dall'Autore.

Discorrer determinatamente circa i movimenti, e lor velocità, o impeti, siano quelli o equabili, o naturalmente accelerati, non possiamo noi senza prima determinar della misura, che usar vogliamo per misurar tali velocità, come anco della misura del tempo. Quanto alla misura del tempo,

già abbiamo la comunemente ricevuta per tutto delle ore, minuti primi, e secondi, ec. e come per misura del tempo ci è la detta comune ricevuta da tutti, così bisogna assegnarne una per le velocità, che appresso tutti sia comunemente intesa, e ricevuta; cioè, che appresso tutti sia l'istessa. Atta per tale uso ha stimato l'Autore, come si è dichiarato, esser la velocità dei gravi naturalmente descendenti, dei quali le crescenti velocità in tutte le parti del mondo serbano l'istesso tenore. Sicchè quel grado di velocità, che (per esempio) acquista una palla di piombo di una libbra nell'esser partendosi dalla quiete scesa perpendicolarmente quanto è l'altezza di una picca, è sempre, e in tutti i luoghi il medesimo, e per ciò accomodatissimo per esplicar la quantità dell'impeto derivante dalla scesa naturale. Resta poi il trovar modo di determinare anco la quantità dell'impeto in un moto equabile in guisa tale, che tutti coloro, che circa di quello discorrono, si formino l'istesso concetto della grandezza, e velocità sua; sicchè uno non se lo figuri più veloce, e un altro meno; onde poi nel congiugnere, e mescolar questo da se concepito equabile collo statuito moto accelerato, da diversi uomini ne vengano formati diversi concetti di diverse grandezze d'impeti. Per determinare, e rappresentare cotal impeto, e velocità particolare, non ha trovato il nostro Autore altro mezzo più acco-

modato, che il servirsi dell' impeto, che va acquistando il mobile nel moto naturalmente accelerato, del quale qualsivoglia momento acquistato, convertito in moto equabile ritien la sua velocità limitata precisamente, e tanta, che in altrettanto tempo quanto fu quello della scesa, passa doppio spazio dell' altezza, dalla quale è caduto. Ma perchè questo è punto principale nella materia, che si tratta, è bene con qualche esempio particolare farsi perfettamente intendere. Ripigliando dunque la velocità, e l' impeto acquistato dal grave cadente, come dicemmo, dall' altezza di una picca, della quale velocità vogliamo servirci per misura di altre velocità, ed impediti in altre occasioni, e posto per esempio, che il tempo di tal caduta sia 4 minuti secondi di ora, per ritrovar da questa tal misura, quanto fusse l' impeto del cadente da qualsivoglia altra altezza maggiore, o minore, non doviamo dalla proporzione, la quale quest' altra altezza avesse coll' altezza di una picca argomentare, o concludere la quantità dell' impeto acquistato in questa seconda altezza: stimando, per esempio, che il cadente da quadrupla altezza avesse acquistato quadrupla velocità; perchè ciò è falso: imperocchè non cresce, o cala la velocità nel moto naturalmente accelerato secondo la proporzione degli spazj, ma ben secondo quella dei tempi, della quale quella degli spazj è maggiore in duplicata proporzione,

come già fu dimostrato. Però quando noi avessimo in una linea retta assegnatane una parte per misura della velocità, ed anco del tempo, e dello spazio in tal tempo passato (che per brevità tutte tre queste grandezze con un'istessa linea spesse volte vengono rappresentate) per trovar la quantità del tempo, e il grado di velocità, che il mobile medesimo in altra distanza averebbe acquistato, ciò otterremo noi, non immediatamente da questa seconda distanza, ma dalla linea, che tra le due distanze sarà media proporzionale. Ma con un esempio meglio mi dichiaro. Nella linea A C (Fig. viii.) perpendicolare all'orizzonte intendasi la parte A B essere uno spazio passato da un grave naturalmente discendente di moto accelerato: il tempo del qual passaggio, potendo io rappresentarlo con qualsivoglia linea, voglio per brevità figurarlo esser quanto la medesima linea A B, e parimente per misura dell'impeto, e velocità acquistata per tal moto pongo pur l'istessa linea A B, sicchè di tutti gli spazj, che nel progresso del discorso si hanno a considerare, la misura sia la parte A B. Stabilite ad arbitrio nostro sotto una sola grandezza A B queste 3 misure di generi di quantità diversissimi, cioè di spazj, di tempi, e di impeti, siaci proposto di dover determinare nell'assegnato spazio, e altezza A C, quanto sia per essere il tempo della ascesa del cadente dall'A in C, e quanto l'im-

peto, che in esso termine C si troverà avere acquistata, in relazione al tempo, ed all'impeto misurati per la AB . L'uno, e l'altro quesito si determinerà pigliando delle due linee AC , AB la media proporzionale AD , affermando il tempo della caduta per tutto lo spazio AC esser quanto il tempo AD , in relazione al tempo AB , posto da principio per la quantità del tempo nella scesa AB . Diremo parimente l'impeto, o grado di velocità, che otterrà il cadente nel termine C , in relazione all'impeto, che ebbe in B , esser quale la medesima linea AD , in relazione all' AB , essendochè la velocità cresce colla medesima proporzione, che cresce il tempo: la qual conclusione, sebben fu presa come postulato, pur tuttavia volse l'Autore esplicarne l'applicazione di sopra alla proposizion terza.

Ben compreso, e stabilito questo punto, venghiamo alla considerazione dell'impeto derivante da due moti composti; uno dei quali sia composto dell'orizzontale e sempre equabile, e del perpendicolare all'orizzonte, e esso ancora equabile. Ma l'altro sia composto dell'orizzontale pur sempre equabile, e del perpendicolare naturalmente accelerato. Se amendue saranno equabili, già si è visto come l'impeto risultante dalla composizione di amendue è in potenza eguale ad amendue, come per chiara intelligenza esemplificheremo così. Intendasi il mobile descendente per la perpendicolare AB (Fig. iv.)

aver per esempio 3 gradi d'impeto equabile, ma trasportato per la A B verso C, esser tal velocità, ed impeto di 4 gradi, sicchè nel tempo medesimo, che scendendo passerebbe nella perpendicolare v. g. 3 braccia, nella orizzontale ne passerebbe 4; ma nel composto di amendue le velocità viene nel medesimo tempo dal punto A, nel termine C, camminando sempre per la diagonale A C, la quale non è lunga 7, quanto sarebbe la composta delle due A B 3, e B C 4, ma è 5, la qual 5 è in potenza eguale alle due 3, e 4. Imperocchè fatti li quadrati del 3, e del 4, che sono 9, e 16, e questi congiunti insieme, fanno 25 per lo quadrato di A C, il quale alli due quadrati di A B, e di B C è eguale, onde la A C sarà quanto è il lato, o o vogliam dir, la radice del quadrato 25, che è 5. Per regola dunque ferma, e sicura, quando si debba assegnare la quantità dell'impeto risultante da 2 impeti dati, uno orizzontale, e l'altro perpendicolare, ed amendue equabili, si deve di amendue fare 3 quadrati, e componendogli insiemestrar la radice del composto, la quale ci darà la quantità dell'impeto composto di amendue quelli. E così nell'esempio posto, quel mobile che in virtù del moto perpendicolare averebbe percosso sopra l'orizzonte con 3 gradi di forza; e col moto solo orizzontale averebbe percosso in C con gradi 4, percotendo con amendue gl'impe-

ti congiunti, il colpo sarà come quello del percuziente mosso con gradi 5 di velocità, e di forza. E questa tal percossa sarebbe del medesimo valore in tutti i punti della diagonale $A C$, per esser sempre gl'impeti composti i medesimi non mai cresciuti, o diminuiti.

Vediamo ora quello, che accada nel comporre il moto orizzontale equabile con un moto perpendicolare all'orizzonte, il quale cominciando dalla quiete vada naturalmente accelerandosi. Già è manifesto, che la diagonale, che è la linea del moto composto di questi due, non è una linea retta, ma semiparabolica, come si è dimostrato; nella quale l'impeto va sempre crescendo, mercè del continuo crescimento della velocità del moto perpendicolare. Laonde per determinar qual sia l'impeto in un assegnato punto di essa diagonale parabolica, prima bisogna assegnar la quantità dell'impeto uniforme orizzontale, e poi investigar qual sia l'impeto del cadente nell'assegnato punto: il che non si può determinare senza la considerazione del tempo decorso dal principio della composizione dei due moti: la qual considerazione di tempo non si richiede nella composizione dei moti equabili, le velocità, ed impeti dei quali son sempre i medesimi: ma qui dove entra nella mistione un moto, che cominciando dalla somma tardità, va crescendo la velocità conforme alla continuazion del tempo, è necessario, che la quantità del tempo ci

manifesti la quantità del grado di velocità nell' assegnato punto : che quanto al resto poi l' impeto composto di questi due è (come nei moti uniformi) eguale in potenza ad amendue i componenti. Ma qui ancora meglio mi dichiaro con un esempio. Sia nella perpendicolare all' orizzonte AC (Fig. 1x.) presa qualsivoglia parte AB la quale figuro, che serva per misura dello spazio del moto naturale fatto in essa perpendicolare, e parimente sia misura del tempo, ed anco del grado di velocità, o vogliam dire degl' impeti. È primieramente manifesto, che se l' impeto del cadente in B dalla quiete in A , si convertirà sopra la BD parallela all' orizzonte in moto equabile, la quantità della sua velocità sarà tanta, che nel tempo AB passerà uno spazio doppio dello spazio AB ; e tanta sia la linea BD . Posta poi la BC eguale alla BA , e tirata la parallela CE alla BD , e ad essa eguale, descriveremo per i punti B , E la linea parabolica BEI . E perchè nel tempo AB coll' impeto AB si passa l' orizzontale BD , o CE , doppia della AB , e passasi ancora in altro tanto tempo la perpendicolare BC con acquisto d' impeto in C eguale al medesimo orizzontale, adunque il mobile in tanto tempo quanto è AB , si troverà dal B giunto in E per la parabola BE , con un impeto composto di due, ciascheduno eguale all' impeto AB . E perchè l' uno di essi è orizzontale, e

l'altro perpendicolare, l'impeto composto di essi sarà in potenza eguale ad amendue, cioè doppio di uno. Onde posta la BF eguale alla BA ; e tirata la diagonale AF , l'impeto, e la percossa in E ; sarà maggior della percossa in B della cadente dall'altezza A , ovvero della percossa dell'impeto orizzontale per la BD , secondo la proporzione di AF ad AB . Ma quando, ritenendo pur sempre la BA , per misura dello spazio della caduta dalla quiete in A sino in B , e per misura del tempo, e dell'impeto del cadente acquistato in B l'altezza BO non fusse eguale, ma maggiore della AB ; presa la BG media proporzionale tra esse AB , BO , sarebbe essa BG misura del tempo, e dell'impeto in O per la caduta dell'altezza BO , acquistato in O ; e lo spazio per l'orizzontale, il quale passato coll'impeto AB nel tempo AB , sarebbe doppio della AB , sarà in tutta la durazion del tempo BG tanto maggiore, quanto a proporzione la BG è maggiore della BA . Posta dunque la LB eguale alla BG , e tirata la diagonale AL , avremo da essa la quantità composta delli due impeti orizzontale, e perpendicolare, dai quali si descrive la Parabola: dei quali l'orizzontale ed equabile è l'acquistato in B per la caduta AB ; e l'altro è l'acquistato in O , o vogliam dire in I , per la caduta BO , il cui tempo fu BG , come anco la quantità del suo momento. E con

simil discorso investigheremo l'impeto nel termine estremo della parabola, quando l'altezza sua fusse minore della sublimità A B prendendo tra amendue la media; la quale posta nell'orizzontale in luogo della B F, e congiunta la diagonale, come A F, avremo da questa la quantità dell'impeto nell'estremo termine della parabola.

A quanto sin qui si è considerato circa questi impeti, colpi, o vogliam dir percosse di tali progetti, convien aggiugnere un'altra molto necessaria considerazione, e questa è, che non basta por mente alla sola velocità del progetto per ben determinarlo della forza, ed energia della percossa, ma convien chiamare a parte ancora lo stato, e condizione di quello, che riceve la percossa; nell'efficacia della quale esso per più rispetti ha gran partecipazione, e interesse. E prima non è chi non intenda, che la cosa percossa intanto patisce violenza dalla velocità del percuziente, in quanto ella se gli oppone, e frena in tutto, o in parte il moto di quello: che se il colpo arriverà sopra tale, che ceda alla velocità del percuziente senza resistenza alcuna, tal colpo sarà nullo. E colui, che corre per ferir con lancia il suo nimico, se nel sopraggiugnerlo accaderà, che quello si muova fuggendo con pari velocità, non farà colpo, e l'azione sarà un semplice toccare senza offendere.

Ma se la percossa verrà ricevuta in un oggetto, che non in tutto ceda al percuoziente, ma solamente in parte, la percossa danneggerà, ma non con tutto l'impeto, ma solo coll'eccesso della velocità di esso percuoziente sopra la velocità della ritirata, e cedenza del percosso: sicchè, se v. gr. il percuoziente, arriverà con 10 gradi di velocità sopra il percosso, il quale cedendo in parte si ritiri con gradi 4, l'impeto, e percossa sarà come di gradi 6. E finalmente intera, e massima sarà la percossa, per la parte del percuoziente, quando il percosso nulla ceda, ma interamente si opponga, e fermi tutto il moto del percuoziente; se però questo può accadere. Ed ho detto per la parte del percuoziente, perchè quando il percosso si movesse con moto contrario verso il percuoziente, il colpo, e l'incontro si farebbe tanto più gagliardo, quanto le due velocità contrarie unite son maggiori, che la sola del percuoziente. Di più conviene anco avvertire, che il ceder più, o meno, può derivare non solamente dalla qualità della materia più o men dura, come se sia di ferro, di piombo, o di lana, ec. ma dalla positura del corpo, che riceve la percossa: la qual positura se sarà tale, che il moto del percuoziente la vada a investire ad angoli retti, l'impeto del colpo sarà il massimo: ma se il moto verrà obliquamente, e come diciam noi, a scancio, il colpo sarà più debole, e più e

più secondo la maggiore obliquità; perchè in oggetto in tal modo situato, ancorchè di materia sodissima, non si spegne, e ferma tutto l'impeto, e moto del percoziente, il quale sfuggendo passa oltre, continuando almeno in qualche parte a muoversi sopra la superficie del resistente opposto. Quando dunque si è di sopra determinato della grandezza dell'impeto del progetto nell'estremità della linea parabolica, si deve intendere della percossa ricevuta sopra una linea ad angoli retti ad essa parabolica, ovvero alla tangente la parabola nel detto punto: perchè sebben quel moto è composto di un orizzontale, e di un perpendicolare, l'impeto nè sopra l'orizzontale nè sopra il piano eretto all'orizzonte è il massimo, venendo sopra amendue ricevuto obliquamente.

Sagr. Il ricordar V. S. questi colpi, e queste percosse mi ha risvegliato nella mente un problema, o vogliam dire questione meccanica, della quale non ho trovato appresso autore alcuno la soluzione, nè cosa, che mi scemi la maraviglia, o almeno in parte mi quieti l'intelletto. E il dubbio, e lo stupor mio consiste nel non restar capace onde possa derivare, e da qual principio possa dependere l'energia, e la forza immensa, che si vede consistere nella percossa, mentre col semplice colpo di un martello, che non abbia peso maggiore di 8 o 10, libbre, veggiamo su-

perarsi resistenze tali, le quali non cederebbero al peso di un grave, che senza percossa vi faccia impeto solamente calcando, e premendo, benchè la gravità di quello passi molte centinaia di libbre. Io vorrei pur trovar modo di misurar la forza di questa percossa, la quale non penso però, che sia infinita, anzi stimo, che ella abbia il suo termine da potersi pareggiare, e finalmente regolare con altre forze di gravità prementi, o di leve, o di viti, o di altri strumenti meccanici, dei quali io a soddisfazione resto capace della moltiplicazione della forza loro.

Salv. V. S. non è solo nella meraviglia dell'effetto, e nella oscurità della cagione di così stupendo accidente. Io vi pensai per alcun tempo in vano, accrescendo sempre la confusione; sinchè finalmente, incontrandomi nel nostro Accademico, da esso ricevei doppia consolazione: prima nel sentire come egli ancora era stato lungo tempo nelle medesime tenebre, e poi nel dirmi, che dopo l'avervi in vita sua consumate molte migliaia di ore specolando, e filosofando, ne aveva conseguite alcune cognizioni lontane dai nostri primi concetti, e però nuove, e per la novità ammirande. E perchè omai so, che la curiosità di V. S. volentieri sentirebbe quei pensieri, che si allontanano dall'opinabile, non aspetterò la sua richiesta, ma le do parola, che spedita che avremo la lettura di questo

trattato dei progetti, gli spiegherò tutte quelle fantasie, o vogliamo dire stravaganze, che dei discorsi dell' Accademico mi son rimaste nella memoria. In tanto seguiamo le proposizioni dell' Autore.

PROPOS. V. PROBL. II.

In axe extenso datae Parabolae punctum sublime reperire, ex quo cadens parabolam ipsam describit.

Si Parabola A B (Fig. x.) cujus amplitudo H B, et axis extensus H C, in quo reperienda sit sublimitas, ex qua cadens, impetum in A conceptum in horizontalem convertens, parabolam A B describat. Ductur horizontalis A G, quæ erit parallela ipsi B H, et posita A F æquali A H, ducatur recta F B, quæ parabolam tanget in B, et horizontalem A G in G secabit; accipiatursque ipsarum F A, A G tertia proportionalis A C. Dico C esse punctum sublime quæsitum, ex quo cadens ex quiete in C, et conceptum impetum in A in horizontalem convertens, superveniente impetu descensus in H ex quiete in A, parabolam A B describet. Si enim intelligamus, C A esse mensuram temporis descensus ex

Galileo Galilei Vol. IX. 4

C in A. nec non impetus acquisiti in A, erit A G (media nempe inter C A, A F) tempus, et impetus venientis ex F in A, seu ex A in H. Et quia veniens ex C tempore C A, cum impetu acquisito in A, conficit in latiore horizontali motu æquabili duplam C A; ergo etiam latum eodem impetu conficiet in tempore A G duplam G A, mediam nempe B H; (spatia enim confecta eodem motu æquabili sunt inter se ut eorundem motuum tempora) et in perpendiculari motu ex quiete, eodem tempore G A conficitur A H; ergo eodem tempore conficiuntur a mobili amplitudo H B, et altitudo A H. Describitur ergo parabola A B ex casu venientis a sublimitate C. quod quærebat.

COROLLARIUM.

Hinc constat dimidiam basim, seu amplitudinem semiparabolæ (quæ est quarta pars amplitudinis integræ parabolæ) esse mediam proportionalem inter altitudinem ejus, et sublimitatem, ex qua cadens eam designat.

PROPOS. VI. PROBL. III.

Data sublimitate, et altitudine, semiparabolæ amplitudinem reperire.

Sit ad horizontalem lineam DC (Fig. XI.) perpendicularis AC , in qua data sit altitudo CB , et sublimitas BA , oportet in horizontali CD amplitudinem semiparabolæ reperire, quæ ex sublimitate BA cum altitudine BC designatur. Accipiaturs media proportionalis inter CB , BA , cujus CD ponatur dupla. Dico CD esse amplitudinem quæsitam. Id autem ex præcedenti manifestum est.

THEOR. IV. PROPOS. VII.

In projectis, a quibus semiparabolæ ejusdem amplitudinis describuntur, minor requiritur impetus in eo, quod describit illam, cujus amplitudo suæ altitudinis est dupla, quam in quolibet alio.

Sit enim semiparabola BD (Fig. XII.), cujus amplitudo CD dupla sit altitudinis

suæ CB , et in axe in sublimi extenso po-
 natur BA altitudini BC æqualis: et jun-
 gatur AD , quæ semiparabolam tanget in
 D ; et horizontalem BE secabit in E , erit-
 que BE ipsi BC seu BA æqualis; con-
 stat, ipsam describi a projecto, cujus im-
 petus æquabilis horizontalis sit, qualis est
 in B cadentis ex quiete in A , impetus ve-
 ro naturalis deorsum, qualis est venientis
 in C ex quiete in B . Ex quo constat, im-
 petum ex istis compositum, quique in ter-
 mino D impingit, esse ut diagonalem AE ,
 potentia nempe ipsis ambobus æqualem.
 Sit modo quælibet alia semiparabola GD ;
 cujus amplitudo eadem CD , altitudo vero
 CG minor, vel major altitudine BC ;
 eamque tangat HD , secans horizontalem
 per G ductam in puncto K ; et fiat, ut H
 G ad GK , ita KG ad GL , erit ex an-
 te demonstratis altitudo GL , ex qua ca-
 dens describet parabolam GD . Inter AB ,
 et GL media proportionalis sit GM : erit
 GM tempus, et momentum, sive impetus
 in G cadentis ex L . (positum enim est,
 AB esse mensuram temporis, et impetus.)
 Sit rursus inter HC , CG , media GN ,
 quæ erit temporis, impetus mensura caden-
 tis ex G in C . Si igitur jungatur MN , erit
 ipsa impetus mensura projecti per parabola-
 ram BD , illidentis in termino D . Quem
 quidem impetum majorem esse dico impe-
 tu projecti per parabolam BD , cujus quan-
 titas erat ut AE . Quia enim GN posita

est media inter $B C$, $C G$, est autem $B C$ æqualis $B E$, hoc est $G K$ (est enim unaquæque subdupla $D C$;) erit ut $C G$ ad $G N$, ita $N G$ ad $G K$, et ut $C G$ seu $H G$ ad $G K$, ita quadratum $N G$ ad quadratum $G K$; ut autem $H G$ ad $G K$, ita facta est $K G$ ad $G L$. ergo ut quadratum $N G$ ad quadratum $G K$, ita $K G$ ad $G L$, sed ut $K G$ ad $G L$, ita quadratum $K G$ ad quadratum $G M$ (media enim est $G M$ inter $K G$, $G L$) ergo tria quadrata $N G$, $K G$, $G M$, sunt continue proportionalia: et duo extrema $N G$, $G M$, simul sumpta, idest, quadratum $M N$, majus quam duplum quadrati $K G$, cujus quadratum $A E$ duplum est: ergo quadratum $M N$ majus est quadrato $A E$; et linea $M N$ major linea $E A$, quod erat demonstrandum.

COROLLARIUM.

Hinc apparet, quod conversim in projecto ex termino D per semiparabolam $D B$ minor impetus requiritur, quam per quamcunque aliam juxta elevationem majorem, seu minorem elevatione semiparabolæ $B D$, quæ est juxta tangentem $A D$, angulum semirectum supra horizontem continentem. Quod cum ita sit, constat, quod, si cum eodem impetu fiant projectiones ex termino D , juxta diversas elevationes, maxima projectio, seu amplitudo semiparabo-

lae, sive integræ parabolæ erit, quæ consequitur ad elevationem anguli semirecti: reliquæ vero juxta majores, sive minores angulos factæ, minores erunt.

Sagr. Piena di maraviglia, e di diletto insieme è la forza delle dimostrazioni necessarie, quali sono le sole Matematiche. Già sapeva io per fede prestata alle relazioni di più Bombardieri, che di tutti i tiri di volata dell'artiglieria, o del mortaro, il massimo, cioè quello, che in maggior lontananza caccia la palla, era il fatto all'elevazione di mezzo angolo retto, che essi dicono, del sesto punto della squadra; ma l'intender la cagione, onde ciò avvenga, supera d'infinito intervallo la semplice notizia avuta dalle altrui attestazioni, ed anco da molte replicate esperienze.

Salv. V. S. molto veridicamente discorre: e la cognizione di un solo effetto acquistata per le sue cause ci apre l'intelletto a intendere, ed assicurarci di altri effetti, senza bisogno di ricorrere all'esperienze, come appunto avviene nel presente caso, dove guadagnata per lo discorso dimostrativo la certezza dell'essere il massimo di tutti i tiri di volata quello dell'elevazione dell'angolo semiretto, ci dimostra l'Autore quello, che forse per l'esperienza non è stato osservato; e questo è, che degli altri tiri, quelli sono tra di loro eguali, le elevazioni dei quali superano, o mancano per angoli eguali dalla semiretta: sicchè le pal-

le tirate dall'orizzonte una secondo l'elevazione di 7 punti, e l'altra di 5, andranno a ferir su l'orizzonte in lontananze eguali, e così eguali saranno i tiri di 8 e di 4 punti; di 9 e di 3 ec. Or sentiamone la dimostrazione.

THEOR. V. PROPOS. VIII.

Amplitudines parabolarum a projectis eodem impetu explosis factarum, juxta elevationes per angulos aequales supra, et infra a semirecto distantes, aequales sunt inter se.

Trianguli $M C B$ (Fig. XIII.) circa angulum rectum C sint horizontalis $B C$, perpendicularis $C M$ aequales; sic enim angulus $M B C$ semirectus erit: et extensa $C M$ in D , supra et infra diagonalem $M B$ constituentur in B duo anguli aequales $M B E$, $M B D$. Demonstrandum est, amplitudines Parabolarum a Projectis explosis eodem impetu ex termino B , juxta elevationes angulorum $E B C$, $D B C$, esse aequales. Quia enim angulus externus $B M C$ internis $M D B$, $D B M$ est aequalis, iisdem æquabitur quoque angulus $M B C$. Quod si loco anguli $D B M$ ponamus $M B E$, erit idem angulus $M B C$ duobus

$M B E$, $B D C$ æqualis : et dempto com-
 muni $M B E$, reliquus $B D C$ reliquo E
 $B C$ erit æqualis. Sunt igitur trianguli $D C$
 B , $B C E$ similes. Dividantur rectæ $D C$,
 $E C$ bifariam in H , et F ; et ducantur H
 I , $F G$, horizontali $C B$ æquidistantes; et
 ut $D H$ ad $H I$, ita fiat $I H$ ad $H L$:
 erit triangulus $I H L$ similis triangulo $I H$
 D , cui etiam similis est $E G F$. Cumque
 $I H$, $G F$ sint æquales (dimidiæ nempe
 ipsius $B C$) erit $F E$, idest $F C$, æqua-
 lis $H L$: et addita communi $F H$, erit
 $C H$ ipsi $F L$ æqualis. Si itaque intelliga-
 mus per H et B semiparabolam esse de-
 scriptam, cujus altitudo erit $H C$, subli-
 mitas vero $H L$, erit amplitudo ejus $C B$;
 quæ dupla est ad $H I$, media scilicet inter
 $D H$ seu $C H$, et $H L$; eamque tanget D
 B , æqualibus existentibus $C H$, $H D$. Quod
 si rursus parabolam per $F B$ descriptam
 concipiamus, a sublimitate $F L$ cum alti-
 tudine $F C$; quarum media proportionalis
 est $F G$; cujus dupla est horizontalis $C B$:
 erit pariter $C B$ ejus amplitudo: illamque
 tanget $E B$, cum $E F$, $F C$ sint æquales.
 Distant anguli $D B C$, $E B C$, (elevatio-
 nes scilicet ipsarum) æqualiter a semirecto:
 ergo patet propositum.

THEOR. VI. PROPOS. IX.

*Æquales sunt amplitudines Parabolarum ;
quarum altitudines , et sublimitates e
contrario sibi respondent.*

Parabolæ (Fig. XIV.) F H altitudo G F ad altitudinem C B parabolæ B D eandem habeat rationem quam sublimitas B A ad sublimitatem F E. Dico amplitudinem H G amplitudini D C esse æqualem. Cum enim prima G F ad secundam C B eandem habeat rationem, quam tertia B A ad quartam F E : rectangulum G F E primæ, et quartæ æquale erit rectangulo C B A secundæ, et tertiæ ; ergo quadrata, quæ hisce rectangulis æqualia sunt, æqualia erunt inter se : rectangulo vero G F E æquale est quadratum dimidiæ G H : rectangulo autem C B A æquale est quadratum dimidiæ C D. ergo quadrata hæc, et eorum latera, et laterum dupla, æqualia erunt. Hæc autem sunt amplitudines G H, C D. ergo patet propositum.

LEMMA PRO SEQUENTI.

Si recta linea secta fuerit utcumque, quadrata mediarum inter totam, et partes aequalia sunt quadrato totius.

Secta sit AB (Fig. xv.) utcumque in C . Dico, quadrata linearum mediarum inter totam AB , et partes AC , CB , simul sumpta, aequalia esse quadrato totius AB . Id autem constat descripto semicirculo super tota BA , et ex C erecta perpendiculari CD , junctisque DA , DB . Est enim DA media inter BA , AC , estque DB media inter AB , BC , suntque quadrata linearum DA , DB simul sumpta aequalia quadrato totius AB , recto existente angulo ADB in semicirculo; ergo patet propositum.

THEOR. VII. PROPOS. X.

Impetus, seu momentum cujuslibet semiparabolae aequatur momento naturaliter cadentis in perpendiculari ad horizontem, quae tanta sit, quanta est composita ex sublimitate cum altitudine semiparabolae.

Sit semiparabola AB (Fig. xvi.), cujus sublimitas DA , altitudo vero AC ex

quibus componitur perpendicularis DC . Dico, impetum semiparabolæ in B esse æqualem momento naturaliter descendenti ex D in C . Ponatur ipsamet DC mensura esse temporis, et impetus: et accipiat media proportionalis inter CD , DA , cui æqualis ponatur CF . Sit insuper inter D , C , A media CE . erit jam CF mensura temporis, et momenti descendenti per DA ex quiete in D , CE vero tempus erit, et momentum descendenti per AC ex quiete in A , et diagonalis EF erit momentum ex illis compositum: hoc est semiparabolæ in B . Et quia DC secta est utcumque in A , suntque CF , CE medię inter totam CD , et partes DA , AC : erunt harum quadrata simul sumpta æqualia quadrato totius ex Lemmate superiori; verum iisdem quadratis æquatur quoque quadratum ipsius EF . ergo et linea EF ipsi DC æqualis est. Ex quo constat, momenta per DC , et per semiparabolam AB , in C , et B esse æqualia; quod oportebat.

COROLLARIUM.

Hinc constat, semiparabolarum omnium, quarum altitudines cum sublimitatibus junctæ pares sunt, impetus quoque æquales esse.

PROBL. II. PROPOS. XI.

*Dato impetu, et amplitudine semiparabolæ;
altitudinem ejus reperire.*

Impetus datus definitus sit a perpendicularulo ad horizontem AB (Fig. xvii.); amplitudo vero in horizontali sit BC . Oportet sublimitatem semiparabolæ reperire, cujus impetus sit AB , amplitudo vero BC . Constat ex jam demonstratis, dimidiam amplitudinem BC futuram esse mediam proportionalem inter altitudinem, et sublimitatem ipsius semiparabolæ, cujus impetus ex præcedenti est idem cum impetu cadentis ex quiete in A per totam AB . Est propterea BA ita secanda, ut rectangulum a partibus ejus contentum æquale sit quadrato dimidiæ BC , quæ sit BD . Hinc apparet, necessarium esse, quod D B dimidiam BA non superet, rectangulorum enim a partibus contentorum maximum est, cum tota linea in partes secatur æquales. Dividatur itaque BA bifariam in E . Quod si ipsa BD æqualis fuerit BE , absolutum est opus: eritque semiparabolæ altitudo BE , sublimitas vero EA (et ecce Parabolæ elevationis semirectæ amplitudinem, ut supra demonstratum est, omnium

esse maximam ab eodem impetu descriptarum.) At minor sit BD quam dimidia B A , quæ ita secanda est, ut rectangulum sub partibus quadrato BD sit æquale. Supra E A semicirculus describatur, in quo ex A applicetur AF æqualis BD : et jungatur FE ; cui secetur pars æqualis EG . Erit jam rectangulum BGA cum quadrato EG æquale quadrato EA , cui quoque æqualia sunt duo quadrata AF , FE . Demptis itaque quadratis GE , FE , æqualibus, remanet rectangulum BGA æquale quadrato AF , nempe BD ; et linea BD media proportionalis inter BG , GA . Ex quo patet, semiparabolæ, cujus amplitudo BC , impetus vero AB , altitudinem esse BG , sublimitatem GA . Quod si ponatur inferius BI æqualis GA , erit hæc altitudo; IA vero sublimitas semiparabolæ IC . Ex demonstratis hucusque possumus.

PROBL. III. PROPOS. XII.

Semiparabolarum omnium amplitudines calculo colligere, atque in Tabulas exigere, quæ a projectis eodem impetu explosis describuntur.

Constat ex prædemonstratis, tunc parabolæ a projectis eodem impetu designa-

ri, cum illarum sublimitates cum altitudinibus junctæ æquales conficiunt perpendiculares supra horizontem. Inter easdem ergo parallelas horizontales hæ perpendiculares comprehendi debent. Ponatur itaque horizontali CB (Fig. xviii.) perpendicularis BA æqualis, et connectatur diagonalis AC . Erit angulus ACB semirectus, gr. 45. Divisaque perpendiculari BA bifariam in D , semiparabola DC erit ea, quæ a sublimitate AD cum altitudine DB designatur: et impetus ejus in C tantus erit, quantus est in B mobilis venientis ex quiete in A per lineam AB . Et, si ducatur AG æquidistans BC ; reliquarum omnium semiparabolarum, quarum impetus futurus sit idem cum modo explicato, altitudines cum sublimitatibus junctæ, spatium inter parallelas AG , BC explere debent. Insuper, cum jam demonstratum sit, semiparabolarum, quarum tangentes æqualiter sive supra, sive infra ab elevatione semirecta distant, amplitudines æquales esse, calculus, quem pro majoribus elevationibus compilabimus, pro minoribus quoque deserviet. Eligimus præterea numerum partium decem mille, 10000, pro maxima amplitudine projectionis semiparabolæ ad elevationem grad. 45. factæ; itaque tanta supponatur esse linea BA , et amplitudo semiparabolæ BC . Eligimus autem numerum 10000, quia utimur in calculis tabula tangentium, cujus hic numerus congruit

cum tangente grad. 45. Jam, ad opus accedendo, ducatur CE , angulum ECB angulo ACB majorem (acutum tamen) comprehendens: sitque semiparabola designanda, quæ a linea EC tangatur, et cujus sublimitas cum altitudine juncta ipsam BA adæquet. Ex tabula tangentium per angulum datum BCE tangens ipsa BE accipiatur; quæ bifariam dividatur in F . Deinde ipsarum BF , BI (dimidiæ BC) tertia proportionalis reperiatur, quæ necessario major erit quam FA . Sit igitur illa FO . Semiparabolæ igitur in triangulo ECB inscriptæ, juxta tangentem CE , cujus amplitudo est CB , reperta est altitudo BF , et sublimitas FO . Verum tota BO supra parallelas AG , CB attollitur, cum nobis opus sit inter easdem contineri: sic enim tum ipsa, tum semiparabolæ DC describentur a projectis ex C impetu eodem explosis. Reperienda igitur est altera huic similis (innumeræ enim intra angulum BCE majores, et minores inter se similes designari possunt) cujus composita sublimitas cum altitudine (homologa scilicet ipsi BA) æquetur BA . Fiat igitur, ut OB ad BA , ita amplitudo BC ad CR , et inventa erit CR , amplitudo scilicet semiparabolæ juxta elevationem anguli BCE ; cujus sublimitas cum altitudine juncta spatium a parallelis GA , CB contentum adæquat: quod quærebatur. Operatio itaque talis erit.

Anguli dati BCE tangens accipiatur; cujus medietati adjungatur tertia proportionalis ipsius, et medietatis BC , quæ sit FO . Fiat deinde ut OB ad BA , ita BC ad aliam, quæ sit CR , amplitudo nempe quæsita. Exemplum ponamus.

Sit angulus ECB grad. 50, erit ejus tangens 11918, cujus dimidium, nempe BF 5959, dimidia BC 5000, harum dimidiarum tertia proportionalis 4195. quæ addita ipsi BF conficit 10154 pro ipsa BO . Fiat rursus ut OB ad BA , nempe ut 10154 ad 10000, ita BC , nempe 10000. (utraq. enim grad. 45. est tangens) ad aliam, et habebimus quæsitam amplitudinem RC , 9848. qualium BC (maxima amplitudo) est 10000. Harum autem duplæ sunt amplitudines integrarum parabolarum, nempe 19696, et 20000. Tantaque est etiam amplitudo parabolæ juxta elevationem grad. 40. cum æqualiter distet a grad. 45.

Sagr. Mi manca per l'intera intelligenza di questa dimostrazione il saper come sia verò, che la terza proporzionale delle BF , BI sia (come dice l'Autore) necessariamente maggiore della FA .

Salv. Tal conseguenza mi par che si possa dedurre in tal modo. Il quadrato della media di tre linee proporzionali è eguale al rettangolo dell'altre due, onde il quadrato della BI , o della BD ad essa eguale, dee esser' eguale al rettangolo della prima FB nella terza da ritrovarsi;

la qual terza è necessario, che sia maggiore della FA , perchè il rettangolo della BF in FA è minore del quadrato BD ; ed il mancamento è quanto il quadrato della DF , come dimostra Euclide in una del secondo. Debbesi anco avvertire, che il punto F , che divide la tangente EB in mezzo, altre molte volte cadrà sopra il punto A , ed una volta anco nell'istesso A ; nei quali casi è per se noto, che la terza proporzionale della metà della tangente, e della BI (che dà la sublimità,) è tutta sopra la A . Ma l'Autore ha preso il caso, dove non era manifesto, che la detta terza proporzionale fusse sempre maggiore della FA ; e che però aggiunta sopra il punto F passasse la parallela AG . Or seguitiamo.

Non erit inutile ope hujus Tabulæ alteram componere complectentem altitudines earundem semiparabolarum projectorum ab eodem impetu. Constructio autem talis erit.

PROBL. IV. PROP. XIII.

Ex datis Semiparabolarum amplitudinibus in sequenti Tabula digestis, retentoque communi impetu, quo unaquaeque describitur, singularum semiparabolarum altitudines eligere.

Sit Amplitudo, data BC (Fig. **xxi.**). Impetus vero, qui semper idem intelligatur,
Galileo Galilei Vol. IX. 5

mensura sit AB , aggregatum nempe altitudinis, et sublimitatis. Reperienda est, ac distinguenda ipsamet altitudo. Quod quidem tunc consequemur, cum BA ita divisa fuerit, ut rectangulum sub ejus partibus contentum æquale sit quadrato dimidiæ amplitudinis BC . Incidat talis divisio in F . Et utraque AB , BC secetur bifariam in D , l. Est igitur quadratum IB æquale rectangulo BFA : quadratum vero DA æquatur eidem rectangulo cum quadrato FD . Si igitur ex quadrato DA auferatur quadratum BI , quod rectangulo BFA est æquale, remanebit quadratum FD , cujus latus DF additum lineæ BD dabit quæsitam altitudinem BF . Componitur itaque sic ex datis. Ex quadrato dimidiæ BA notæ aufer quadratum BI pariter notæ: residui sume radicem quadratam, quam adde notæ BD , et habebis altitudinem quæsitam BF . Exemplum. Invenienda sit altitudo semiparabolæ ad elevationem grad. 55 descriptæ. Amplitudo ex præcedenti Tabula est 9396. ejus dimidium est 4698, quadratum ipsius 22071204; hoc dempto ex quadrato dimidiæ BA , quod semper idem est, nempe 25000000, residuum est 2928796, cujus radix quadrata 1710 proxime. Hæc dimidiæ BA , nempe 5000 addita exhibet 6710, tantaque est altitudo BF . Non erit inutile, tertiam exponere Tabulam, altitudines, et sublimitates conti-

nentem semiparabolarum, quarum eadem futura sit amplitudo.

Sagr. Questa vedrò io molto volentieri, mentrechè per essa potrò venir in cognizione della differenza degl'impeti, e delle forze, che si ricercano per cacciare il progetto nella medesima lontananza con tiri, che chiamano di volata; la qual differenza credo, che sia grandissima secondo le diverse elevazioni: sicchè per esempio, se altri volesse alla elevazione di 3, o 4 gradi, o di 87, o 88 far cader la palla, dove fu cacciata alla elevazione di 45. (dove si è mostrato ricercarsi l'impeto minimo) credo si ricercherebbe un eccesso immenso di forza.

Salv. V. S. stima benissimo, e vedrà che per eseguire l'opera intera in tutte l'elevazioni bisogna andare a gran passo verso l'impeto infinito. Or vediamo la costruzione della Tavola.

*Altitudines semiparobolarum ,
quarum impetus sit idem.*

*Amplitudines semiparabol-
arum ab eodem impetu
descriptarum.*

<i>Gr. Elevationum.</i>		<i>Gr.</i>	
1	3	46	5173
2	13	47	5346
3	28	48	5523
4	50	49	5698
5	76	50	5868
6	108	51	6038
7	150	52	6207
8	194	53	6379
9	245	54	6546
10	302	55	6710
11	365	56	6873
12	432	57	7033
13	506	58	7190
14	585	59	7348
15	670	60	7502
16	760	61	7649
17	855	62	7796
18	955	63	7939
19	1060	64	8078
20	1170	65	8214
21	1285	66	8346
22	1402	67	8474
23	1527	68	8497
24	1685	69	8715
25	1786	70	8830
26	1922	71	8940
27	2061	72	9045

<i>Gr.</i>		<i>Gr.</i>	
45	10000		
46	9994	44	
47	9976	43	
48	9945	42	
49	9902	41	
50	9848	40	
51	9782	39	
52	9704	38	
53	9612	37	
54	9511	36	
55	9396	35	
56	9272	34	
57	9136	33	
58	8989	32	
59	8829	31	
60	8659	30	
61	8481	29	
62	8290	28	
63	8090	27	
64	7880	26	
65	7660	25	
66	7431	24	
67	7191	23	
68	6944	22	
69	6692	21	
70	6428	20	
71	6157	19	

Gr. Elevationum.

gr.		gr.	
28	2204	73	9144
29	2351	74	9240
30	2499	75	9330
31	2653	76	9415
32	2810	77	9493
33	2967	78	9567
34	3128	79	9636
35	3289	80	9698
36	3456	81	9755
37	3621	82	9806
38	3793	83	9851
39	3962	84	9890
40	4132	85	9924
41	4302	86	9951
42	4477	87	9972
43	4654	88	9987
44	4827	89	9998
45	5000	90	10000

gr.		gr.
72	5878	18
73	5592	17
74	5300	16
75	5000	15
76	4694	14
77	4383	13
78	4067	12
79	3746	11
80	3420	10
81	3090	9
82	2756	8
83	2419	7
84	2079	6
85	1736	5
86	1391	4
87	1044	3
88	698	2
89	349	1

Tabula continens altitudines, et sublimitates semiparabolarum, quarum amplitudines eadem sint, partium scilicet 10000. ad singulos gradus elevationis calculata.

<i>gr.</i>	<i>alt.</i>	<i>subl.</i>	<i>gr.</i>	<i>alt.</i>	<i>subl.</i>
1	87	286533	28	3008	9404
2	175	142450	29	3124	9020
3	262	95802	30	3247	8659
4	349	71531	31	3372	8336
5	437	57142	32	3500	8002
6	525	47573	33	3638	7699
7	614	40716	34	3768	7413
8	702	35587	35	3906	7141
9	792	31565	36	4048	6282
10	881	28356	37	4196	6635
11	972	25720	38	4346	6395
12	1062	23518	39	4502	6174
13	1154	21701	40	4662	5959
14	1246	20056	41	4828	5752
15	1339	18660	42	5000	5553
16	1434	17405	43	2658	5362
17	1528	16355	44	2772	5177
18	1624	15388	45	2887	5000
19	1722	14522	46	5177	4828
20	1820	13736	47	5362	4662
21	1919	13025	48	5553	4502
22	2020	12376	49	5752	4346
23	2122	11778	50	5959	4196
24	2226	11230	51	6174	4048
25	2332	10722	52	6395	3906
26	2438	18253	53	6635	3768
27	2547	9814	54	6882	3632

<i>gr.</i>	<i>alt.</i>	<i>subl.</i>	<i>gr.</i>	<i>alt.</i>	<i>subl.</i>
51	7141	3500	73	16355	1528
56	7413	3372	74	17405	1434
57	7699	3247	75	18660	1339
58	8002	3124	76	20056	1246
59	8336	3008	77	21701	1154
60	8659	2887	78	23518	1062
61	9020	2772	79	25720	972
62	9404	2658	80	28356	881
63	9814	2547	81	31565	792
64	10253	2438	82	35573	702
65	10722	2332	83	40716	614
66	11230	2226	84	47573	525
67	11878	2122	85	57142	437
68	12376	2020	86	71531	349
69	13025	1919	87	95802	262
70	13736	1820	88	142450	175
71	14522	1722	89	286533	87
72	15388	1624	90	<i>infinita</i>	

PROPOS. XIV. PROBL. V.

Altitudines, atque sublimitates semiparabolarum, quarum amplitudines aequales futurae sint, per singulos elevationis gr. reperire.

Hæc omnia facili negotio consequemur. Posita enim semiparabolæ amplitudine partium semper 10000, medietas tangentis cujuslibet gradus elevationis altitudinem exhibet. Ut exempli grat. semiparabolæ, cujus elevatio sit gr. 30. amplitudo vero, ut ponitur, partium 10000, altitudo erit 2887, tanta enim est proxime medietas tangentis. Inventa autem altitudine, sublimitatem eliciemus tali pacto. Cum demonstratum sit dimidiam amplitudinem, semiparabolæ mediam esse proportionalem inter altitudinem, et sublimitatem, sitque altitudo jam reperta, medietas vero amplitudinis semper eadem, partium scilicet 5000, si hujus quadratum per altitudinem datam dividerimus, sublimitas quæsitæ exurgit. Ut in exemplo. Altitudo reperta fuit 2887, Quadratum partium 5000 est 25000000. quod divisum per 2887 dat 8659 proxime pro sublimitate quæsitæ.

Salv. Or qui si vede primieramente, come è verissimo il concetto accennato di sopra, che nelle diverse elevazioni, quanto più si allontanano dalla media, o sia nelle più alte, o nelle più basse, tanto si ricerca maggiore impeto, e violenza per cacciar il progetto nella medesima lontananza. Imperocchè consistendo l'impeto nella mistione dei due moti, orizzontale equabile, e perpendicolare naturalmente accelerato, del quale impeto viene ad esser misura l'aggregato dell'altezza, e della sublimità, vedesi dalla proposta tavola tale aggregato esser minimo nell'elevazione di grad. 45, dove l'altezza, e la sublimità sono eguali, cioè 5000 ciascheduna; e l'aggregato loro 10000. Che se noi cercheremo ad altra maggiore altezza, come per esempio di grad. 50. troveremo l'altezza esser 5959, e la sublimità 4196, che giunti insieme sommano 10155. E tanto troveremo parimente esser l'impeto di grad. 40, essendo questa, e quella elevazione egualmente lontane dalla media. Dove dobbiamo secondariamente notare esser vero, che eguali impeti si ricercano a due a due delle elevazioni distanti egualmente dalla media, con questa bella alternazione di più; che l'altezze, e le sublimità delle superiori elevazioni contrariamente rispondono alle sublimità, ed altezze delle inferiori: sicchè dove nell'esempio proposto nell'elevazione di 50 grad. l'altezza è 5959, e la sublimità 4196. nel-

l'elevazione di grad. 40 accade all'incontro l'altezza esser 4195 e la sublimità 5559. e l'istesso accade in tutte l'altre senza veruna differenza: se non in quanto per fuggire il tedio del calcolare non si è tenuto conto di alcune frazioni, le quali in somme così grandi non sono di momento, nè di pregiudizio alcuno.

Sagr. Io vo osservando, come delli due impeti orizzontale, e perpendicolare nelle proiezioni, quanto più sono sublimi, tanto meno vi si ricerca dell'orizzontale, e molto del perpendicolare. All'incontro nelle poco elevate, grande bisogna che sia la forza dell'impeto orizzontale, che a poca altezza dee cacciar il progetto. Ma sebben io capisco benissimo, che nella totale elevazione di gr. 90. per cacciare il progetto un sol dito lontano dal perpendicolo, non basta tutta la forza del mondo: ma necessariamente dee egli ricadere nell'istesso luogo, onde fu cacciato; non però con simil sicurezza ardirei di affermare, che anco nella nulla elevazione, cioè nella linea orizzontale, non potesse da qualche forza, benchè non infinita, esser in alcuna lontananza spinto il progetto. Sicchè per esempio nè anco una Colubrina sia potente a spingere una palla di ferro orizzontalmente, come dicono, di punto bianco, cioè di punto niuno, che è dove non si dà elevazione. Io dico, che in questo caso resto con qualche ambigui-

tà: e che io non neghi risolutamente il fatto, mi ritiene un altro accidente, che par non meno strano, e pure ne ho la dimostrazione concludente necessariamente. E l'accidente è l'esser impossibile distendere una corda, sicchè resti tesa dirittamente, e parallela all'orizzonte, ma sempre fa sacca, e si piega, nè vi è forza, che basti a tenderla rettamente.

Salv. Adunque, Sig. Sagr. in questo caso della corda cessa in voi la maraviglia circa la stravaganza dell'effetto, perchè ne avete la dimostrazione. Ma se noi ben considereremo, forse troveremo qualche corrispondenza tra l'accidente del progetto, e questo della corda. La curvità della linea del progetto orizzontale par che derivi dalle due forze, delle quali una (che è quella del projciente) lo caccia orizzontalmente, e l'altra (che è la propria gravità) lo tira in giù a piombo. Ma nel tender la corda vi sono le forze di coloro, che orizzontalmente la tirano, e vi è ancora il peso dell'istessa corda, che naturalmente inclina al basso. Son dunque queste due generazioni assai simili. E se voi date al peso della corda tanta possanza, ed energia di poter contrastare, e vincer qualsivoglia immensa forza, che la voglia distendere dirittamente, perchè vorrete negarla al peso della palla? Ma più voglio dirvi, recandovi insieme maraviglia, e diletto, che la corda così tesa, e poco, o molto tirata,

si piega in linee, le quali assai si avvicinano alle paraboliche, e la similitudine è tanta, che se voi segnerete in una superficie piana, ed eretta all'orizzonte una linea parabolica, e tenendola inversa, cioè col vertice in giù, e colla base parallela all'orizzonte, facendo pendere una catenella sostenuta nelle estremità della base della segnata parabola, vedrete allentando più, o meno la detta catenuzza incurvarsi, e adattarsi alla medesima parabola; e tale adattamento tanto più esser preciso, quanto la segnata parabola sarà men curva, cioè più distesa; sicchè nelle parabole descritte con elevazioni sotto ai grad. 45 la catenella cammina quasi *ad unguem* sopra la parabola.

Sagr. Adunque con una tal catena sottilmente lavorata si potrebbero in un subito punteggiar molte linee paraboliche sopra una piana superficie.

Salv. Potrebbe, ed ancora con qualche utilità non piccola, come appresso vi dirò.

Simp. Ma prima che passar più avanti, vorrei pur io ancora restar assicurato almeno di quella proposizione, della quale voi dite essercene dimostrazione necessariamente concludente, dico dell'esser impossibile per qualunque immensa forza fare star tesa una corda drittamente, ed equidistante all'Orizzonte.

Sagr. Vedrò se mi sovviene della dimostrazione, per intelligenza della quale bisogna Sig. Simp. che voi supponghiate per vero quello, che in tutti gli strumenti meccanici non solo coll'esperienza, ma colla dimostrazione ancora si verifica; e questo è, che la velocità del movente, benchè di forza debole, può superare la resistenza, benchè grandissima, di un resistente, che lentamente debba esser mosso, tuttavolta che maggior proporzione abbia la velocità del movente alla tardità del resistente, che non ha la resistenza di quel che debbe esser mosso alla forza del movente.

Simp. Questo mi è notissimo, e dimostrato da Aristotile nelle sue questioni meccaniche, e manifestamente si vede nella leva, e nella stadera, dove il romano, che non pesi più di 4 libbre, leverà un peso di 400, mentre che la lontananza di esso romano dal centro, sopra il quale si volge la stadera, sia più di cento volte maggiore della distanza dal medesimo centro di quel punto, dal quale pende il gran peso: e questo avviene, perchè nel calar che fa il romano, passa spazio più di cento volte maggiore dello spazio, per lo quale nel medesimo tempo monta il gran peso. Che è l'istesso che dire, che il piccolo romano si muove con velocità più, che cento volte maggiore della velocità del gran peso.

Sagr. Voi ottimamente discorrete, e non mettete dubbio alcuno nel concedere, che per piccola che sia la forza del movente, supererà qualsivoglia gran resistenza, tutta volta che quello più avanzi di velocità, che ei non cede di vigore, e gravità. Or venghiamo al caso della corda. E segnando un poco di figura intendete per ora questa linea A B (Fig. xx.) passando sopra i due punti fissi, e stabili A, B aver nelle estremità sue pendenti, come vedete, due immensi pesi C, D, li quali tirandola con grandissima forza la facciano star veramente tesa dirittamente, essendo essa una semplice linea senza veruna gravità. Or qui vi soggiungo, e dico, che se dal mezzo di quella, che sia il punto E, voi sospenderete qualsivoglia piccolo peso, quale sia questo H; la linea A B cederà, ed inclinando verso il punto F, ed in conseguenza allungandosi costringerà i due gravissimi pesi C, D a salire in alto: il che in tal guisa vi dimostro. Intorno ai due punti A, B, come centri, descrivo due quadranti E F G, E L M; ed essendo che li due semidiametri A I, B L sono eguali alli due A E, E B, gli avanzi F I, F L saranno le quantità degli allungamenti delle parti A F, F B, sopra le A E, E B; ed in conseguenza determinano le salite dei pesi C, D, tuttavolta però che il peso H avesse avuto facoltà di calare in F. Il che allora potrebbe seguire, quando la linea E

F, che è la quantità della scesa di esso peso H, avesse maggior proporzione alla linea F I, che determina la salita dei due pesi C, D; che non ha la gravità di amendue essi pesi alla gravità del peso H. Ma questo necessariamente avverrà, sia pur quanto si voglia massima la gravità dei pesi C, D, e minima quella dell' H. Imperocchè non è sì grande l'eccesso dei pesi C, D sopra il peso B, che maggiore non possa essere a proporzione l'eccesso della tangente E F sopra la parte delle secante F I. Il che proveremo così: sia il cerchio, il cui diametro G I: e qual proporzione ha la gravità dei pesi C, D alla gravità di H, tale l'abbia la linea B O ad un'altra, che sia C, della quale sia minore la D, sicchè maggior proporzione avrà la B O alla D, che alla C; prendasi dalle due O B, D la terza proporzionale B E, e come O E ad E B, così si faccia il diametro G I (prolungandolo) all' I F, e dal termine F tirisi la tangente F N. E perchè si è fatto, come O E ad E B, così G I ad I F, sarà componendo, come O B a B E, così G F ad F I. Ma tra O B, e B E media la D, e tra G F, F I media la N F; adunque N F alla F I ha la medesima proporzione, che la O B alla D, la qual proporzione è maggiore di quella dei pesi C D al peso H. Avendo dunque maggior proporzione la scesa, o velocità del peso H alla salita, o velocità dei pesi

C, D, che non ha la gravità di essi pesi C, D alla gravità del peso H; resta manifesto, che il peso H descenderà, cioè la linea A B partirà dalla rettitudine orizzontale. E quel che avviene alla retta A B priva di gravità mentre si attacchi in E qualsivoglia minimo peso H, avviene all' istessa corda A B intesa di materia pesante, senza l'aggiunta di alcun altro grave; poichè vi si sospende il peso istesso della materia componente essa corda A B.

Simp. Io resto soddisfatto a pieno; però potrà il Sig. Salv. conforme alla promessa esplicarci, qual sia l'utilità, che da simile catenella si può ritrarre, e dopo questo arrecarci quelle speculazioni, che dal nostro Accademico sono state fatte intorno alla forza della percossa.

Salv. Assai per questo giorno ci siamo occupati nelle contemplazioni passate, l'ora, che non poco è tarda, non ci basterebbe a gran segno per disbrigarci dalle nominate materie; però differiremo il congresso ad altro tempo più opportuno.

Sagr. Concorro col parere di V. S. perchè da diversi ragionamenti avuti con amici intrinseci del nostro Accademico ho ritratto, questa materia della forza della percossa essere oscurissima, nè di quella sin ora esserne, da chiunque ne ha trattato, penetrato i suoi ricetti pieni di tenebre, ed alieni in tutto e per tutto dalle prime immaginazioni umane; e tra le con-

olusioni sentite profferire me ne resta in fantasia una stravagantissima, cioè, che la forza della percossa è indeterminata, per non dire infinita. Aspetteremo dunque la comodità del Sig. Salv. Ma intanto dicami che materie son queste, che si vedono scritte dopo il trattato dei progetti?

Salv. Queste sono alcune proposizioni attenenti al centro di gravità dei solidi, le quali in sua gioventù andò ritrovando il nostro Accademico, parendogli, che quello, che in tal materia aveva scritto Federigo Comandino, non mancasse di qualche imperfezione. Credette dunque con queste proposizioni, che qui vedete scritte, poter supplire a quello, che si desiderava nel libro del Comandino, ed applicossi a questa contemplazione ad istanza dell' Illustriss. Signor Marchese Cuid' Ubaldo del Monte grandissimo Matematico de' suoi tempi, come le diverse sue opere pubblicate ne mostrano, ed a quel Sig. ne dette copia con pensiero di andar seguitando cotal materia anco negli altri solidi non tocchi dal Comandino, ma incontratosi dopo alcun tempo nel libro del Sig. Luca Valerio, massimo Geometra, e veduto, come egli risolve tutta questa materia senza niente lasciare indietro, non seguì più avanti, benchè le aggressioni sue sieno per istrade molto diverse da quelle del Sig. Valerio.

Sagr. Sarà bene dunque, che in questo tempo, che s'intermette tra i nostri passati, ed i futuri congressi, V. S. mi lasci nelle mani il libro, che io tra tanto anderò vedendo, e studiando le proposizioni conseguentemente scrittevi.

Salv. Molto volentieri eseguisco la vostra domanda, e spero, che V. S. prenderà gusto di tali proposizioni.

APPENDIX,

In qua continentur Theoremata, eorumque demonstrationes, quae ab eodem Auctore circa centrum gravitatis solidorum olim conscripta fuerunt.

POSTULATUM.

Petimus æqualium ponderum] similiter in diversis libris dispositorum, si horum quidem compositorum centrum gravitatis libram secundum aliquam rationem dividerit, et illorum etiam gravitatis centrum libram secundum eandem rationem dividere.

LEMMA.

Sit linea A B (Fig. xxii.) bifariam in C secta, cujus medietas A C divisa sit in E, ita ut quam rationem habet B E. ad E A, hanc habeat A E ad E C. Dico B E

ipsius $E A$ duplam esse. Quia enim ut $B E$ ad $E A$, ita $E A$ ad $E C$; erit componendo, et permutando, ut $B A$ ad $A C$, ita $A E$ ad $E C$, est autem ut $A E$ ad $E C$, nempe ut $B A$ ad $A C$, ita $B E$ ad $E A$, quare $B E$ ipsius $E A$ dupla est.

His positis demonstratur; si magnitudines quotcumque sese aequaliter excedentes, et quarum excessus earum minimae sint aequales, ita in libra disponantur, ut ex distantis aequalibus pendeant, centrum gravitatis omnium libram ita dividere, ut pars versus minores reliquae sit dupla.

In Libra itaque $A B$ (Fig. xxiii.) ex distantis aequalibus pendeant quotcumque numero magnitudines F, G, H, K, N , quales dictum est, quarum minima sit N ; sintque puncta suspensionum A, C, D, E, B , sitque omnium magnitudinum sic dispositarum gravitatis centrum X . Ostendendum est partem libræ $B X$ versus minores magnitudines reliquæ $X A$ duplam esse.

Dividatur libra bifariam in puncto D ; quod vel in aliquo puncto suspensionum, vel in duarum suspensionum medio cadet necessario, reliquæ vero suspensionum distantiae, quæ inter A et D intercipiuntur,

omnes bifariam dividantur punctis M, I; magnitudines deinde omnes in partes ipsi N æquales dividantur: erunt jam partes ipsius F tot numero, quot sunt, quæ ex libra pendent magnitudines, partes vero ipsius G erunt una pauciores, et sic de reliquis. Sint itaque ipsius F partes N, O, Y, S, T, ipsius G vero N, O, Y, S, ipsius H quoque N, O, Y, ipsius denique K sint N, O; eruntque magnitudines omnes, in quibus N ipsi F æquatur; magnitudines vero omnes, in quibus O ipsi G æquatur; et magnitudines, in quibus Y ipsi H; illæ autem, in quibus S ipsi K, et magnitudo T ipsi N æqualis est. Quia igitur magnitudines omnes, in quibus N inter se sunt æquales, æque ponderabunt in signo D, quod libram A B bifariam dividit, et eandem ob causam omnes magnitudines, in quibus O æque ponderant in I, illæ autem, in quibus Y in C, et in quibus S in M, æque ponderant; T autem in A suspenditur. Sunt igitur in libra A D, ex distantibus æqualibus D, I, C, M, A suspensæ magnitudines, sese æqualiter excedentes, et quarum excessus minimæ æquatur: maxima autem, quæ est composita ex omnibus N, pendet ex D; minima, quæ est T, pendet ex A, et reliquæ ordinate dispositæ sunt. Estque rursus alia libra A B; in qua magnitudines aliæ prædictis numero, et magnitudine æquales eodem ordine dispositæ sunt. Quare libræ A B, A D a centris om-

nium magnitudinum secundum eandem rationem dividuntur. Est autem centrum gravitatis dictarum magnitudinum X : quare X dividit libras $B A$, $A D$ sub eadem ratione: ita ut sicut $B X$ ad $X A$, ita $X A$ ad $X D$; quare $B X$ dupla est ipsius $X A$ ex lemmate supra posito. Quod erat probandum.

Si conoidi parabolico figura inscribatur, et altera circumscribatur ex cylindris aequalem altitudinem habentibus, et axis dicti conoidis dividatur, ita ut pars ad verticem partis ad basin sit dupla: centrum gravitatis inscriptae figurae basi portionis dicto puncto divisionis erit propinquius: centrum autem gravitatis circumscriptae a basi conoidis eodem puncto erit remotius; eritque utrorumque centrorum a tali puncto distantia aequalis lineae, quae sit pars sexta altitudinis unius cylindri, ex quibus figurae constant.

Sit itaque conoidale parabolicum, et figurae, quales dictae sunt, altera sit inscripta, altera circumscripta, et axis conoidis qui sit $A E$ (Fig. xxv.) dividatur in N , ita ut $A N$ ipsius $N E$ sit dupla. Ostendendum est centrum gravitatis inscriptae figurae esse in linea $N E$, circumscriptae autem centrum esse in $A N$. Secentur figurae ita dispositae plano per axem, et sit sectio parabolae $B A C$; plani autem secantis, et basis conoidis sectio sit $B C$ linea; cylindrorum autem sectiones sint rectangulae fi-

guræ: ut in descriptione apparet: primus itaque cylindrus inscriptorum, cujus axis est $D E$, ad cylindrum, cujus axis est $D Y$, eandem habet rationem quam quadratum $O D$ ad quadratum $S Y$, hoc est, quam $D A$ ad $A Y$: cylindrus autem, cujus axis est $D Y$, ad cylindrum $Y Z$ est ut $S Y$ ad $R Z$ potentia; hoc est, ut $Y A$ ad $A Z$, et eadem ratione cylindrus, cujus axis est $Z Y$, ad eum, cujus axis est $Z V$, est ut $Z A$ ad $A V$, dicti itaque cylindri sunt inter se ut lineæ $D A$, $A Y$; $Z A$, $A V$: istæ autem sese æqualiter excedentes, et est excessus æqualis minimæ, ita ut $A Z$ dupla sit ad $A V$, $A Y$ autem ejusdem est tripla, et $D A$ quadrupla; sunt igitur dicti cylindri magnitudines quædam sese ad invicem æqualiter excedentes, quarum excessus æquantur earum minimæ, et est linea $X M$, in qua ex distantiiis æqualibus suspensæ sunt. (unumquodque enim cylindrorum centrum gravitatis habet in medio axis) quare per ea quæ superius demonstrata sunt centrum gravitatis magnitudinis ex omnibus compositæ dividet lineam $X M$, ita ut pars ad X reliquæ sit dupla. Dividatur itaque, et sit $X \alpha$ ipsius αM dupla; est ergo α centrum gravitatis inscriptæ figuræ. Dividatur $A V$ bifariam in s ; erit $s X$ dupla ipsius $M E$; est autem $X \alpha$ dupla ipsius αM ; quare $s E$ tripla erit $E \alpha$; est autem $A E$ tripla ipsius $E N$: constat ergo, $E N$ majorem esse quam $E \alpha$.

et ideo α , quod est centrum figuræ inscriptæ, magis accedere ad basin conoidis quam N; et quia est ut A E ad E N, ita ablatum ε E ad ablatum E α ; erit et reliquum ab reliquum, idest, A ε ad N α , ut A E ad E N. Est ergo α N tertia pars ipsius A ε , et sexta ipsius a V. Eodem autem pacto cylindri circumscriptæ figuræ demonstrabuntur esse sese æqualiter excedentes, et esse excessus æquales minimo, et habere in linea ε M centra gravitatum in distantis æqualibus. Si itaque dividatur ε M in π , ita ut $\varepsilon \pi$ reliquæ π M sit dupla; erit π centrum gravitatis totius circumscriptæ magnitudinis, et cum $\varepsilon \pi$ dupla sit ad π M; A ε autem minor sit quam dupla ad E M: (cum ei sit æqualis:) erit tota A E minor quam tripla ipsius E π ; quare E π major erit ipsa E N, et cum ε M tripla sit ad M π , et M E eum duabus ε A similiter tripla sit ad M E; erit tota A E cum A ε tripla ad E π , est autem A E tripla ad E N; quare reliqua A ε reliquæ π N tripla erit. Est igitur N π sexta pars ipsius A V. Hæc autem sunt, quæ demonstranda fuerunt. Ex his manifestum est, posse conoidi parabolico figuram inscribi; et alteram circumscribi, ita ut centra gravitatum earum a puncto N minus quacunque proposita linea distent. Si enim sumatur linea propositæ lineæ sexcupla, fiantque cylindrorum axes, ex quibus figuræ componuntur hac sumpta linea minores; erunt, quæ inter harum figu-

rarum centra gravitatum, et signum N cadunt, lineæ proposita linea minores.

ALITER IDEM.

Axis conoidis, qui sit $C D$ (Fig. xxv.) dividatur in O , ita ut $C O$, ipsius $O D$ sit dupla. Ostendendum est, centrum gravitatis inscriptæ figuræ esse in linea $O D$; circumscriptæ vero centrum esse in $C O$. Secentur figuræ plano per axem, et C , ut dictum est. Quia igitur cylindri $S N$, $T M$; $V I$, $X E$, sunt inter se, ut quadrata linearum $S D$, $T N$, $V M$, $X I$; hæc autem sunt inter se, ut lineæ $N C$, $C M$, $C I$, $C E$; hæc autem sunt sese æqualiter excedentes, et excessus æquantur minimæ, nempe $C E$; estque cylindrus $T M$ cylindro $Q N$ æqualis; cylindrus autem $V I$ ipsi $P N$, et $X E$ ipsi $L N$ æquatur; ergo cylindri $S N$, $Q N$, $P N$, $L N$, sunt sese æqualiter excedentes, et excessus æquantur minimo, eorum nempe cylindro $L N$. Est autem excessus cylindri $S N$ super cylindrum $Q N$ anulus, cujus altitudo est $Q T$, hoc est $N D$; latitudo autem $S Q$: excessus autem cylindri $Q N$ super $P N$ est anulus, cujus latitudo est $Q P$, excessus autem cylindri $P N$ super $L N$ est anulus, cujus latitudo $P L$. Quare dicti anuli $S Q$, $Q P$, $P L$, sunt inter se æquales, et cylindro L

N. Anulus igitur S T æquatur cylindro X E; anulus Q V, qui ipsius est duplus, æquatur cylindro V I, qui similiter cylindri X E duplus est, et eandem ob causam anulus P X cylindro T M, et cylindrus L E cylindro S N æqualis erit. In libra itaque K F puncta media rectarum E I, D N connectente, et in partes æquales punctis H, G secta, sunt magnitudines quædam, nempe cylindri S N, T M, V I, X E, et gravitatis centrum primi cylindri est K; secundi vero est H; tertii G; quarti F. Habemus autem et aliam libram M K; quæ est ipsius F K dimidia, totidemque punctis in partes æquas distributa, nempe M H, H N, N K, et in ea aliæ magnitudines illis, quæ sunt in libra F K, numero et magnitudine æquales, et centra gravitatum in signis M, H, N, K habentes, et eodem ordine dispositæ sunt: cylindrus enim L E centrum gravitatis habet in M, et æquatur cylindro S N centrum habenti in K: anulus vero P X centrum habet H, et æquatur cylindro T M, cuius centrum est H, et anulus Q V, centrum habens N, æquatur cylindro V I, cuius centrum est G; et denique anulus S T, centrum habens K, æquatur cylindro X E, cuius centrum est F. Igitur centrum gravitatis dictarum magnitudinum libram dividet in eadem ratione: earundem vero unum est centrum, ac propterea punctum aliquod utrique libræ commune, quod sit Y. Itaque F Y ad Y K erit

ut KY ad YM ; est ergo FY dupla ipsius
 YK ; et divisa CE bifariam in Z ; erit Z
 F dupla ipsius KD ; ac propterea ZD tri-
 pla ipsius DY ; rectæ vero DO tripla est
 CD ; major est ergo recta DO , quam D
 Y ; ac propterea Y centrum inscriptæ ma-
 gis ad basim accedit, quam punctum O .
 Et quia, ut CD ad DO , ita est ablatum
 ZD ad ablatum DY ; erit et reliquum CZ
 ad reliquum YO , ut CD ad DO ,
 nempe YO tertia pars erit ipsius CZ ;
 hoc est pars sexta ipsius CE . Eadem pro-
 prius ratione demonstrabimus, cylindros cir-
 cumscriptæ figuræ sese æqualiter excedere,
 et esse excessus æquales minimo, et ipso-
 rum centra gravitatum in distantis æquali-
 bus libræ KZ constituta, et pariter anulos
 iisdem cylindris æquales similiter disponi
 in altera libra KG ipsius KZ dimidia,
 ac propterea circumscriptæ gravitatis cen-
 trum, quod sit R , libras ita dividere, ut
 ZR ad RK sit, ut KR ad RG . Erit
 ergo ZR dupla ipsius RK ; CZ vero
 rectæ KD æqualis est, et non dupla; erit
 tota CD minor quam tripla ipsius DR ;
 quare recta DR major est quam DO ,
 scilicet centrum circumscriptæ a basi ma-
 gis recedit quam punctum O . Et quia ZK
 tripla est ad KR , et KD cum duabus Z
 C tripla ad KD ; erit tota CD cum CZ
 tripla ipsius DR ; est autem CD tripla ad
 DO , quare reliqua CZ reliquæ RO tri-

pla erit; scilicet $O R$ sexta pars est ipsius $E C$. Quod est propositum.

His autem prædemonstratis demonstratur, centrum gravitatis parabolici conoidis axem ita dividere ut pars ad verticem reliquæ ad basim sit dupla.

Esto parabolicum conoidale, cujus axis sit $A B$ (Fig. xxvi) divisus in N , ita ut $A N$ ipsius $N B$ sit dupla. Ostendendum est, centrum gravitatis conoidis esse N punctum; si enim non est N , aut infra ipsum, aut supra ipsum erit. Sit primum infra, sitque X , et exponatur linea $L O$ ipsi $N X$ æqualis, et $L O$ contingenter dividatur in S et quam rationem habet utraque simul $B X$, $O S$, ad $O S$, hanc habeat conoidale ad solidum Y , et inscribatur conoidi figura ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, ita ut quæ inter illius centrum gravitatis, et punctum N intercipitur, minor sit quam $L S$, excessus autem, quo a conoide superatur, minor sit solido Y ; hoc autem fieri posse, clarum est. Sit itaque inscripta, cujus gravitatis centrum sit I ; erit jam $I X$ major $S O$: et quia est, ut $X B$ cum $S O$, ad $S O$, ita conoidale ad Y ; (est autem Y majus excessu quo conoidale figuram inscriptam superat;) erit conoidalis ad dictum excessum proportio major quam utriusque $B X$, $O S$, ad $S O$, et dividendo figura inscripta ad dictum excessum majorem rationem habebit quam $B X$ ad $S O$: habet autem $B X$, ad $X I$ proportionem

adhuc minorem quam ad $S O$: inscripta igitur figura ad reliquas portiones multo maiorem proportionem habebit quam $B X$ ad $X I$: quam igitur proportionem habet inscripta figura ad reliquas portiones, alia quædam linea habebit ad $X I$; quæ necessario major erit quam $B X$. Sit igitur $M X$. Habemus itaque centrum gravitatis conoidis X : figuræ autem in ipso inscriptæ centrum gravitatis est I ; reliquarum ergo portionum quibus conoidale inscriptam figuram excedit gravitatis centrum erit in linea $X M$, atque in eo ipsius puncto in quo sic terminata fuerit at, quam proportionem habet inscripta figura ad excessum, quo a conoide superatur, eandem ipsam habeat ad $X I$. Ostensum autem est, hanc proportionem esse illam quam habet $M X$ ac $X I$: erit ergo M gravitatis centrum earum portionum, quibus conoidale excedit inscriptam figuram, quod certe esse non potest; nam, si per M ducatur planum basi conoidis æquidistans, erunt omnes dictæ portiones versus eandem partem, nec ab eo dividuntur. Non est igitur gravitatis centrum ipsius conoidis infra punctum N . Sed neque supra. Sit enim, si fieri potest, H , et rursus, ut supra, exponatur linea $L O$, æqualis ipsi $H N$, et contingenter divisa in S : et quam proportionem habet utraque simul $B N$, $S O$ ad $S L$; hanc habeat conoidale ad Y , et conoidali circumscribatur figura ex cylindris, ut dictum est, a qua minori

quantitate excedatur, quam sit solidum Y , et linea inter centrum gravitatis circumscriptæ, et signum N sit minor quam SO : erit residua VH major quam LS ; et quia est, ut utraque BN , OS ad SL , ita conoidale ad Y ; (est autem Y majus excessu, quo conoidale a circumscripta superatur: ergo BN , SO , ad SL minorem rationem habet quam conoidale ad dictum excessum. Est autem BN minor quam utraque BN , SO : VH autem major quam SL ; multo igitur majorem rationem habet conoidale ad dictas portiones quam BV ad VH ; quam igitur rationem habet conoidale ad easdem portiones, hanc habebit ad VH linea major ipsa BV . Habeat; sitque ea MV , et quia centrum gravitatis circumscriptæ figuræ est V , centrum vero conoidis est H , atque est, ut conoidale ad residuas portiones, ita MV ad VH , erit M centrum gravitatis residuarum portionum: quod similiter est impossibile. Non est ergo centrum gravitatis conoidis supra punctum N . Sed demonstratum est quod neque infra; restat ergo, ut in ipso N sit necessario. Et eadem ratione demonstrabitur de conoide plano super axe non erecto secto. Aliter idem, ut constat in sequenti, centrum gravitatis conoidis parabolici inter centrum circumscriptæ figuræ, et centrum inscriptæ cadit.

Sit conoidale, cujus axis AB (Fig. xxvii.) et centrum circumscriptæ sit C , inscriptæ

vero sit O . Dico, centrum conoidis inter C , O puncta esse; nam si non, infra, vel supra, vel in altero eorum erit. Sit infra, ut in R , et quia R est centrum gravitatis totius conoidis, inscriptæ autem figuræ est gravitatis centrum O : reliquarum ergo portionum, quibus inscripta figura a conoide superatur, centrum gravitatis erit in linea OR ad partes R extensa, atque in eo puncto, in quo sic terminatur, ut quam rationem habent dictæ portiones ad inscriptam, eandem habeat OR ad lineam inter R , et punctum illud cadentem. Sit hæc ratio illa, quam habet OR ad RX . Aut igitur X cadet extra conoidem, aut intra, aut in ipsa basi. Si vel extra, vel in basi cadat, jam manifestum est absurdum: cadat intra, et quia XR ad RO est ut inscripta figura ad excessum, quo a conoide superatur, rationem illam, quam habet BR ad RO , eandem habeat inscripta figura ad solidum H , quod necessario minus erit dicto excessu. Et inscribatur alia figura, quæ a conoide superetur minori quantitate quam sit H ; cujus gravitatis centrum cadet intra OC : Sit V . Et quia prima figura ad H est, ut BR ad RO : secunda autem figura, cujus centrum V major est prima, et a conoide exceditur minori quantitate quam sit H ; quam rationem habet secunda figura ad excessum, quo a conoide superatur, hanc habebit ad RU linea major ipsa BR . Est autem R centrum gravitatis conoidis; in-

scriptæ autem secundæ V: centrum ergo reliquarum portionum erit extra conoides infra B, quod est impossibile. Et eodem pacto demonstrabitur, centrum gravitatis ejusdem conoidis non esse in linea C A. Quod autem non sit alterum punctorum C, O, manifestum est. Si enim dicas esse, descriptis aliis figuris, inscripta quidem majori illa, cujus centrum O, circumscripta vero minore ea, cujus centrum C, centrum conoidis extra harum figurarum centrum caderet, quod nuper impossibile esse conclusum est. Restat ergo, ut inter centrum circumscriptæ, et inscriptæ figuræ sit. Quod si ita est, necessario erit in signo illo, quod axem dividit ut pars ad verticem reliquæ sit dupla, cum enim circumscribi, et inscribi possint figuræ, ita ut, quæ inter ipsarum centrum, et dictum signum cadunt lineæ, quacunque linea sint minores, aliter dicentem ad impossibile deduceremus, quod scilicet centrum conoidis non intra inscriptæ, et circumscriptæ centra caderet.

Si fuerint tres lineæ proportionales, et quam proportionem habet minima ad excessum, quo maxima minimam superat, eandem habeat linea quædam sumpta ad duas tertias excessus, quo maxima mediam superat, et item quam proportionem habet composita ex maxima, et dupla mediæ ad compositam ex tripla maximæ, et mediæ, eandem habuerit alia linea sum-

*pta ad excessum quo maxima mediam
excedit; erunt ambæ lineæ sumptæ simul,
tertia pars maxima proportionalium.*

Sint tres lineæ proportionales $A B$, $B C$, $B F$ (Fig. xxviii.) et quam proportionem habet $B F$ ad $F A$, hanc habeat $M S$ ad duas tertias ipsius $C A$, quam vero proportionem habet composita ex $A B$, et dupla $B C$ ad compositam ex tripla utriusque $A B$, $B C$, eandem habeat alia, nempe $S N$ ad $A C$. Demonstrandum est, $M N$ tertiam esse partem ipsius $A B$. Quia itaque $A B$, $B C$, $B F$; sunt proportionales, erunt etiam $A C$, $C F$, in eadem ratione; est igitur, ut $A B$ ad $B C$, ita $A C$ ad $C F$, et ut tripla $A B$ ad triplam $B C$, ita $A C$ ad $C F$. Quam itaque rationem habet tripla $A B$ cum tripla $B C$ ad triplam $A B$, hanc habebit $A C$ ad lineam minorem ipsa $C F$. Sit illa $C O$. Quare componendo, et per conversionem proportionis, $O A$ ad $A C$ eandem habebit rationem, quam tripla $A B$ cum sexcupla $B C$ ad triplam $A B$ cum tripla $B C$; habet autem $A C$ ad $S N$ eandem rationem, quam tripla $A B$ cum tripla $B C$ ad $A B$ cum dupla $B C$; ex æquali igitur $O A$ ad $N S$ eandem habebit rationem, quam tripla $A B$ cum sexcupla $B C$ ad $A B$ cum dupla $B C$; verum tripla $A B$ cum sexcupla $B C$ triplæ sunt ad $A B$ cum dupla $B C$; ergo $A O$ tripla est ad $S N$.

Rursus quia OC ad CA est ut tripla CB ad triplam AB cum tripla CB : est autem, sicut CA ad CF , ita tripla AB ad triplam BC , ex æquali ergo in proportionē perturbata, ut OG ad CF , ita erit tripla AB ad triplam AB cum tripla BC : et per conversionem rationis, ut OF ad FC , sic tripla BC ad triplam AB cum tripla BC : est autem, sicut CF ad FB , ita AC ad CB , et tripla AC ad triplam BC . Ex æquali igitur, in proportionē perturbata, ut OF ad FB , ita tripla AC ad triplam utriusque simul AB , BC . Tota igitur OB ad BF , erit, ut sexcupla AB ad triplam utriusque AB , AC ; et quia FC , CA in eadem sunt ratione, et CB , BA , erit sicut FC ad CA , ita BC ad BA , et componendo ut FA ad AC , ita utraque BA , BC ad BA , et sic tripla ad triplam: ergo ut FA ad AC , ita composita ex tripla BA et tripla BC ad triplam AB , quare sicut FA ad duas tertias ipsius AC , sit composita ex tripla BA , et tripla BC ad duas tertias triplæ BA : hoc est, ad duplam BA : sed sicut FA ad duas tertias ipsius AC , ita FB ad MS . Sicut ergo FB ad MS , ita composita ex tripla BA , et tripla BC ad duplam BA ; verum sicut OB ad FB , ita erat sexcupla AB ad triplam utriusque AB , BC ; ergo ex æquali OB ad MS eandem habebit rationem quam sexcupla AB ad duplam BA , quare MS erit tertia pars ip-

sius O B. Et demonstratum est, S N tertiam esse partem ipsius A O, constat ergo, M N ipsius A B tertiam similiter esse partem, et hoc est, quod demonstrandum fuit.

Cujuslibet frustj a cōnoide parabolico abscissi centrum gravitatis est in linea recta, quæ frusti est axis; quâ in tres æquas partes divisa centrum gravitatis in media existit, eamque sic dividit, at pars versus minorem basim ad partem versus majorem basim, eandem habeat rationem quam major basis ad basim minorem.

A conoide, cujus axis R B (Fig. xxx.) abscissum sit solidum, cujus axis B E, et planum abscindens sit basi æquidistans, secetur autem altero plano per axem super basim erectum, sitque, sectio parabolæ V, R, C, hujus autem, et plani secantis, et basis sectiones sint lineæ rectæ L M, V C; erit R B diameter proportionis vel diametro æquidistans; L M, V C erunt ordinatim applicatæ. Dividatur itaque E B in tres partes æquales; quarum media sit Q Y; hæc autem signo I ita dividatur, ut, quam rationem habet basis, cujus diameter V C, ad basin, cujus diameter L M; hoc est, quam habet quadratum V C ad quadratum L M; eandem habeat Q I ad I Y. Demonstrandum est, I centrum gravitatis esse frustj L M C. Exponatur linea N S æqualis ipsi B R, et S X æqualis sit E R, ipsa-

rum autem NS , SX sumatur tertia proportionalis SG , et quam proportionem habet NG ad GS , hanc habeat linea BQ ad IO . Nihil autem refert, si punctum O supra vel infra LM cadat; et quia in sectione VR C lineæ LM , VC ordinatim sunt applicatæ, erit ut quadratum VC ad quadratum LM , ita linea BR ad RE ; est autem ut quadratum VC ad quadratum LM , ita QI ad IY , et ut BR ad RE , ita NS ad SX , ergo QI ad IY est ut NS ad SX . Quare ut QY ad YI , ita erit utraque NS , SX ad SX , et ut EB ad YI , ita composita ex tripla NS , et tripla SX ad SX ; est autem, ut EB ad BY , ita composita ex tripla utriusque simul NS , SX ad compositam ex NS , SX ; ergo ut EB ad BI , ita composita ex tripla NS , et tripla SX ad compositam ex NS et dupla SX . Sunt igitur 3 lineæ proportionales, NS , SX , GS , et quam proportionem habet SG ad GN , hanc habet quædam sumpta OI ad duas tertias ipsius EB , hoc est ipsius NX ; quam autem proportionem composita ex NS , et dupla SX , ad compositam ex tripla NS , et tripla SX , eandem habet alia quædam sumpta IB ad BE , hoc est ad NX . Per ea igitur, quæ supra demonstrata sunt, erunt lineæ illæ simul sumptæ tertia pars ipsius NS ; hoc est ipsius RB ; est ergo RB tripla ipsius BO , quare O erit centrum gravitatis conoidis VR C . Sit

autem A centrum gravitatis eonoidis L R M; frusti ergo V L M C centrum gravitatis est in linea O B, atque in eo puncto, qui illam sic terminat, ut quam rationem habet V L M C frustum ad L R M portionem, eam habet linea A O ad eam, quæ inter O, et dictum punctum intercedit. Et quia R O est duæ tertiæ ipsius R B; R A vero duæ tertiæ ipsius R E: erit reliqua A O duæ tertiæ reliquæ E B, et quia est, ut frustum V L M C ad portionem L R M, ita N G ad G S, ita duæ tertiæ E B ad O I; duabus autem tertiis ipsius E B æqualis est linea A O; erit, ut frustum V L M C ad portionem L R M, ita A O ad O I. Constat igitur frusti V L M C gravitatis centrum esse punctum I, et axem ita dividere, ut pars versus minorem basin ad partem versus majorem sit, ut dupla majoris basis una cum minori ad duplam minoris una cum majori. Quod est propositum, elegantius explicatum.

Si magnitudines quotcunque ita inter se sint dispositæ, ut secunda addat super primam duplum primæ, tertia addat secundam triplum primæ, quarta vero addat super tertiam quadruplum primæ, et si unaquæque sequentium super sibi proximam addat magnitudinem primæ, multiplicem secundum numerum, quem ipsa in ordine retinuerit: si, inquam, hæc magnitudines ordinatim in libra ex distantiis

aequalibus suspendantur: centrum æquilibrium omnium compositarum libram ita dividet, ut pars versus minores magnitudines reliquæ sit tripla.

Esto libra $L T$, et magnitudines, quales dictum est, in ea pendeant, et sint A , F , G , H , K , quarum A ex T suspensa sit prima. Dico, centrum æquilibrium libram $T L$ ita secare, ut pars versus T reliquæ sit tripla. Sit $T L$ tripla ad $L I$, et $S L$ tripla $L P$, et $Q L$ ipsius $L N$, et $L P$ ipsius $L O$, erunt $I P$, $P N$, $N O$, $O L$ æquales. Et accipiat in F magnitudo ipsius A dupla, in G vero alia ejusdem tripla, in H ejusdem quadrupla, et sic deinceps, et sint sumptæ magnitudines illæ, in quibus A , et idem fiat in magnitudinibus F , G , H , K . Quoniam enim in F reliqua magnitudo, nempe B , sit æqualis A , sumatur in G ipsius dupla, in H tripla, etc. et sint hæ magnitudines sumptæ, in quibus B ; et eodem pacto sumantur illæ, in quibus C , et in quibus D , et E , erunt jam omnes, in quibus A , æquales ipsi K ; composita vero ex omnibus B æquabitur ipsi H ; composita ex C ipsi G ; ex omnibus D vero composita æquabitur F ; et E ipsi A : et quia $T I$ dupla est $I L$, erit I punctum æquilibrium magnitudinis compositæ ex omnibus A , et similiter, cum $S P$ ipsius $P L$ sit dupla, erit P punctum æquilibrium compositæ ex omnibus B , et eam-

dem ob causam N erit punctum æquilibrii compositæ ex omnibus C; O vero compositæ ex D, et L ipsius E. Est igitur libra quædam T L (Fig. xxx.), in qua ex distantibus æqualibus pendent magnitudines quædam K, H, G, F, A, et rursus est alia libra L I, in qua ex distantibus similiter æqualibus pendent totidem numero magnitudines et eodem ordine prædictis æquales, est enim composita ex omnibus A quæ pendet ex I æqualis K pendenti ex L, et composita ex omnibus B, quæ pendet ex P, æquatur H pendenti ex P; et similiter composita ex C, quæ pendet ex N, æquatur G, et composita ex D, quæ pendet ex O, æquatur F, et E pendens ex L æqualis est A. Quare libræ eadem ratione a centro compositarum magnitudinum dividuntur. Unum est autem centrum compositæ ex dictis magnitudinibus. Erit ergo punctum commune rectæ T L; et rectæ L I centrum, quod sit X. Itaque ut T X ad X L, ita erit L X ad X I, et tota T L ad L I, est autem T L ipsius L I tripla, quare, et T X ipsius X L tripla erit.

Si magnitudines quocumque ita sumantur, ut secunda addat super primam triplum primæ, tertia vero super secundam addat quintuplum primæ, quarta autem super tertiam addat septuplum primæ, et sic deinceps uniuscujusque augmentum

super sibi proximam procedat, multiplex primæ magnitudinis secundum numeros consequenter impares, sicuti procedunt quadrata linearum sese aequaliter excedentium, quarum excessus minimæ sit aequalis, et in libra ex distantis aequalibus suspendantur; omnium compositarum centrum æquilibrîi libram dividet, ut pars versus minores magnitudines reliquæ sit major quam tripla, eadem vero dempta una distantia ejusdem minor sit quam tripla.

Sint in libra B E (Fig. xxxi.) magnitudines, quales dictum est, a quibus auferantur magnitudines aliquæ inter se, ut quæ in præcedenti dispositæ fuerunt; et sint compositæ ex omnibus A, erunt reliquæ, in quibus C, eodem ordine distributæ, sed deficientes maxima. Sit E D tripla D B, et G F tripla F B; erit D centrum æquilibrîi compositæ ex omnibus A; F vero compositæ ex omnibus C, quare compositæ ex omnibus A, C, centrum cadet inter D et F. Sit O. Manifestum itaque est, E O ipsius O B majorem esse quam triplam; G O vero ejusdem O B minorem esse quam triplam. Quod demonstrandum erat.

Si cuicumque cono, vel coni portioni ex cylindris æqualem altitudinem habentibus figura una inscribatur, et altera cir-

cumscribatur; itemque axis ejus ita dividatur, ut pars, quae inter punctum divisionis, et verticem intercipitur, reliquae sit tripla: erit inscriptae figurae gravitatis centrum propinquius basi conï, quam punctum illud divisionis, circumscriptae vero centrum gravitatis eodem puncto erit vertici propinquius.

Sit itaque conus, cujus axis $N M$ (Fig. xxxii.) dividatur in S , ita ut $N S$ reliquae $S M$ sit tripla. Dico, cujuscumque figurae cono, ut dictum est, inscriptae centrum gravitatis in axe $N M$ consistere, et ad basin conï magis accedere quam S punctum, circumscriptae vero gravitatis centrum similiter in axe $N M$ esse, et vertici propinquius, quam sit S . Intelligatur itaque inscripta figura ex cylindris, quorum axes $M C$, $C B$, $B E$, $E A$ æquales sint. Primus itaque cylindrus, cujus axis $M C$, ad cylindrum, cujus axis $C B$, eandem habet rationem quam sua basis ad basin alterius (sunt enim eorum altitudines æquales) hæc autem ratio eadem est ei, quam habet quadratum $C N$ ad quadratum $N B$. Et similiter ostendetur, cylindrum, cujus axis $C B$, ad cylindrum, cujus axis $B E$, eandem habere rationem quam quadratum $B N$ ad quadratum $N E$, cylindrum vero, cujus axis $B E$, ad cylindrum circa axem $E A$ eam, quam habet quadratum $E N$ ad quadratum $N A$; sunt autem lineæ $N C$,

$N B$, $N E$, $N A$ sese æqualiter excedentes, et earum excessus æquantur minimæ, nempe ipsi $N A$. Sunt igitur magnitudines quædam, nempe inscripti cylindri, eam inter se consequenter rationem habentes, quam quadrata linearum sese æqualiter excedentium, et quarum excessus minimæ æquantur: suntque ita dispositi in libra $T I$, ut singulorum centra gravitatum in ea, et in distantis æqualibus consistent. Per ea igitur, quæ supra demonstrata sunt, constat, gravitatis centrum omnium ita compositorum libram $T I$ ita dividere, ut pars versus T sit major quam tripla reliquæ. Sit hoc centrum O ; est ergo $T O$ major quam tripla ipsius $O I$. Verum $T N$ tripla est ad $I M$; ergo tota $M O$ minor erit quam pars quarta totius $M N$, cujus $M S$ pars quarta posita est. Constat ergo, signum O basi conici magis accedere quam S . Verum sit jam circumscripta figura constans ex cylindris, quorum axes $M C$, $C B$, $B E$, $E A$, $A N$ inter se sint æquales; similiter, ut de inscriptis, ostendetur, esse inter se sicut quadrata linearum $M N$, $N G$, $B N$, $N E$, $A N$; quæ sese æqualiter excedunt, excessusque æquatur minimæ $A N$; quare per præmissam centrum gravitatis omnium cylindrorum ita compositorum: quod sit V , libram $R I$ sic dividet, ut pars versus R , nempe $R V$, reliquæ $V I$ sit major quam tripla; $T V$ vero ejusdem minor erit quam tripla. Sed $N T$ tripla est

ipsius $I M$; igitur tota $V M$ major est quam pars quarta totius $M N$, cujus $M S$ pars quarta posita est. Itaque punctum V vertici propinquius est quam punctum S . Quod ostendendum erat.

Cono dato potest figura circumscribi, et altera inscribi ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, ita ut linea, quæ inter centrum gravitatis circumscriptæ, et centrum gravitatis inscriptæ intercipitur, minor sit quacumque linea proposita.

Sit datus conus, cujus axis $A B$, (Fig. xxxii.) data autem recta sit K . Dico; Exponatur cylindrus L æqualis ei, qui in cono inscribitur, altitudinem habens dimidium axis $A B$, et $A B$ dividatur in C , ita ut $A C$ ipsius $C B$ tripla sit, et quam rationem habet $A C$ ad K , hanc habeat cylindrus L ad solidum X . Cono autem circumscribatur figura ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, et altera inscribatur, ita ut circumscripta excedat inscriptam minori quantitate, quam sit solidum X ; sitque circumscriptæ gravitatis centrum E , quod cadet supra C ; inscriptæ vero centrum sit S , cadens sub C . Dico jam, $E S$ lineam ipsa K minorem esse. Nam si non; ponatur ipsi $C A$ æqualis $E O$, quia igitur $O E$ ad K eandem habet rationem quam L ad X ; inscripta vero figura minor non est cylindro L : excessus autem quo

dicta figura a circumscripta superatur, minor est solido X , inscripta igitur figura ad dictum excessum majorem rationem habebit quam $O E$ ad K ; ratio autem $O E$ ad K non est minor ea, quam habet $O E$ ad $E S$ cum $E S$ non ponatur minor K ; igitur inscripta figura ad excessum, quo a circumscripta superatur, majorem habet rationem quam $O E$ ad $E S$. Quam igitur rationem habet inscripta ad dictum excessum, hanc habebit ad lineam $E S$ linea quædam major ipsa $E O$; sit illa $E R$; est autem inscriptæ figuræ centrum gravitatis S ; circumscriptæ vero centrum est E . Constat ergo reliquarum portionum, quibus circumscripta excedit inscriptam, centrum gravitatis esse in linea $R E$, atque in eo puncto, a quo sic terminatur, ut quam rationem habet inscripta ad dictas portiones, eandem habeat linea inter E , et punctum illud intercepta ad lineam $E S$; hanc vero rationem habet $R E$ ad $E S$; ergo reliquarum portionum, quibus circumscripta superat inscriptam figuram, gravitatis centrum erit R , quod est impossibile, planum enim ductum per R basi conï æquidistans dictas portiones non secat. Falsum igitur est, lineam $E S$ non esse minorem ipsa K ; erit ergo minor. Hæc autem non dissimili modo in pyramide fieri posse demonstrabuntur.

Ex his manifestum est, cono dato posse figuram unam circumscribi, et alteram

inscribi, ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, ita ut lineæ, quæ inter earum centra gravitatum, et punctum, quod axem conï ita dividit, ut pars ad verticem reliquæ sit tripla, intercipiuntur, quacunque data linea sint minores. Cum enim, ut demonstratum est, dictum punctum axem dividens; ut dictum est, semper inter circumscriptæ, et inscriptæ gravitatum centra reperitur; fierique possit, ut quæ inter eadem centra mediat, linea minor sit quacunque linea proposita; multo minor eadem proposita linea sit, quæ inter alterum centrorum, et dictum punctum axem dividens intercipitur.

Cujuslibet conï, vel pyramidis centrum gravitatis axem dividit, ut pars ad verticem reliquæ ad basin sit tripla.

Esto conus, cujus axis AB (Fig. xxxiv.), et in C dividatur ita, ut A C reliquæ C B sit tripla: ostendendum est, C esse gravitatis centrum conï. Nam si non est, erit conï centrum aut supra, aut infra punctum C. Sit prius infra; et sit E: et exponatur linea S P æqualis C E; quæ contingenter dividatur in N. et quam rationem habet utraque simul B E, P N, ad P N, hæc habeat conus ad solidum X, et inscribatur cono solida figura ex cylindris æqualem altitudinem habentibus, cujus centrum gravitatis a puncto C minus distet quam sit linea S N; et excessus, quo a cono superatur, minor sit solido X; hæc enim fieri

posse, ex demonstratis manifestum est. Sit jam inscripta figura qualis petitur, cujus centrum gravitatis sit I . Erit igitur IE linea major quam NP , cum SP sit æqualis CE , et IC minor SN : et, quia utraque simul BE , NP , ad NP est ut conus ad X : excessus autem, quo conus inscriptam figuram superat, minor est solido X : ergo conus ad dictum excessum majorem rationem habebit quam utraque BE , NP ad NP : et dividendo inscripta figura ad excessum, quo a cono superatur, majorem rationem habebit quam BE ad NP : habet autem BE ad EI minorem adhuc rationem quam ad NP cum IE , cum major sit NP , ergo inscripta figura ad excessum, quo a cono superatur, multo majorem rationem habet quam BE ad EI . Quam igitur rationem habet inscripta ad dictum excessum, hanc habebit ad EI linea quædam major ipsa BE . Sit illa ME . Quia igitur ME ad EI est, ut inscripta figura ad excessum, quo a cono superatur, et est E centrum gravitatis coni, I vero est gravitatis centrum inscriptæ: ergo M erit centrum gravitatis reliquarum portionum, quibus conus inscriptam sibi figuram excedit, quod est impossibile. Non est ergo centrum gravitatis coni infra C punctum. Sed neque supra. Nam, si potest, sit R ; et rursus sumatur linea SP contingenter in N secta: et quam rationem habet utraque simul BC , NP ad NS , hanc habeat conus ad X ; et circumscribatur simi-

liter cono figura, a qua minori quantitate superetur, quam sit solidum X: et linea, quæ inter illius centrum gravitatis, et C intercipiatur, minor sit ipsa N P. Sit jam circumscripta, cujus centrum sit O: erit reliqua O R major ipsa N S; et quia ut utraque simul B C, P N, ad N S, ita conus ad X: excessus vero, quo conus a circumscripta superatur, minor est quam X: ipsa vero B O minor est quam utraque simul B C, P N: ipsa autem O R major quam S N: Conus igitur ad reliquas portiones, quibus a circumscripta superatur, multo maiorem rationem habebit, quam B O ad O R. Habeat rationem illam M O ad O R: erit M O major ipsa B C: et M erit centrum gravitatis portionum, quibus conus a circumscripta superatur figura, quod est inconueniens. Non est ergo gravitatis centrum ipsius coni supra punctum C: neque infra, ut ostensum est, ergo erit ipsum C. Et idem eodem prorsus modo in pyramide quacunque demonstrabitur.

Si fuerint quatuor lineae continue proportionales; et quam rationem habet minima earum ad excessum, quo maxima minimam superat, eandem habuerit linea quaedam sumpta ad $\frac{3}{4}$ excessus, quo maxima secundam superat: quam autem rationem habet linea his aequalis (maximæ, duplæ secundæ, et triplæ tertiæ) ad lineam æqualem quadruplæ maximæ,

quadruplae secundae, et quadruplae tertiae; eandem habuerit alia quaedam sumpta ad excessum. quo maxima secundam superat: erunt istae duae lineae simul sumptae quarta pars maximae proportionalium.

Sunt enim quatuor lineae proportionales, A B, B C, B D, B E (Fig. xxxv.) et quam rationem habet B E ad E A, eandem habeat F G ad $\frac{3}{4}$ ipsius A C. quam autem rationem habet linea æqualis A B, et duplæ B C, et triplæ B D ad æqualem quadruplæ ipsarum A B, B C, B D: hanc habeat K G ad A C. Ostendendum est, K F quartam esse partem ipsius A B. Quia igitur A B, B C, B D, B E sunt proportionales: in eadem ratione erunt etiam A C, C D, D E: et ut quadrupla ipsarum A B, B C, B D, ad A B cum dupla B C, et tripla B D, ita quadrupla ipsarum A C, C D, D E, hoc est quadrupla ipsius A E, ad A C cum dupla C D, et tripla D E; et sic est A C ad K G; ergo ut tripla ipsius A E ad A C cum dupla C D, et tripla D E, ita $\frac{3}{4}$ ipsius A C ad K G. est autem, ut tripla A E ad triplam E B, ita $\frac{3}{4}$ A C ad G F; ergo per conversam vigesimam quartam quinti ut tripla A E ad A C cum dupla C D, et tripla D B, ita $\frac{3}{4}$ ipsius A C ad K F, et ut quadrupla

A E ad A C cum dupla C D, et tripla D B, hoc est ad A B cum C B, et B D; ita A C ad K F: et permutando, ut quadrupla A E ad A C, ita A B cum C B, et B D ad K F; ut autem A C ad A E, ita A B ad A B cum C B, et B D, ergo ex æquali, in proportionibus perturbata, ut quadrupla A E ad A E, ita A B ad K F. Quare constat, K F quartam esse partem ipsius A B.

Cujuscunque frusti pyramidis seu coni plano æquidistante secti centrum gravitatis in axe consistit, eumque ita dividit ut pars versus minorem basin ad reliquam sit ut tripla majoris basis cum spatio duplo medii inter basin majorem et minorem una cum basi minori, ad triplam minoris basis cum eodem duplo spatii medii etiam basi majori.

A cono vel pyramide, cujus axis A D (Fig. xxxvi.), secetur plano basi æquidistante frustum, cujus axis V D, et quam rationem habet tripla maximæ basis cum dupla mediæ, et minima, ad triplam minimæ cum dupla mediæ, et maxima, hanc habeat V O ad O D. Ostendendum est, O centrum gravitatis frusti existere. Sit V M quarta pars ipsius V D.

Exponatur linea H X ipsi A D æqualis, sitque K X æqualis A V, ipsarum vero H X, K X, tertia proportionalis sit X L, et quarta X S: et quam rationem ha-

Galileo Galilei Vol. IX. 8

bet HS ad SX , hanc habeat MD ad lineam sumptam ab O versus A , quæ sit ON , et quia major basis ad eam, quæ inter maiorem, et minorem est media proportionalis, est, ut DA ad AU , hoc est, ut HX ad XK : dicta autem media ad minorem est, ut KX ad XL : erunt major, media, et minor basis in eadem ratione; ac lineæ HX , XK , XL .

Quare ut tripla majoris basis cum dupla mediæ, et minima, ad triplam minimæ cum dupla mediæ, et maxima, hoc est, ut VO ad OD ; ita tripla HX cum dupla XK , et XL ad triplam XL cum dupla XK , et XH : et componendo, et convertendo, erit OD ad DV , ut HX cum dupla XK , et tripla XL ad quadruplam ipsarum HX , XK , XL .

Sunt igitur 4 lineæ proportionales, HX , XK , XL , XS : et quam rationem habet XS ad SH , hanc habet linea quædam sumpta NO ad $\frac{3}{4}$ ipsius DV , nempe

ad DM ; hoc est, ad $\frac{3}{4}$ ipsius HK ; quam autem rationem habet HX cum dupla XK , et tripla XL ad quadruplam ipsarum HX , XK , XL , eandem habet alia quædam sumpta OD ad DV ; hoc est, ad HK . ergo (per ea quæ demonstrata sunt) DN erit quarta pars ipsius HX ; hoc est, ipsius AD ; quare punctum N erit gravitatis centrum coni, vel pyra-

midis, cujus axis A D. Sit pyramidis vel conus, cujus axis A V, centrum gravitatis I. Constat igitur, centrum gravitatis frusti esse in linea I N ad partes N extensa, in eoque ejus puncto, qui cum puncto N lineam intercipiat, ad quam I N eam habeat rationem, quam abscissum frustum habet ad pyramidem vel conum, cujus axis A V. Ostendendum itaque restat, I N ad N O eandem habere rationem quam frustum ad conum, cujus axis A V. Est autem ut conus, cujus axis D A, ad conum, cujus axis A V; ita cubus D A ad cubum A V, hoc est, cubus H X ad cubum X K; hæc autem eadem est proportio, quam habet H X ad X S: quare dividendo, ut H S ad S X, ita erit frustum, cujus axis D V, ad conum vel pyramidem cujus axis V A; est autem, ut H S ad S X, ita etiam M D ad O N: quare frustum ad pyramidem, cujus axis A V, est ut M D ad N O. Et quia A N est $\frac{3}{4}$ ipsius A D; A I autem est $\frac{3}{4}$ ipsius A V: erit reliqua I N $\frac{3}{4}$ reliquæ V D; quare I N æqualis erit ipsi M D. Et demonstratum est, M D ad N O esse ut frustum ad conum A V. Constat ergo, hanc eandem rationem habere etiam I N ad N O; quare patet propositum.

PRINCIPIO
DELLA QUINTA GIORNATA
DEL GALILEO

Da aggiugnersi all' altre quattro de' discorsi, e dimostrazioni Matematiche intorno alle due nuove scienze appartenenti alla meccanica, ed ai movimenti locali.



INTERLOCUTORI.

Salviati, Sagredo, e Simplicio.

Salv. **G**randissima è la consolazione, che io sento nel vedere, dopo l'interposizione di qualche anno, rinnovata in questo giorno la nostra solita adunanza. So che l'ingegno vivace del Sig. Sagredo è tale, che non sa stare in ozio, però mi persuade,

che egli non avrà mancato di fare, nel tempo della nostra lontananza, qualche riflessione sopra le dottrine del moto, le quali furon lette nell'ultima giornata de' nostri passati colloquj. Io, che dalla virtuosa conversazione di V. S. ed anco del nostro Signor Simplicio, ho sempre raccolto frutti di non volgare erudizione, la prego a voler proporre qualche nuova considerazione sopra le cose del nostro Autore già lette da noi. Così daremo principio agli usati discorsi per passar questa Giornata nell'occupazione di virtuoso trattenimento.

Sagr. Non nego a V. S. che in questi anni mi sieno passati per la fantasia varj pensieri sopra le novità dimostrate da quel buon Vecchio intorno alla sua Scienza del moto, sottoposta e ridotta da lui alle dimostrazioni della Geometria. Ed ora, poichè ella così comanda, procurerò di rammentarmi qualche cosa, e darò a lei occasione di beneficiare il mio intelletto co' suoi dotti ragionamenti.

Per cominciar dunque per ordine dal principio del Trattato de' moti, proporrò a V. S. uno scrupolo mio antico rinnovatomi nel considerare la dimostrazione, che l'Autore apporta nella sua prima proposizione del moto equabile, la quale procede (come molte altre degli antichi, e moderni Scrittori) per via degli ugualmente multipli. Questa è una certa ambiguità, che io ho sempre avuta nella mente intorno al-

la quinta, o come altri vogliono sesta definizione del quinto Libro di Euclide. Stimò mia somma prosperità di aver potuto incontrare occasione di conferir questo dubbio con V. S. del quale spero dover restar totalmente libero.

Simpl. Anzi che io ancora riconoscerò questo nuovo abboccamento colle SS. VV. per beneficio singolare della fortuna, se mi succederà di poter ricever qualche luce intorno a questo punto accennato dal Sig. Sagredo. Non ebbi mai il più duro ostacolo di questo in quella poca di Geometria, che io studiai già nelle Scuole da giovanetto. Però ella s'immagini quanto sia per dovermi essere caro, se dopo tanto tempo sentirò intorno a questo particolare qualche cosa di mia soddisfazione.

Sagr. Dico dunque, che avendo sentito nel dimostrar la prima proposizione dell'Autore intorno al moto equabile adoprarli gli ugualmente moltiplici conforme alla quinta, ovvero sesta definizione del V. Libro di Euclide, ed avendo io un poco di dubbio già antiquato intorno a questa definizione, non restai con quella chiarezza, che io avrei desiderato nella predetta proposizione. Ora mi sarebbe pur caro il poter intender bene quel primo principio, per poter poi con altrettanta evidenza restar capace delle cose, che seguono intorno alla dottrina del moto.

Salv. Procurerò di soddisfare al desi-

derio di V. S. con addomesticare in qualche altra maniera quella definizione di Euclide, e spianar la strada per quanto mi sarà possibile all'introduzione delle proporzionalità. In tanto sappia pure di aver avuto per compagni in questa arzigogolatura uomini di gran valore, i quali per lungo tempo sono stati colla medesima poca soddisfazione, colla quale V. S. mi dice di ritrovarsi fino a questo giorno.

Io poi confesso, che (1) per qualche anno dopo aver istudiato il V. Libro di Euclide, restai involto colla mente nella stessa caligine. Superai finalmente la difficoltà, quando nello studiare le maravigliose Spirali di Archimede, incontrai nel bel principio del Libro una dimostrazione simile alla predetta del nostro Autore. Quell'occasione mi fece andar pensando, se per fortuna ci fosse altra strada più agevole, per la quale si potesse arrivare al medesimo fine, ed acquistare per me, ed anco per altri qualche precisa cognizione nella materia delle proporzioni: però applicai allora l'animo con qualche attenzione a questo proposito, ed esporrò adesso quanto fu da me speculato in quell'opportunità, sottoponendo ogni mio progresso al purgatissimo giudizio delle SS. VV.

(1) Quando, e con qual occasione sovvenissero al Galileo queste speculazioni,

Suppongasi (1) primieramente (come le suppose anco Euclide, mentre le difini) che le grandezze proporzionali si trovino. Cioè, che date in qualche modo tre grandezze, quella proporzione, e quel rispetto, o quella relazione di quantità, che ha la prima verso la seconda, la stessa possa averla una terza verso una quarta. Dico poi, che per dare una definizione delle suddette grandezze proporzionali, la quale produca nell'animo del Lettore qualche concetto aggiustato alla natura di esse grandezze proporzionali, dovremmo prendere una delle loro passioni, ma però la più facile di tutte e quella per appunto, che si stimi la più intelligibile anco dal volgo non introdotto nelle Matematiche. Così fece Euclide stesso in molti altri luoghi. Sovvengavi, che egli non dissè, il Cerchio essere una figura piana, dentro la quale segandosi due linee rette, il rettangolo sotto le parti dell'una sia sempre uguale al rettangolo sotto le parti dell'altra: ovvero dentro la quale tutti i quadrilateri abbiano gli angoli opposti uguali a due retti. Quando anche così avesse detto, sarebbero state buone definizioni. Ma mentre egli sapeva un'altra passione del cerchio più intelligibile della precedente, e più facile da formarsene concetto, chi non si accorge, che egli fece assai meglio a

(1) *Supposizione.*

mettere avanti quella più chiara, e più evidente come definizione, per cavar poi da essa quell'altre più recondite, e dimostrarle come conclusioni?

Sagr. Per certo che così è, ed io credo, che rari saranno gl'ingegni, i quali totalmente si acquietino a questa definizione, se io con Euclide dirò così:

Allora quattro grandezze sono proporzionali, quando gli ugualmente moltiplici della prima, e della terza, presi secondo qualunque moltiplicità, si accorderanno sempre nel superare, mancare, o pareggiare gli ugualmente moltiplici della seconda, e della quarta.

E chi è quello d'ingegno tanto felice, il quale abbia certezza, che allora quando le quattro grandezze sono proporzionali, gli ugualmente moltiplici si accordino sempre? Ovvero chi sa, che quegli ugualmente moltiplici non si accordino sempre anco quando le grandezze non sieno proporzionali? Già Euclide nelle precedenti definizioni aveva detto.

La proporzione tra due grandezze essere un tal rispetto o relazione tra di loro, per quanto si appartiene alla quantità.

Ora avendo il Lettore concepito già nell'intelletto, che cosa sia la proporzione fra due grandezze, sarà difficil cosa, che egli possa intendere, che quel rispetto, o relazione, che è fra la prima, e la seconda grandezza, allora sia simile al rispetto o relazione che si treva fra la terza, e la

quarta grandezza, quando quegli ugualmente multipli della prima, e della terza si accordan sempre nella maniera predetta con gli ugualmente multipli della seconda, e della quarta nell'esser sempre maggiori, o minori, o uguali.

Salv. Comunque ciò sia, parmi questo di Euclide più tosto un teorema da dimostrarsi, che una definizione da premettersi. Però avendo io incontrato tanti ingegni, i quali hanno arenato in questo luogo, mi sforzerò di secondare colla definizione delle proporzioni il concetto universale degli uomini anche ineruditi nella Geometria, e procederò in questo modo.

Allora noi diremo quattro grandezze fra loro proporzionali (1), cioè aver la prima alla seconda la stessa proporzione, che ha la terza alla quarta, quando la prima sarà eguale alla seconda, e la terza ancora sarà eguale alla quarta. Ovvero quando la prima sarà tante volte multiplice della seconda, quante volte precisamente la terza è multiplice della quarta. Troverà dubbio alcuno il Sig. Simplicio nell'intender questo?

Simp. Certo che no.

Salv. Ma perchè non sempre accadrà, che fra le quattro grandezze si trovi per appunto la predetta egualità, ovvero molteplicità precisa, procederemo più oltre,

(1) *Definizione delle grandezze proporzionali tra loro commensurabili.*

e domanderò al Sig. Simplicio : Intendete voi, che le quattro grandezze allora sieno proporzionali, quando la prima contenga per esempio tre volte, e mezzo la seconda, ed anco la terza contenga tre volte, e mezzo la quarta?

Simp. Intendo benissimo sin qui, ed ammetto, che le quattro grandezze sieno proporzionali, non solo nel caso esemplificato da V. S. ma ancora secondo qualsivoglia altra denominazione di molteplicità, o superparziente, o superparticolare.

Salv. Per raccogliere dunque ora in breve, e con maggiore universalità tutto quello, che si è detto, ed esemplificato fin qui, diremo, che

Allora noi intendiamo quattro grandezze esser proporzionali fra loro, quando l'eccesso della prima sopra la seconda (qualunque egli sia) sarà simile all'eccesso della terza sopra la quarta.

Simp. Fin qui io non avrei difficoltà, ma mi pare che V. S. in questa maniera non apporti la definizione delle grandezze proporzionali (1), se non quando le antecedenti saranno maggiori delle loro conseguenti; poichè ella suppone, che la prima ecceda la seconda, e che anco la terza ec-

(1) *Definizione generale delle grandezze proporzionali, o commensurabili tra loro, o incommensurabili.*

ceda similmente la quarta. Ma ora interrogo io, come dovrò governarmi quando le antecedenti sieno minori delle loro conseguenti?

Salv. Rispondo, che quando V. S. avrà le quattro grandezze in tal modo, che la prima sia minor della seconda, e la terza minor della quarta, allora sarà la seconda minor della prima, e la quarta maggior della terza. Però V. S. le consideri con quest'ordine inverso, e s'immagini, che la seconda sia primá, e la quarta sia terza. Così avrà le antecedenti maggiori delle conseguenti, e non avrà bisogno di cercare allora definizione diversa dalla già apportata da noi.

Sagr. Così è per appunto. Ma seguiti Vostra Signoria per grazia col presupposto già fatto di considerare sempre le antecedenti maggiori delle loro conseguenti, il che mi pare, che faciliti assai a lei il discorso, ed a noi l'intelligenza.

Salv. Stabilita questa per definizione, aggiungerò anco in qual altro modo s'intendano quattro grandezze esser fra loro proporzionali (1), ed è questo. Quando la

(1) *Altro modo di definire le grandezze proporzionali. Definizione delle grandezze non proporzionali, o commensurabili, o incommensurabili.*

prima per avere alla seconda la medesima proporzione, che la terza alla quarta, non è punto nè maggiore nè minore di quello, che ella dovrebbe essere, allora s'intende aver la prima alla seconda la medesima proporzione, che ha la terza alla quarta. Con questa occasione definirei ancora la proporzione maggiore, e direi così.

Ma quando la prima grandezza sarà alquanto più grande di quel, che ella dovrebbe essere per avere alla seconda la medesima proporzione, che ha la terza alla quarta, allora voglio, che convenghiamo di dire, che la prima abbia maggior proporzione alle seconda di quella, che ha la terza alla quarta.

Simp. Bene, ma quando la prima fosse minore di quel, che ella dovrebbe essere, per avere alla seconda quella medesima proporzione, che ha la terza alla quarta?

Salv. Mentre la prima sia minor di quel, che si ricercerebbe per aver alla seconda quella medesima proporzione, che ha la terza alla quarta, sarà segno evidente, che la terza è maggior del giusto, per aver alla quarta quella tal proporzione, che ha la prima alla seconda. Però in questo caso ancora V. S. si contenti di concepir l'ordine in altro modo, e s'immagini, che quelle grandezze, che erano terza, e quarta, diventino prima, e seconda, e quell'altre, che erano prima, e seconda, V. S. le riponga ne' luoghi della terza, e della quarta.

Sagr. Fin' ora intendo benissimo il concetto di V. S. e l' introduzione, colla quale ella dà principio alla speculazione delle proporzionali. Parimi ora, che ella si sia messa in obbligo di adempire una delle due cose, cioè o di dimostrare con questi suoi principj tutto il quinto di Euclide, ovvero di dedurre da queste due definizioni poste da V. S. quell' altre due, che Euclide mette per quinta, e per settima fra le definizioni, sopra le quali poi egli fonda tutta la macchina del medesimo quinto Libro. Se V. S. dimostrerà queste come conclusioni, non mi resterà più che desiderare intorno a questa materia.

Salv. Questa per appunto è l'intenzion mia: poichè quando si comprenda con evidenza, che date quattro grandezze proporzionali conforme alla medesima definizione, gli ugualmente moltiplici della prima, e della terza si accordano eternamente per necessità in pareggiare, o mancare, o eccedere gli ugualmente moltiplici della seconda, e quarta, allora senza altra scorta si può entrare nel quinto Libro di Euclide, e si possono intender con evidenza i Teoremi delle grandezze proporzionali. Così ancora se colla posta definizione della proporzion maggiore dimostrerò, che in qualche caso presi gli ugualmente moltiplici della prima, e della terza, ed anco della seconda, e della quarta, quel della prima ecceda quel della seconda, ma quel della terza

non ecceda quel della quarta, si potrà con questa dimostrazione scorrere gli altri Teoremi delle grandezze sproporzionali. Poichè questa nostra conclusione sarà per appunto la definizione, della quale, come per principio, si serve Euclide stesso.

Simp. Quando io restassi persuaso di queste due passioni degli ugualmente moltiplici, cioè che mentre le quattro grandezze son proporzionali, quegli eternamente si accordano nel pareggiare, o eccedere, o mancare; e che, quando le quattro grandezze non son proporzionali, quegli in qualche caso discordano, io per me non richiederei altra luce per intender con chiarezza tutto il quinto degli Elementi Geometrici.

Salv. Ora ditemi, Signor Simplicio, se noi supporremo, che le quattro grandezze A, B, C, D, sieno proporzionali, cioè, che la prima A alla seconda B abbia la stessa proporzione, che la terza C ha verso la quarta D, intendete voi, che anco due delle prime verso la seconda avranno la medesima proporzione, che due delle terze verso la quarta? (1)

A B

C D

(1) *Assioma.*

Simp. Io l'intendo assai bene, imperciocchè mentre una prima alla seconda ha la medesima proporzione, che una terza alla quarta, non saprei immaginarmi per qual ragione due delle prime alla seconda debbano aver proporzion diversa da quella, che hanno due delle terze alla quarta. (1)

Salv. Adunque mentre V. S. intende questo, intenderà ancora, che quattro, o dieci, o cento delle prime ad una seconda avranno la stessa proporzione, che hanno quattro, o dieci, o cento delle terze ad una quarta.

Simp. Certo che sì, e purchè i numeri delle molteplicità sieno uguali, facilmente apprendo, che la prima presa due volte, o dieci, o cento, avrà la stessa proporzione verso la seconda, che ha la terza presa anche essa due volte, o dieci, o cento, verso la quarta. Sarebbe ben difficile persuadermi il contrario.

Salv. Non è dunque ardua cosa il capire, che il multiplice della prima abbia la stessa proporzione alla seconda, che ha l'ugualmente multiplice della terza alla quarta: cioè che la prima moltiplicata quante volte ci pare abbia alla seconda quella proporzione stessa, che ha la terza moltiplicata altrettante volte verso la quar-

(1) *Il medesimo Assioma più universalmente spiegato.*

ta. Ora tutto quello, che io ho esemplificato fin qui con moltiplicare le grandezze antecedenti, ma non già le conseguenti, immaginatevi, che sia detto anco intorno al moltiplicare le conseguenti solamente senza punto alterare l'antecedenti, e ditemi: credete voi, che date quattro grandezze proporzionali, la prima a due delle seconde abbia proporzion diversa da quella, che ha la terza a due delle quarte?

Simp. Credo assolutamente di no; anzi quando una prima abbia ad una seconda la medesima proporzione, che una terza ha verso la quarta intendo assai bene, che quella stessa prima a due, o quattro, o dieci delle seconde avrà quella medesima proporzione, che ha la stessa terza verso due, o quattro, o dieci delle quarte.

Salv. Ammettendo dunque voi questo, confessate di restar appagato, e d'intender con facilità, che date quattro grandezze proporzionali A, B, C, D (Fig. xxxvii.) e moltiplicate egualmente la prima, e la terza, quella proporzione, che ha il moltiplice E della prima A alla seconda B, la stessa ancora abbia precisamente l'ugualmente moltiplice F della terza C alla quarta D. (1) Immaginatevi dunque, che queste sieno le nostre quattro grandezze proporzio-

(1) PROP. I. che è la quarta del V. di Eucl.

nali, E, B, F, D, cioè il multiplice E della prima sia prima, la seconda stessa B sia seconda, il multiplice poi F della terza sia terza, e la quarta D sia quarta. V. S. mi ha anco detto di capire, che moltiplicandosi egualmente le conseguenti B, D, cioè la seconda, e la quarta senza alterar punto le antecedenti, la medesima proporzione avrà la prima al moltiplicato della seconda, che la terza al moltiplicato della quarta. Ma queste quattro grandezze saranno per appunto E, F, ugualmente multipli della prima, e della terza, e G, H, egualmente multipli della seconda, e della quarta.

Sagr. Confesso, che di ciò resto interamente appagato, ed ora intendo benissimo la necessità, per la quale gli ugualmente multipli delle quattro grandezze proporzionali eternamente si accordano nell'essere o maggiori, o minori, o eguali, ec. (1) Poichè, mentre presi gli ugualmente multipli della prima, e della terza, e gli ugualmente multipli della seconda, e della quarta V. S. mi dimostra, che il multiplice della prima al multiplice della seconda ha la medesima proporzione, che il multiplice della terza ha verso il multiplice della quarta, scorgo manifestamente, che quan-

(1) *COROL. che è il converso della definizione del V. degli Elementi.*

do il multiplice della prima sia maggiore del multiplice della seconda, allora il multiplice della terza dovrà necessariamente (per servir la proporzione) esser maggiore del multiplice della quarta. Quando poi sia minore, ovvero uguale, anche il multiplice della terza dovrà esser minore, ovvero uguale al multiplice della quarta.

Simp. Io ancora non sento in ciò repugnanza veruna. Resto bene con desiderio d'intendere come (supposte le quattro grandezze sproporzionali) sia vero, che gli ugualmente multipli non servino sempre quella concordanza, nell'esser maggiori, o minori, o uguali.

Salv. Io in questo ancora procurerò, che V. S. abbia compiuta soddisfazione.

Pongansi le quattro grandezze date A, B, C, D, E, e sia la prima A B alquanto maggiore di quello, che ella dovrebbe essere per avere alla seconda C quella medesima proporzione, che ha la terza D alla quarta E. (1) Mostrerò, che presi in certa particolar maniera gli ugualmente multipli della prima, e della terza, e presi altri ugualmente multipli della seconda, e quarta, quello della prima si troverà maggiore di quello della seconda, ma quello della terza non sarà altrimenti maggiore di

(1) *PROP. II. che è il converso della 7 defin. del V. di Euclid.*

quello della quarta, anzi lo dimostrerò esser minore.

Intendasi dunque esser levato dalla prima grandezza $A B$ quell' eccesso, il quale la faceva maggiore di quanto ella dovrebbe essere, acciò fosse precisamente proporzionale, e sia tale eccesso l' $F B$. Resteranno ora dunque le quattro grandezze proporzionali, cioè la rimanente $A F$ alla C avrà la medesima proporzione, che ha la D alla E .

Moltiplichisi $F B$ (Fig. xxxviii) tante volte, che ella sia maggior della C , e sia questo moltiplice il segnato H^a . Prendasi poi $H L$ altrettante volte moltiplice della $A F$, e la M della D , quante volte per appunto l' $H I$ sarà stata presa moltiplice della $F B$. Stante questo non è dubbio alcuno, che tante volte sarà moltiplice la composta $L I$ della composta $A B$, quante volte la $H I$ della $F B$, ovvero la M della D è moltiplice

Prendasi ora la N moltiplice della C con tal legge, che la stessa N sia prossimamente maggiore della $L H$; ed in ultimo quanto sarà moltiplice la N della C , altrettanto pongasi la O moltiplice della E .

Ora essendo la moltiplice N prossimamente maggiore della $L H$, se noi dalla N intenderemo esser levata una delle grandezze sue componenti (che sarà eguale alla C) resterà il residuo non maggiore della $L H$. Se dunque alla stessa N rende-

remo la grandezza eguale alla C, (che intendemmo esser levata) ed alla L H, che è non minore di detto residuo, aggiungeremo la H I, che pure è maggiore dell'aggiunta alla N, sarà tutta la L I maggior della N.

Ecco dunque un caso, nel quale il multiplice della prima supera il multiplice della seconda. Ma essendo le quattro grandezze A F, C, D, E, fatte proporzionali da noi, ed essendosi presi gli ugualmente multipli L H, ed M della prima, e della terza, ed N, ed O della seconda, e della quarta, saranno essi (per le cose già stabilite di sopra) sempre concordi nell'esser maggiori, o minori, o uguali. Però essendo il multiplice L H della prima grandezza minore del multiplice N della seconda, per la nostra costruzione, sarà anco il multiplice M della terza minore necessariamente del multiplice O della quarta.

Si è per tanto provato, che mentre la prima grandezza sarà alquanto maggiore di quello, che ella dovrebbe essere, per avere alla seconda la stessa proporzione, che ha la terza alla quarta: allora sarà possibile di prendere in qualche modo gli ugualmente multipli della prima, e della terza, ed altri ugualmente multipli della seconda, e della quarta, e dimostrare, che il multiplice della prima eccede il multiplice della seconda, ma il multiplice della terza non eccede quel della quarta.

Sagr. Molto bene ho inteso quanto V. S. ha dimostrato sin qui. Resta ora, che ella da queste dimostrate premesse deduca come necessarie conclusioni le due controverse definizioni di Euclide, il che spero le sarà facile, avendo di già dimostrati due Teoremi conversi di quelle.

Salv. Facili per appunto riusciranno; e per dimostrare la quinta definizione io procederò così.

Se delle quattro grandezze A, B, C, D (Fig. xxxix.) gli ugualmente multipli della prima, e terza presi secondo qualunque molteplicità sempre si accorderanno nel pareggiare, o mancare, ovvero eccedere gli ugualmente multipli della seconda, e della quarta rispettivamente, io dico, che le quattro grandezze son fra di loro proporzionali. (1)

Imperocchè sieno (se è possibile) non proporzionali. Adunque una delle antecedenti sarà maggiore di quello, che ella dovrebbe essere per avere alla sua conseguente la stessa proporzione, che ha l'altra antecedente alla sua conseguente. Sia per esempio la segnata A. Adunque per le cose già dimostrate, pigliandosi gli ugualmente multipli della A, e della C, in una tal maniera, e pigliandosi gli ugual-

(1) *PROP. III. che è la defn. 5 del V. di Eucl.*

mente multipli delle B, D , nel modo che si è insegnato, si mostrerà la multiplie di A maggiore della multiplie di B , ma la multiplie di C non sarà altrimenti maggiore, ma minore della multiplie di D , che è contro al supposto fatto da noi.

Per dimostrar la settima definizione dirò così. Sieno le quattro grandezze A, B, C, D , e suppongasi, che presi in qualche particolar maniera gli ugualmente multipli delle due antecedenti prima, e terza, e gli ugualmente multipli delle due conseguenti seconda, e quarta, suppongasi dico, che si trovi un caso, nel quale il multiplie di A sia maggior del multiplie di B , ma il multiplie di C non sia maggior del multiplie di D . (1) Io dico, che la A alla B avrà maggior proporzione, che la C alla D , cioè che la A sarà alquanto maggiore di quel che ella dovrebbe essere per avere alla B la stessa proporzione, che ha la C alla D .

Se è possibile non sia A maggior del giusto, sarà dunque precisamente proporzionale, ovvero minor del giusto per esser proporzionale. Quanto al primo, se ella fosse precisamente aggiustata, e proporzionale, sarebbero, per le cose già provate, gli ugualmente multipli della prima, e

(1) *PROP. IV. che è la 7 defin. del V. di Eucl.*

della terza presi in qualunque modo sempre concordi nel pareggiare, o mancare, o eccedere gli ugualmente multipli della seconda, e della quarta; il che è contro alla supposizione.

Se poi la prima fosse minor del giusto per esser proporzionale, questo è segno, che la terza sarebbe maggiore del suo dovere, per avere alla quarta quella proporzione, che ha la prima alla seconda. Allora io direi, che si levasse dalla terza quell' eccesso, che la fa esser maggior del giusto. E però la rimanente resterebbe poi per appunto proporzionale. Ora, considerando quei multipli particolari supposti da principio, è manifesto, che essendo il multiplice della prima maggior del multiplice della seconda, anco il multiplice della terza, cioè di quella rimanente, sarà maggior del multiplice della quarta. Adunque se in cambio di pigliar il multiplice di quella rimanente, ripiglieremo l'egualmente multiplice di tutta la terza intera, questo sarà maggior, che non era il multiplice di quella rimanente; e però sarà questo stesso molto maggior di quel della quarta. Il che è contro la supposizione.

Sagr. Resto soddisfattissimo di questa dilucidazione fattami da V. S. in materia, nella quale io ne aveva già lungo tempo bisogno: nè saprei esprimere quale in me sia maggiore, o il gusto di questa cognizione nuovamente acquistata, o il ramma-

rico di non averla io procurata col chiederla a V. S. fin dal principio de' nostri primi abboccamenti, tanto più avendo io inteso; che ella la conferiva a diversi Amici, a' quali per la vicinanza era lecito di frequentar la sua Villa. Ma seguitiamo di grazia i discorsi, quando però il Sig. Simplicio non abbia che replicare intorno alla materia fin qui considerata.

Simp. Io non saprei che soggiugnere, anzi resto interamente appagato del discorso, e capace delle dimostrazioni sentite.

Salv. Posti questi fondamenti, si potrebbe compendiare in parte, e riordinare tutto il quinto di Euclide, ma ciò sarebbe una digressione troppo lunga, e troppo lontana dal nostro principale intento. Oltre che io so, che le SS. VV. averanno veduto di simili compendj stampati da altri Autori.

Ora essendosi considerate fin qui a rquisizione delle SS. VV. le definizioni quinta, e settima del quinto Libro, spero, che esse concederanno volentieri a me il poter proporre adesso un'antica mia osservazione sovvenutami sopra un'altra definizione di Euclide medesimo. Il soggetto non sarà diverso dall'incominciato, e non parrà alieno dal nostro proposito, essendo intorno alla proporzion composta, la quale vien maneggiata spesse volte dal nostro Autore ne'suoi Libri.

Trovasi fra le definizioni del sesto Libro di Euclide la quinta della proporzione composta, la quale dice in questo modo.

Allora una proporzione si dice comporsi di più proporzioni, quando le quantità di dette proporzioni moltiplicate insieme avranno prodotto qualche proporzione. (1)

Osservo poi, che nè il medesimo Euclide, nè alcuno altro Autore antico si serve della stessa definizione nel modo, nel quale ell'è stata posta nel Libro: onde ne seguono due inconvenienti, cioè al Lettore difficoltà d'intelligenza, ed allo Scrittore nota di superfluità.

Sagr. Questo è verissimo, ma non mi par probabile, che la suprema accuratezza di Euclide abbia fra' suoi Libri posta questa definizione inconsideratamente, ed invano. Però non sarei affatto fuor di sospetto, che ella vi fosse stata aggiunta da altri, o almeno alterata di tal sorta, che ella oggidì non si riconosca più, mentre dagli Autori si pone in opera nel dimostrare i Teoremi.

Simp. Che gli altri Autori non se ne servano, io lo crederò alle SS. VV. non avendovi fatto molto studio: mi dispiacerebbe bene se da Euclide stesso, il quale

(1) *Definizione 5 del sesto Libro di Eucl.*

viene stimato da voi altri per tanto puntuale nelle sue scritture, fosse stata posta indarno. Ma qui bisogna poi, che io confessi come l'intelletto mio, il quale non si è mai più che mediocrementemente inoltrato nella Matematica, ha incontrato difficoltà intorno a questa definizione, forse non minore, che nelle già spianate dal Sig. Salvati.

Mi ajutai un tempo fa con legger lunghissimi Commenti scritti sopra queste materie, ma per dire il vero, non conobbi giammai, che mi si sgombrassero quelle tenebre, che mi tenevano offuscato l'intelletto. Però se V. S. avesse qualche particolar considerazione, che mi facilitasse questo ancora, l'assicuro, che mi farebbe un favore molto segnalato.

Salv. Forse ella si presuppone, che questa sia materia di profonde speculazioni, e pure troverà, che non consiste in altro, che in un semplicissimo avvertimento.

S'immagini V. S. le due grandezze A, B, (Fig. XL.) dello stesso genere. Averà la grandezza A alla B una tal proporzione, e dopo concepisca esser posta fra di loro un'altra grandezza C pur dello stesso genere. Si dice, che quella tal proporzione, che ha la grandezza A alla B viene ad esser composta delle due proporzioni intermedie cioè di quella, che ha la A alla C, e di quella, che ha la C alla B. Questo è per appunto il senso, secondo

il quale Euclide si serve della predetta definizione.

Simp. È vero, che Euclide intende in questo modo la proporzione composta, ma però non intend'io, come la grandezza A alla B abbia proporzion composta delle due proporzioni, cioè della A alla C, e della C alla B.

Salv. Ora ditemi, Sig. Simplicio, intendete voi, che la A alla B abbia qualche proporzione, qualunque ella sia?

Simp. Essendo esse del medesimo genere, Signor sì.

Salv. E che quella proporzione sia immutabile, e non possa mai essere altra, o diversa da quella che ella è?

Simp. Intendo questo ancora.

Salv. Vi soggiungo ora io, che nello stesso modo per appunto l'A alla C ha una proporzione immutabile, e così anco la C alla B. La proporzione poi, che è fra le due estreme A, e B, si chiama esser composta delle due proporzioni, che mediano fra esse estreme, cioè di quella, che ha la A alla C, e di quella, che ha la C alla B. (1)

Aggiungo di più, che se V. S. fra queste grandezze A, e B, s'immaginerà,

(1) *Definizione da porsi in luogo della 5 disfn. del VI. d'Euclide.*

che sia frapposta non una grandezza sola, ma più d'una, come ella vede in questi segni A, C, D, B , s'intenderà pure la proporzione della A alla B esser composta di tutte le proporzioni, le quali sono intermedie fra di esse, cioè delle proporzioni, che hanno la A alla C , la C alla D , e la D alla B , e così se più fossero le grandezze, sempre la prima all'ultima ha proporzion composta di tutte quelle proporzioni, le quali mediano fra di esse.

$A, C, D, B,$

Avvertisco ora in quest'occasione, che quando le proporzioni componenti sieno uguali fra di loro, o per dir meglio, sieno le stesse, allora la prima all'ultima averà, come di sopra abbiamo detto, una tal proporzione composta di tutte le proporzioni intermedie; ma perchè quelle proporzioni intermedie sono tutte eguali, potremo esprimere il medesimo nostro senso con dire, che la proporzione della prima all'ultima ha una proporzione tanto moltiplice della proporzione, che ha la prima alla seconda, quante per appunto saranno le proporzioni, che si frappongono fra la prima, e l'ultima. Come per esempio, se fossero tre termini, e che la medesima proporzione fosse fra la prima, e la seconda, che è fra la seconda, e la terza,

allora sarebbe vero, che la prima alla terza averebbe proporzione composta della due proporzioni, le quali sono fra la prima, e la seconda, e fra la seconda, e la terza; ma perchè queste due proporzioni si suppongono uguali, cioè le stesse, potrà dirsi, che la proporzione della prima alla terza è duplicata della proporzione, che ha la prima alla seconda. Così, quando le grandezze fossero quattro, si potrebbe dire, che la proporzione della prima alla quarta è composta di quelle tre proporzioni intermedie, ed ancora, che è triplicata della proporzione della prima alla seconda, venendo composta tal proporzione, che ha la prima alla quarta, della proporzione della prima alla seconda tre volte presa, ec.

Ma qui finalmente non vanno contemplanzi, nè dimostrazioni, imperciocchè è una semplice imposizione di nome. Quando a V. S. non piacesse il vocabolo di composta, chiamiamola incomposta, o impastata, o confusa, o in qualunque modo più aggrada a V. S. solo accordiamoci in questo, che quando poi averemo tre grandezze dello stesso genere, ed io nominerò la proporzione incomposta, o impastata, o confusa, vorrò intendere la proporzione, che hanno l'estreme di quelle grandezze, e non altro.

Sagr. Tutto questo intendo benissimo, anzi ho più d'una volta osservato l'artifi-

zio d' Euclide nella proposizione, dove ei dimostra, che i parallelogrammi equiangoli hanno la proporzione composta delle proporzioni de' lati. Egli si trova in quel caso aver le due proporzioni componenti in quattro termini, che sono in quattro lati de' parallelogrammi; però comanda, che quelle due proporzioni si mettano in tre termini solamente; sicchè una di quelle proporzioni sia fra il primo termine, e il secondo, l'altra sia fra il secondo, e il terzo. Nella dimostrazione poi non fa altro; se non che ei dimostra, che l'un parallelogrammo all' altro è come il primo termine al terzo: cioè ha la proporzione composta di due proporzioni, di quella, che ha il primo termine al secondo, e dell'altra, che ha il secondo al terzo, le quali sono quelle due proporzioni, che prima egli aveva disgiunte ne' quattro lati de' parallelogrammi.

Salv. V. S. discorre benissimo. Ora intesa, e stabilita la definizione della proporzione composta in questo modo (la quale non consiste in altro fuori che nell'accordarsi, che sorta di roba noi intendiamo sotto quel nome) si può dimostrare la proposizion ventitrè del sesto libro di Euclide, come la dimostra egli stesso, perchè quivi ei non suppone la definizione nel modo, nel quale ell' è divulgata, ma bensì nel modo detto sopra da noi. Dopo la nominata proposizion 23 io soggiugue-

rei, come corollario di essa la divulgata definizione quinta del sesto libro della proporzione composta, tramutandola però in un Teorema.

Pongasi due proporzioni, una delle quali sia ne' termini A, B, l'altra ne' termini C, D. Dice la definizione vulgata, che la proporzione composta di queste due proporzioni si averà, se noi moltiplicheremo fra di loro le quantità di esse proporzioni. Io concorro col Sig. Simplicio nel credere, che questa sia una proposta difficile da capirsi, e bisognosa di prova; però con poca fatica noi la dimostreremo così.

Se li quattro termini delle due proporzioni non fossero in linee, ma in altre grandezze, immaginiamoci che e' sieno posti in linee rette. (1) Facciasi poi delle due antecedenti A, C (Fig. xli.) un rettangolo siccome delle due conseguenti B, D un altro rettangolo. È chiaro per la 23 del sesto d'Euclide, che il rettangolo fatto dalle A, C al rettangolo dalle B, D averà quella proporzione, che è composta delle due proporzioni A verso B, e C verso D, le quali son queste due, che ponemmo da

(1) Qui si suppone sapersi quali sieno le quantità delle proporzioni, e come s'intenda il moltiplicarle fra loro, ma il tutto meglio apparisce dal costruire, e dimostrare la presente proposizione.

principio affine di ritrovare qual fosse la proporzione che risultava dalla comparazione di esse. Essendo dunque la proporzione composta delle proporzioni A verso B, e C verso D quella, che ha il rettangolo A C al rettangolo B D, per la suddetta proposizion 23 del sesto, io domando al Signor Simplicio, come abbiamo noi fatto per ritrovare questi due termini, ne' quali consiste la proporzione, che si cercava da noi?

Simp. Io non credo, che non si sia fatto altro, se non formar due rettangoli con quelle quattro linee poste da principio, uno cioè colle antecedenti A, C, e l'altro colle conseguenti B, D.

Salv. Ma la formazione de' rettangoli nelle linee della Geometria corrisponde per appunto alla moltiplicazione de' numeri nell'Arimetica, come sa ogni Matematico anche principiante, e le cose che noi abbiamo moltiplicate sono state le linee A, C, e le linee B, D, cioè i termini omologhi delle poste proporzioni.

Ecco dunque, come moltiplicando insieme le quantità, o le valute delle date proporzioni semplici, si produce la quantità, o la valuta della proporzione, la quale poi si chiama composta di quelle.

GIORNATA SESTA

DEL GALILEO

DELLA FORZA DELLA PERCOSSA

Da aggiugnersi ai discorsi , e alle dimostrazioni Matematiche intorno alle due nuove scienze appartenenti alle meccaniche , ed ai movimenti locali.



INTERLOCUTORI.

Salviati , Sagredo , e Aproino.

Sagr. **L'** Assenza di V. S. Sig. Salviati , di questi quindici giorni mi ha dato campo di poter vedere le proposizioni attenenti a' centri di gravità de' solidi , ed anco dare un'altra diligente lettura alle dimostrazioni delle tante , e sì nuove proposizioni de' moti na-

turali, e violenti, e perchè ne sono tra esse non poche di assai difficile apprensione, di speciale ajuto mi è stata la conferenza di questo gentiluomo, che V. S. qui vede.

Salv. Io voleva appunto domandar V. S. dell'essere appresso di lei questo Signore, e del mancarne il nostro Sig. Simplicio.

Sagr. Dell'assenza del Sig. Simplicio mi vo immaginando, anzi lo tengo per fermo, che cagione ne sia stata la grande oscurità, che egli ha incontrata in alcune dimostrazioni di varj problemi attenenti al moto, e più di altre sopra le proposizioni del centro di gravità. Parlo di quelle, che per lunghe concatenazioni di varie proposizioni degli elementi della Geometria vengono inapprensibili a quelli, che tali elementi non hanno prontissimi alle mani; questo gentiluomo, che qui vede, è il Sig. Paolo Aproino, nobile Trivisano, stato non solamente uditore del nostro Accademico, mentre lesse in Padova, ma suo intrinsechissimo familiare, e di lunga, e continuata conversazione, nella quale insieme con altri (tra' quali fu principalissimo il Sig. Daniello Antonini nobilissimo d'Udine, d'ingegno, e di valore sopraumano, il quale per difesa della Patria, e del suo Serenissimo Principe, gloriosamente morì, ricevendo onori condegni al suo merito dalla Serenissima Repubblica Veneta) intervenne in particolare a gran numero di

esperienze, che intorno a diversi problemi in casa esso Accademico si facevano. Ora essendo circa dieci giorni fa venuto questo Sig. a Venezia, e conforme al suo solito a visitarmi, sentendo come aveva appresso di me questi trattati del comune amico, ha preso gusto, che gli vediamo insieme, e sentendo l'appuntamento del ritrovarci a parlare sopra il maraviglioso problema della percossa, mi ha detto come ne aveva più volte discorso, ma sempre irresolutamente, ed ambigualmente con esso Accademico, col quale mi diceva, che si era trovato, nel far diverse esperienze attenenti a varj problemi, a farne ancora alcune riguardanti alla forza della percossa, ed alla sua esplicazione, ed ora appunto stava in procinto di arrecarne tra l'altre una, per quanto egli dice, assai ingegnosa, e sottile.

Salv. Io mi reputo a gran ventura l'essermi incontrato nel Sig. Aproino, ed il poterlo conoscere di vista, e di presenza, come per fama, e per molte relazioni del nostro Accademico già aveva conosciuto, e di sommo piacere mi sarà il poter sentire almeno parte delle varie esperienze, che sopra diverse proposizioni furon fatte in casa l'amico nostro coll'intervento d'ingegni così accurati, quali sono quelli del Sig. Aproino, e del Sig. Antonini, del quale con tante lodi, ed ammirazioni mille volte mi parlò detto amico nostro. E per-

chè siamo ora qui per discorrere sopra il particolare della percossa, potrà V. S. Signor Aproino dirci quello, che in tal materia ne trassero dalle esperienze, con promessa però di arrecarne con altra occasione altre fatte sopra altri problemi, che so che non glie ne mancheranno, per la sicurezza che ho dell'essere l'Accademico nostro stato sempre non meno curioso, che diligente sperimentatore.

Apr. Se io volessi con i debiti ringraziamenti pagare il debito, al quale la cortesia di V. S. mi obbliga, mi converrebbe spendere tante parole, che poco tempo, o punto ci avanzerebbe di tutto il giorno, per parlare dell'intrapresa materia.

Sagr. No no, Sig. Aproino, venghiamo pure a dar principio ai discorsi di dottrina, e lasciamo i complimenti di cerimonie ai cortigiani, ed io entro per sicurezza tra amendue loro della scambievolmente soddisfazione prodotta, per quanto basta, dalle brevi, ma candide, e sincere loro ofiziose parole.

Apr. Ancorchè io stimi di non essere per produr cosa ignota al Sig. Salvati e che perciò tutta la carica del discorso dovrebbe essere appoggiata sulle sue spalle, tuttavia se non per altro. almeno per alleggerirlo in parte, andrò toccando quei primi motivi insieme colla prima esperienza, che mossero l'amico ad internarsi nella contemplazione di questo ammirabile

problema della percossa. Cercando la maniera del poter trovare, e misurare la sua gran forza, ed insieme, se fusse possibile, risolvere ne' suoi principj, e nelle sue prime cause l'essenza di cotale effetto, il quale molto diversamente par che proceda nell'acquisto della sua somma potenza, dal modo, nel quale procede la moltiplicazione di farla in tutte le altre macchine meccaniche (dico meccaniche, per escludere l'immenso vigore del fuoco) nelle quali si scorge, ed assai concludentemente s'intende, come la velocità d'un debile movente compensa la gagliardia di un forte resistente, che lentamente venga mosso. Ma perchè si scorge pur anco nella operazione della percossa intervenire il movimento del percuoziente, congiunto colla sua velocità, contro al movimento del resistente, ed il suo poco, o molto dovere essere mosso; fu il primo concetto dell'Accademico di cercar d'investigare qual parte abbia nell'effetto, ed operazione della percossa v. gr. il peso del martello, e quale la velocità maggiore, o minore, colla quale vien mosso, cercando se fusse possibile di trovare una misura, la quale comunemente ci misurasse, ed assegnasse l'una, e l'altra energia. E per arrivare a tal cognizione s'immaginò, per quanto a me parve, una ingegnosa esperienza. Accomodò un'asta assai gagliarda, e di lunghezza di circa tre braccia, volubile sopra un per-

no a guisa dell'ago di una bilancia; sospese poi nell'estremità delle braccia di cotal bilancia due pesi eguali, ed assai gravi, uno de' quali era il composto di due vasi di rame, cioè di due secchie, l'una delle quali appesa all'estremità detta dell'ago si teneva piena d'acqua, e dalle orecchie di tale secchia pendevano due corde di lunghezza circa due braccia l'una, alle quali era per gli orecchi attaccata un'altra simil secchia; ma vuota, la quale veniva a piombo a risponder sotto alla prima secchia già detta, e piena d'acqua; nell'estremo poi dell'altro braccio della bilancia si faceva pendere un contrappeso di pietra, o di qual si fusse altra materia grave, il quale equilibrasse giustamente la gravità di tutto il composto delle due secchie dell'acqua, e delle corde. La secchia superiore era forata nel fondo con foro largo alla grossezza di un uovo, o poco meno, e questo tal foro si poteva aprire, e serrare. Fu la prima immaginazione, e concetto comune di amendue noi, che fermata la bilancia in equilibrio, essendo preparato il tutto nella maniera detta, quando poi si sturasse la secchia superiore, e si desse l'andare all'acqua, la quale precipitando andasse a percuotere nella secchia da basso, l'aggiunta di cotal percossa dovesse aggiugnere tal momento in questa parte, che bisogno fusse per restituire l'equilibrio aggiugnere nuovo peso alla gra-

vità del contrappeso dell' altro braccio, la quale aggiunta è manifesto, che ristorerebbe, e adeguerebbe la nuova forza della percossa dell' acqua; sicchè potessimo dire, essere il suo momento equivalente al peso delle 10, o 12 libbre, che fusse stato di bisogno aggiugnere all' altro contrappeso.

Sagr. Ingegnoso veramente mi pare cotesto macchinamento, e sto con avidità attendendo l' esito di tale esperienza.

Apr. La riuscita siccome agli altri fu inopinata, così fu maravigliosa; imperocchè subito aperto il foro, e cominciato ad uscirne l' acqua, la bilancia inclinò dall' altra parte del contrappeso, ma non tantosto arrivò l' acqua percuotendo nel fondo dell' inferior secchia, che restando di più inclinarsi il contrappeso, cominciò a sollevarsi, e con un moto placidissimo, mentre l' acqua precipitava, si ricondusse all' equilibrio, e quivi senza passarlo pur di un capello, si librò, e fermossi perpetuamente.

Sagr. Inaspettato veramente m' è stato l' esito di questo caso, e benchè il successo sia stato diverso da quello, che io mi aspettava, e dal quale pensava di potere imparare, quanta fosse la forza di tal percossa nulladimeno mi par potere conseguire in buona parte la desiderata notizia, dicendo che la forza, ed il momento di cotal percossa equivale al momento, ed al

peso di quella quantità d'acqua cadente, che si trova sospesa in aria tra le due acque delle due secchie, superiore, ed inferiore, la qual quantità d'acqua non gravita punto, nè contro alla secchia superiore, nè contro all'inferiore; non contro alla superiore, perchè non essendo le parti dell'acqua attaccate insieme, non possono le basse far forza, e tirar giù le superiori, come farebbe v. gr. una materia viscosa, come pece, o pania; non contro all'inferiore, perchè andandosi continuamente accelerando il moto della cadente acqua, non possono le parti più alte gravitare, o premere sopra le più basse, laonde ne segue, che tutta l'acqua contenuta nella troscia è come se non fusse in bilancia. Il che anco più che chiaramente si manifesta, perchè se tal acqua esercitasse sua gravità sopra le secchie, queste colla giunta della percossa grandemente inclinerebbero a basso, sollevando il contrappeso, il che non si vede seguire. Confermasi anco puntualissimamente questo, perchè se noi ci immagineremo tutta quell'acqua repentinamente agghiacciarsi; già la troscia fatta un solido di ghiaccio. peserebbe con tutto il resto della macchina, e cessando il moto, verrebbe tolta la percossa.

Apr. Il discorso di V. S. è puntualmente conforme a quello, che facemmo noi di subito sopra la veduta esperienza, ed a noi ancora parve di poter concludere,

che l'operazione della sola velocità acquistata per la caduta di quella quantità d'acqua dall'altezza delle due braccia, operasse nell'aggravare senza il peso dell'acqua quel medesimo appunto, che il peso dell'acqua senza l'impeto della percossa, sicchè quando si potesse misurare, e pesare la quantità dell'acqua compresa in aria tra i vasi si potesse sicuramente affermare, la tal percossa esser potente ad operare gravitando quello che opera un peso eguale a 10, o 12 libbre dell'acqua cadente.

Salv. Piacemi molto l'arguta invenzione, e parmi, che senza il partirci dal suo progresso, nel quale ci arreca qualche ambiguità la difficoltà del misurare la quantità dell'acqua cadente, potremmo con una non dissimile esperienza agevolarci la strada per arrivare all'intera cognizione, che desideriamo. Però figurandoci per esempio uno di quei gran pesi, che per ficcare grossi pali nel terreno si lasciano cadere da qualche altezza sopra uno de' detti pali (i quali pesi mi pare, che gli addimandino berte) ponghiamo v. gr. il peso di una tal berta esser 100 libbre, l'altezza, dalla quale cade, essere quattro braccia, e la fitta del palo nel terreno duro fatta per una sola percossa importare 4 dita, e posto che la medesima pressura, e fitta delle 4 dita, volendola noi far senza percossa, ricercasse, che le fusse sovrapposto un peso di mille libbre, il quale operando

colla sola gravità senza moto precedente, chiameremo peso morto, domando se noi potremo senza equivocazione, o fallacia affermare, la forza, ed energia di un peso di 100 libbre congiunto colla velocità acquistata nel cadere dall' altezza di quattro braccia, essere equivalente al gravitare di un peso morto di mille libbre: sicchè la virtù della sola velocità importasse, quanto la pressione di libbre novecento di peso morto, che tante ne rimangono, trattene dalle mille le cento della berta? Vedo, che amendue tardate la risposta, forse perchè bene non ho esplicita la mia domanda; però torno a brevemente dire, se possiamo per la detta sperienza asserire, che l'aggravio del peso morto farà sempre il medesimo effetto sopra una resistenza, che fa il peso di 100 libbre cadente dall' altezza di quattro braccia, in guisa tale, che (per più chiara esplicazione) cadendo l' istessa berta dalla medesima altezza, ma percuotendo sopra un più resistente palo, non lo cacciasse più che due dita, se possiamo tenerci sicuri, che l' istesso effetto facesse solo col gravitare il peso morto delle mille libbre; dico di cacciare il palo le due dita?

Apr. Io non penso, che almeno a prima fronte ciò non fusse concesso da ciascheduno.

Salv. E voi, Signor Sagredo, ci mettereste sopra qualche dubbio?

Sagr. Per ora veramente no, ma l'aver per molte, e molte esperienze provato quanto sia facile l'ingannarsi, non mi rende così baldanzoso, che del tutto mi spogli di timore.

Salv. Ora poi che V. S. la cui perspicacia ho in mille e mille occasioni conosciuta acutissima, si mostra inclinare ad ammettere la parte falsa, ben posso credere, tra mille difficile sarebbe d'incontrarne uno, o due, che in una fallacia tanto simile al vero non incappassero. Ma quello, che più vi farà maravigliare, sarà quando vedrete la fallacia esser sotto così sottile velo ricoperta, ch'ogni legger vento poteva esser bastante a scoprirla, e palesarla, e pure ne resta ella velata, e ascosa. Torniamo dunque a far cadere nel primo modo sopradetto la berta sul palo, cacciandolo sotto quattro dita, e sia vero, che per ciò fare si ricercassero puntualmente le mille libbre di peso morto, torniamo di più a sollevare alla medesima altezza l'istessa berta, la quale cadendo la seconda volta sopra il medesimo palo, lo cacci solamente due dita, per avere v. gr. incontrato il terreno più sodo, dobbiamo noi stimare, che altrettanto lo ricacciasse la pressura dell'istesso peso morto delle mille libbre?

Apr. Parmi che sì.

Sagr. Ah Sig. Paolo, miseri noi, bisogna dire risolutamente, che no; imperoc-

chè se nella prima posata il peso morto delle mille libbre cacciò il palo quattro dita , e non più , perchè volete , che l'avvernelo tolto solamente , e poi rimessoglielo sopra , torni a cacciarlo due altre dita ? e perchè non lo cacciò prima che ne fusse levato , mentre già gli era addosso ? Volete , che lo smontarlo solamente , e riposatamente riporvelo , gli faccia fare quello , che prima non potette ?

Apr. Io non posso se non arrossire , e dichiararmi d'essere stato in pericolo di sommergermi in un bicchier d'acqua.

Salv. Non vi sbigottite , Sig. Aproino , perchè vi assicuro , che avete avuto molti compagni in rimanere allacciato in nodi per altro di facilissima scioglitura ; e non è dubbio , che ogni fallacia sarebbe per sua natura d'agevole scoprimento , quando altri ordinatamente l'andasse sviluppando , e risolvendo ne' suoi principj , de' quali esser non può , che alcun suo contiguo , o poco lontano non si scopra apertamente falso. Ed in questa parte di ridurre con pochissime parole ad assurdi , ed inconvenienti palpabili conclusioni false , e state sempre credute per vere , ha il nostro Accademico avuto certo particolar genio. Ed io ho una raccolta di molte , e molte conclusioni naturali , state sempre trapassate per vere , e da esso poi con brevi , e facilissimi discorsi manifestate false.

Sagr. Questa veramente ne è una, e se l'altre saranno su questo andare, sarà bene, che a qualche tempo ce le partecipiate, ma intanto per ora seguitiamo l'intrapresa materia. Ed essendo che noi siamo sul cercare il modo (se alcuno ve ne ha) di regolare ed assegnare misura giusta e nota alla forza della percossa, questo non mi par, che conseguir si possa col mezzo dell'assegnata sperienza. Imperocchè reiterando i colpi della berta sopra il palo, e per ciascheduno ricacciandolo continuamente più e più, come la sensata esperienza ne mostra, si fa chiaro, che ciascheduno de' conseguenti colpi lavora; il che non accade nel peso morto, il quale avendo operato quello, che fece la prima pressura, non seguita di fare l'effetto della seconda, cioè di cacciare ancor di nuovo il palo, quando vi si riponga sopra: anzi apertamente si vede, che per la seconda rifitta ci vuol peso maggiore di mille libbre, e se si vorranno pareggiare con pesi morti le fitte del terzo, quarto, e quinto colpo, ec. ci vorranno le gravità di pesi morti continuamente maggiori, e maggiori: or quale di queste doveremo noi prender per ferma, e certa misura della forza del colpo, che pur quanto a se stesso è sempre il medesimo?

Salv. Questa è delle prime maraviglie, che indubitabilmente credo, che debbano avere tenuti perplessi, ed irresoluti gl'in-

gegni speculativi. E veramente a chi non giugnerà nuovo il sentire, che la misura della forza della percossa si debba prendere non da quello, che percuote, ma più presto da quello, che la percossa riceve? E quanto all'addotta esperienza pare, che da lei ritrar si possa la forza della percossa essere infinita, o vogliamo dire indeterminata, o indeterminabile, e farsi ora minore, ed ora maggiore, secondo che ella viene applicata ad una maggiore, o minore resistenza.

Sagr. Già mi pare di comprendere, che vero possa essere la forza della percossa essere immensa, o infinita; imperocchè stando nella proposta esperienza, e dato che il primo colpo cacciasse il palo quattro dita, e il secondo tre, e continuandosi d'incontrare sempre il terreno più duro, il colpo terzo vi cacci il palo due dita, il quarto uno, e mezzo, conseguentemente un sol dito, un mezzo, un quarto, ec. pare, che quando per la durezza del terreno la resistenza del palo non si faccia infinita, che il colpo reiterato sempre caccierà perpetuamente il palo, ma bene per ispazj minori e minori: ma perchè quanto si voglia lo spazio sia breve, è egli però divisibile, e suddivisibile sempre, si continueranno le fitte, e perchè la seguente dovendosi fare coll'aggravio di peso morto richiede peso maggiore, che l'antecedente, potrà essere, che per pareggia-

re le forze dell' ultime percosse si ricerchi peso maggiore e maggiore in immenso.

Salv. Così crederei io veramente.

Apr. Non potrà dunque essere resistenza alcuna così grande, che resti salda, e contumace contro al potere di alcuna percossa benchè leggera?

Salv. Penso di no, se quello in che si percuote non è del tutto immobile, cioè non è la sua resistenza infinita.

Sagr. Mirabili, e per modo di dire prodigiosi pajono questi asserti, e che l'arte in questo solo effetto superi, e defraudi la Natura, cosa che nella prima apparenza par che facciano altri strumenti meccanici ancora, alzandosi gravissimi pesi con poca forza in virtù della leva, della vite, della taglia, ed altri: ma in questo effetto della percossa, che pochi colpi di martello non più pesante di 10, o 12 libbre abbiano ad ammaccare v. g. un dado di rame, il quale non infragnerebbe, nè ammaccherebbe il carico non solo di una vastissima guglia di marmo, ma nè anco una torre altissima, che sopra il martello si posasse, eccede, pare a me, ogni natural discorso, che tentasse di torne la maraviglia, però Sig. Salv. mettete mano al filo, e cavateci di così intrigati laberinti.

Salv. Da quanto essi producono pare, che il nodo principale della difficoltà batta qua, che non bene si comprenda come

l'operazione della percossa, che sempre infinita, non debba di necessità procedere per mezzi diversi da quelli di altre macchine, che con pochissima forza superano resistenze immense. Tuttavia io non dispero di poter esplicare, come in questa ancora si procede nella medesima maniera. Tenterò di spiegarne il progresso; e benchè mi pajia assai complicato, forse il mio dire potrebbe dal vostro dubitare, ed opporre assottigliarsi ed acuirsi tanto, che allargasse almeno, se non del tutto sriogliesse il nodo. E manifesto la facoltà della forza del movente, o della resistenza del mosso non essere una e semplice, ma composta di due azioni, dalle quali la loro energia dee essere misurata; l'una delle quali è il peso sì del movente, come del resistente, e l'altra è la velocità, secondo la quale quello dee muoversi, e questo esser mosso. E così quando il mosso dee muoversi colla velocità del movente, cioè che gli spazj passati da amendue nell'istesso tempo sieno eguali, impossibile sarà, che la gravità del movente sia minore di quella del mosso, ma sibbene alquanto maggiore, attesochè dalla puntuale egualità nasce l'equilibrio, e la quiete, come si vede nella bilancia di braccia eguali. Ma se noi vorremo con peso minore sollevarne un maggiore, bisognerà ordinar la macchina in modo, che il peso movente minore si mo-

va nell'istesso tempo per ispazio maggiore dell'altro peso, che è quanto a dire, che quello più velocemente si muova di questo; e così di già la ragione, non meno che l'esperienza ci mostra, che per esempio nella stadera acciocchè il peso del romano possa alzare un altro 10, o 15 volte di lui più grave, bisogna, che la sua lontananza nell'ago, sia lontana dal centro, intorno al quale si fa il moto 10, o 15 volte più, che la distanza tra il medesimo centro, ed il punto della sospensione dell'altro peso; che è il medesimo, che dire, che la velocità del movente sia 10, o 15 volte maggiore della velocità del mosso. E perchè questo si scorge accadere in tutti gli altri strumenti, possiamo con sicurezza stabilire, che le gravità, e velocità coll'istessa proporzione, ma alternatamente prese si rispondano. Generalmente dunque diciamo il momento del men grave pareggiare il momento del più grave, quando la velocità del minore alla velocità del maggiore abbia l'istessa proporzione, che la gravità del maggiore a quella del minore, al quale ogni poco vantaggio, che si conceda, supera l'equilibrio, e si introduce il moto. Fermato questo, io dico, che non solamente nella percossa la sua operazione pare infinita circa il superare qualsivoglia somma resistenza, ma tale si mostra ella in qualsivoglia altro meccanico ordigno; perchè non è egli manifesto, che un piccolissimo

peso di una libbra scendendo alzerà un peso di 100, e di 1000, e più quanto ne piace, se noi lo costituiremo nell'ago della stadera cento o mille volte più lontano dal centro, che l'altro peso massimo, cioè se noi faremo, che lo spazio, per lo quale scenderà quello, sia cento, e mille, e più volte maggiore dello spazio della salita, dell'altro, cioè se la velocità di quello sia cento, e mille volte maggiore della velocità di questo? Ma voglio con uno più arguto esempio farli toccar con mano, come qualsivoglia piccolissimo peso scendendo faccia salire qualsivoglia immensa e gravissima mole. Intenda V. S. un tal' vastissimo peso essere attaccato a una corda fermata in luogo stabile, e sublime, intorno al quale, come centro, intenda esser descritta la circonferenza di un cerchio, che passi pel centro di gravità della sospesa mole, il qual centro di gravità è noto, che viene a perpendicolo sotto la corda della sospensione, o per meglio dire, è in quella retta linea, che dal punto della sospensione va a terminare nel centro comune di tutti i gravi, cioè nel centro della Terra. Immaginatevi poi un altro filo sottilissimo, al quale sia attaccato qualsivoglia peso benchè minimo, in guisa che il centro di gravità di questo termini nella già immaginata circonferenza; e ponete questo piccolo peso andare a toccare, e semplicemente appoggiarsi a quella vasta mole, non credete voi, che aggiunto

per fianco questo nuovo peso spignerà alquanto quel massimo, separando il suo centro di gravità dalla già immaginata linea perpendicolare, nella quale prima si trovava, e senza dubbio si muoverà per la circonferenza già detta, e movendovisi si separerà dalla linea orizzontale, che è la tangente della detta circonferenza nell'imo punto, dove si trovava esso centro di gravità della gran mole? E quanto allo spazio tanto sarà l'arco passato dal gravissimo, quanto il passato dal piccolissimo peso, che al grandissimo si appoggiava; ma non sarà già la salita del centro del peso massimo eguale alla scesa del centro del peso minimo, perchè questo scende per un luogo, o spazio molto più inclinato, che non è quello della salita dell'altro centro, che vieu fatta dal contatto del cerchio in certo modo, secondo un angolo minore di ogni acutissimo. Qui se io avessi a trattare con persone men versate di voi nella Geometria, dimostrerei, come partendosi un mobile dall'imo punto del contatto, può benissimo essere, che l'alzamento dalla linea orizzontale di qualche punto della circonferenza separato dal contatto, sia secondo qualsivoglia proporzione minore dell'abbassamento di un asse a questo eguale, preso in qualsivoglia altro luogo, purchè in esso non si contenga il contatto. Ma voi son sicuro, che in ciò non avete dubbio. E se il semplice appoggiarsi del piccol peso alla

gran mole può muoverla , ed alzarla , che sarà se discostandolo , e lasciandolo scorrere per la circonferenza egli vi anderà a percuotere ?

Apr. Veramente non mi pare , che ci resti più luogo di dubitare , la forza della percossa essere infinita per quanto l'addotta esperienza ne dichiara ; ma tal notizia non basta al mio intelletto a schiarirmi molte oscure tenebre , le quali lo tengono offuscato in modo , che non discerno come il negozio di queste percosse cammini , sicchè io potessi rispondere ad ogni dubbio , che mi fusse promosso.

Salv. Ma prima che io passi più oltre , voglio scoprirvi un certo equivoco , che sta nascoso , e come in aguato , e ci lascia stimare tutti quei colpi , con i quali nel soprapposto esempio si andava cacciando il palo , esser eguali , o vogliamo dire gl'istessi , sendo fatti dalla medesima berta elevata sopra il palo sempre alla medesima altezza , il che non è vero. Per intelligenza di che , figuratevi di andare ad incontrare colla mano una palla , che venga scendendo da alto , e ditemi , se nell'arrivare ella sopra la vostra mano , voi la mano andaste abbassando per la medesima linea , e colla medesima velocità , che scende la palla , ditemi , dico , qual percossa voi sentireste ? certo nessuna. Ma se all'arrivo della palla voi andaste solamente in parte cedendo , con abbassar la mano con minor

velocità di quella della palla, voi bene ricevereste percossa, ma non come da tutta la velocità della palla, ma solamente come dall'eccesso della velocità di quella sopra la velocità della cedenza della mano, sicchè quando la palla scendesse con 10 gradi di velocità, e la mano cedesse con otto, il colpo sarebbe come fatto da due gradi di velocità della palla, e cedendo la mano con 4 il colpo sarebbe come di 6, ed essendo il cedere come uno, il percuo-ter sarebbe come di 9. e tutta l'intera percossa della velocità de' 10 gradi sarebbe quella, che percotesse sopra la mano, che nulla cedesse. Applicando ora il discorso alle percosse della berta, mentre il palo cede la prima volta 4 dita, e la seconda 2, e la terza un sol dito all'impeto della berta, le percosse rimangono disuguali, e la prima più debole della seconda, e la seconda più della terza, secondo che la cedenza della 4 dita più detrae dalla velocità del primo colpo, che la seconda, e questa è più debole della terza, come quella, che toglie il doppio più di questa dalla medesima velocità. Se dunque il molto cedere del palo alla prima percossa, ed il meno cedere alla seconda, e meno anco alla terza, e così sempre continuatamente, è cagione, che men valido sia il primo colpo del secondo; e questo del terzo, che maraviglia è, che manco quantità di peso morto si ricerchi per la prima cacciata del-

le 4 dita, e che maggiore ne bisogni per la seconda cacciata delle due dita, e maggiore ancora per la terza, e sempre più e più continuatamente, secondo che le cacciate si vanno diminuendo nelle diminuzioni delle cedenze del palo, che è quanto a dire nell'augumento delle resistenze? Da quanto ho detto mi pare, che agevolmente si possa raccorre, quanto malagevolmente si possa determinare sopra la forza della percossa fatta sopra un resistente, il quale vada variando la cedenza, quale è il palo, che indeterminatamente va più e più resistendo: laonde stimo, che sia necessario, l'andar contemplando sopra tale, che ricevendo le percosse a quelle sempre colla medesima resistenza si opponga. Ora per istabilire tal resistente, voglio, che ci figuriamo un solido grave per esempio di mille libbre di peso, il quale posi sopra un piano, che lo sostenti; voglio poi, che intendiamo una corda a cotal solido legata, la quale cavalchi sopra una carrucola fermata in alto per buono spazio sopra detto solido. Qui è manifesto, che aggiugnendo forza traente in giù all'altro capo della corda, nel sollevar quel peso si averà sempre una egualissima resistenza, cioè il contrasto di mille libbre di gravità; e quando da quest'altro capo si sospenda un altro solido egualmente pesante come il primo, verrà da essi fatto l'equilibrio, e stando sollevati, senza che sopra alcuno sottoposto sostegno si appog-

gino, staranno fermi, nè scenderà questo secondo grave alzando il primo, salvo che quando egli abbia qualche eccesso di gravità. E se riposeremo il primo peso sopra il soggetto piano, che lo sostenga, potremo far prova con altri pesi di diversa gravità (ma ciascheduna minore del peso, che riposa in quiete) quali siano le forze di diverse percosse, con legare alcuno di questi pesi all' altro capo della corda, lasciandolo da qualche altezza cadere, ed osservando quello, che segue nell' altro gran solido nel sentir la strappata dell' altro peso cadente, la quale strappata sarà ad esso gran peso come un colpo, che lo voglia cacciare in su. Qui primieramente mi pare, che si raccolga, che per piccola che sia la gravità del peso cadente, doverà senz' altro superare la resistenza del peso gravissimo, ed alzarlo, la qual conseguenza mi par, che si tragga molto concludentemente dalla sicurezza, che abbiamo, come un peso minore prevarrà ad un altro quanto si voglia maggiore, qualunque volta la velocità del minore abbia maggior proporzione alla velocità del maggiore, che non ha la gravità del maggiore alla gravità del minore: ma ciò segue nel presente caso, nel quale la velocità del peso cadente supera d' infinito intervallo quella dell' altro peso, la quale è nulla, posando egli in quiete: ma non già è nulla la gravità del solido cadente, in relazione alla gravità dell' altro,

non ponendo noi questa infinita, nè quella nulla: supererà dunque la forza di questo percuziente la resistenza di quello, in cui si impiega la percossa. Seguita ora, che cerchiamo d'investigare, quanto sia per essere lo spazio, al quale la ricevuta percossa lo solleverà; e se forse questo risponda a quello degli altri strumenti meccanici, come per esempio nella stadera si vede l'alzamento del peso grave esser quella tal parte dello abbassamento del romano, quale è il peso del romano dell'altro peso maggiore, e così nel caso nostro bisogna, che vediamo, se essendo la gravità del gran solido posto in quiete, per esempio, mille volte maggiore della gravità del peso cadente, il quale caschi dall'altezza v. g. di un braccio, egli sia alzato da questo minore un centesimo di braccio, che così pare, che venisse osservata la regola degli altri strumenti meccanici. Figuriamoci di fare la prima esperienza, col far cadere da qualche altezza, diciamo di un braccio un peso eguale all'altro, che ponghiamo posare sopra un piano, essendo amendue tali pesi legati, l'uno all'un capo, e l'altro all'altro capo dell'istessa corda; che crediamo noi, che sia per operare la strappata del peso cadente circa il muovere, e sollevare l'altro, che era in quiete? lo volentieri sentirei l'opinione vostra.

Apr. Poichè V. S. guarda verso di me, comechè da me ella attenda la rispo-

sta, mi pare che essendo ambedue i solidi egualmente gravi, ed avendo il cadente di più l'impeto della velocità, l'altro ne doverà esser innalzato assai sopra l'equilibrio; imperocchè per ridurlo in bilancio la sola gravità di quello era bastante; sormonterà dunque per mio credere il peso ascendente per molto maggiore spazio di un braccio, che è la misura della scesa del cadente.

Salv. Che dice V. S. Sig. Sagredo?

Sagr. Il discorso mi pare assai concludente nel primo aspetto, ma, come poco fa dissi, le molte esperienze mi hanno insegnato, quanto sia facile l'ingannarsi, e però quanto sia necessario l'andar circospetto prima che risolutamente pronunziare, ed affermare alcun detto. Dirò dunque (però sempre dubitando) che è vero, che il peso v. g. delle 100 libbre del grave descendente basta per alzare l'altro, che pure pesi 100 libbre insino allo equilibrio, senza che quello venga instrutto e fornito d'altra velocità, e basterà solo l'eccesso di mezza oncia, ma vo considerando, che questa equilibrabione verrà fatta con gran tardità; dove che quando il cadente sopraggiunga con gran velocità, con una simile bisognerà, che tiri in alto il suo compagno; ora non mi pare, che sia dubbio, che maggior forza ci voglia a cacciar con gran velocità un grave all'in su, che a spingnervelo con gran lentezza: onde possa

accadere, che il vantaggio della velocità guadagnata dal cadente nella libera caduta in un braccio, possa rimaner consunto, e per modo di dire, spento nel cacciar l'altro con altrettanta velocità ad altrettanta altezza, perlochè non sarei lontano dal credere, che tali due movimenti in giù, ed in su terminassero in quiete immediatamente dopo la salita di un braccio, che sarebbero due braccia di scesa dell'altro, computandovi il primo braccio, che questo scese libero e solo.

Salv. Io veramente inclino a credere questo stesso, perchè sebbene il peso cadente è un aggregato di gravità e di velocità, l'operazione della gravità nel sollevare l'altro è nulla, avendo a se opposta e renitente altrettanta gravità dell'altro peso, il quale è manifesto, che mosso non sarebbe senza l'aggiunta all'altro di qualche piccola gravità: l'operazion dunque, per la quale il peso cadente dee sollevare l'altro, è tutta della velocità, la quale altro che velocità non può conferire; nè potendo conferirne altra, che quella, che egli ha, e non avendo altra, che quella, che partendosi dalla quiete ha guadagnata nello spazio della scesa di un braccio; per altrettanto spazio, e con altrettanta velocità spignerà l'altro all'in su, conformandosi con quello, che in varie esperienze si può riconoscere, che è, che il grave cadente partendosi dalla quiete si trova in ogni sito aver tant'impeto, che basta per ridur se stesso alla medesima altezza.

Sagr. In quel modo, che ora mi sovviene accadere in un grave pendente da un filo, che sia fermato in alto, il qual grave rimosso dal perpendicolo per un arco di qualsivoglia grandezza, non maggiore di una quarta, lasciato in libertà scende, e trapassa oltre al perpendicolo, salendo altrettanto arco quanto fu quello della scesa; dove è manifesto la salita derivar tutta dalla velocità appresa nello scendere; imperocchè nel montare in su, niuna parte vi può avere la gravità del mobile, ma bene repugnando questa alla salita, va spogliando esso mobile di quella velocità, della quale nella scesa lo veste.

Salv. Se l'esempio di quello, che fa il solido grave appeso al filo, del quale mi sovviene, che parlammo ne' discorsi dei giorni passati, quãdrasse, e si aggiustasse così bene al caso, del quale noi di presente trattiamo, come ei si aggiusta alla verità, molto concludente sarebbe il discorso di V. S. ma non piccola discrepanza trovo io tra queste due operazioni, dico tra quella del solido grave pendente dal filo, che lasciato da qualche altezza, scendendo per la circonferenza del cerchio, acquista impeto di trasportare se medesimo ad altrettanta altezza: e l'altra operazione del cadente legato ad un capo della corda per innalzare l'altro a se eguale in gravità; imperocchè lo scendente per lo cerchio va acquistando velocità sino al perpendico-

lo favorito dalla propria gravità, la quale trapassato il perpendicolo lo disajuta nel dovere ascendere, (che è moto contrario alla gravità) sicchè dello impeto acquistato nella scesa naturale, non piccola ricompensa è il ricondurlo con moto perternaturale, o per altezza. Ma nell'altro caso sopraggiugne il grave cadente al suo eguale posto in quiete, non solamente colla velocità acquistata, ma colla sua gravità ancora, la quale mantenendosi leva per se sola ogni resistenza di essere alzato all'altro suo compagno, perlochè la velocità acquistata non trova contrasto di un grave, che allo andare in su faccia resistenza, talchè se come l'impeto conferito all'ingiuà ad un grave non trova in esso ragione di annichilarsi, o ritardarsi, così non si ritrova in quello ascendente, la cui gravità rimane nulla, essendo contrappesata da altrettanta descendente. E qui mi pare, che accada per appunto quello, che accade ad un mobile grave, e perfettamente rotondo, il quale se si porrà sopra un piano pulitissimo, ed alquanto inclinato, da per se stesso naturalmente vi scenderà, acquistando sempre velocità maggiore; ma se per l'opposito dalla parte bassa si vorrà quella cacciare in su, ci bisognerà conferirgli impeto, il quale si anderà sempre diminuendo, e finalmente annichilando; ma se il piano non sarà inclinato, ma orizzontale, tal solido rotondo postovi se-

pra farà quello, che piacerà a noi, cioè se ve lo metteremo in quiete, in quiete si conserverà, e dandogli impeto verso qualche parte, verso quella si moverà, conservando sempre l'istessa velocità, che dalla nostra mano averà ricevuta, non avendo azione nè di accrescerla, nè di scemarla, non essendo in tal piano nè declività, nè acclività, ed in simile guisa i due pesi eguali pendenti da due capi della corda ponendogliene in bilancio, si quieteranno, e se ad uno si darà impeto all'ingiù, quello si andrà conservando equabile sempre. E qui si dee avvertire, che tutte queste cose seguirebbero, quando si rimovessero tutti gli esterni, ed accidentari impedimenti, dico di asprezza, e gravità di corda, di girelle, e di stropicciamenti nel volgersi intorno al suo asse, ed altri, che ve ne potessero essere; ma perchè si è fatta considerazione della velocità, la quale l'uno de' due pesi eguali acquista scendendo da qualche altezza, mentre l'altro posi in quiete, è bene determinare, quale, e quanta sia per essere la velocità, colla quale sieno per muoversi poi amendue, dopo la caduta dell'uno, scendendo questo, e salendo quello. Già per le cose dimostrate noi sappiamo, che quel grave, che partendosi dalla quiete liberamente scende, acquista tuttavia maggiore e maggior grado di velocità perpetuamente, sicchè nel caso nostro il grado massimo di

velocità del grave mentre liberamente scende, è quel che si trova avere nel punto, che egli comincia a sollevare il suo compagno, ed è manifesto, che tal grado di velocità non si andrà più augumentando, essendo tolta la cagione dello augumento, che era la gravità propria di esso grave descendente, la quale non opera più, essendo tolta la sua propensione di scendere dalla repugnanza del salire di altrettanto peso del suo compagno. Si conserverà dunque il detto grado massimo di velocità, ed il moto di accelerato si convertirà in equabile; quale poi sia per essere la futura velocità, è manifesto dalle cose dimostrate e vedute ne' passati giorni, cioè che la velocità futura sarà tale, che in altrettanto tempo, quanto fu quello della scesa, si passerà doppio spazio di quello della caduta.

Sagr. Meglio dunque di me aveva filosofato il Sig. Aproino, e sin qui resto molto bene appagato del discorso di V. S. ed ammetto per verissimo quanto mi ha detto: ma per ancora non mi sento aver fatto acquisto tale, che mi basti per levare l'eccessiva maraviglia, che sento nel vedere essere superate resistenze grandissime dalla virtù della percossa del percuziente, ancorchè nè molta sia la sua gravità, nè eccessiva la sua velocità, e quello, che ne accresce lo stupore è il sentire, che ella afferma nessuna essere la resistenza (salvo

che se fusse infinita) che al colpo possa resistere senza cedere ; e più , che di tal percossa non si possa in veruna maniera assegnare una determinata misura ; però il desiderio nostro sarebbe , che V. S. mettesse mano a dilucidare queste tenebre.

Salv. Essendo che non si può applicare dimostrazione alcuna sopra una proposizione , della quale il dato non sia uno , e certo , però volendo noi filosofare intorno la forza di un percuziente , e la resistenza di quello , che la percossa riceve , bisogna che prendiamo un percuziente , la cui forza sia sempre l'istessa ; quale è quella del medesimo grave cadente sempre dalla medesima altezza ; e parimente stabilischiamo un ricevitore del colpo , la cui resistenza sia sempre la medesima. E per averlo tale voglio , che (stando su l'esempio di sopra dei due gravi pendenti dai capi dell'istessa corda) che percuziente sia il piccol grave , che si lascia cadere , e che l'altro quanto si voglia maggiore sia quello , nell'alzamento del quale venga esercitato l'impeto del piccolo cadente ; dove è manifesto , la resistenza del grande esser sempre , ed in tutti i luoghi la medesima cosa , il che non accade nella resistenza del chiodo , o del palo , ne' quali ella va sempre crescendo nel penetrare , e con proporzione ignotissima per gli accidenti varj , che s'interpongono di variate durezza nel legno , e nel terreno , ec. an-

corchè il chiodo, ed il palo sieno sempre i medesimi. In oltre è necessario, che ci riduciamo a memoria alcune conclusioni vere, delle quali si parlò a' giorni passati nel trattato del moto; e sia la prima di esse, che i gravi descendentì da un punto sublime sino a un soggetto piano orizzontale, acquistano eguali gradi di velocità, sia la scesa loro fatta o nella perpendicolare, o sopra qualsivogliano piani diversamente inclinati, come per esempio, essendo A B (Fig. XLII.) un piano orizzontale, sopra il quale dal punto C caschi la perpendicolare C B, e dal medesimo C altre diversamente inclinate C A, C D, C E, dobbiamo intendere i gradi di velocità dei cadenti dal punto sublime C, per qualsivoglia delle linee che dal punto C vanno a terminare nell'orizzontale, essere tutti eguali. In oltre si dee nel secondo luogo supporre l'impeto acquistato in A dal cadente dal punto C, esser tanto quanto appunto si ricercerebbe per cacciare in alto il medesimo cadente, o altro a lui eguale sino alla medesima altezza; onde possiamo intendere, che tanta forza bisogna per sollevar dall'orizzonte sino all'altezza C l'istesso grave, venga egli cacciato da qualsivoglia de' punti A, D, E, B. Riduchiamoci nel terzo luogo a memoria, che i tempi delle scese per i notati piani inclinati hanno tra di loro la medesima proporzione, che le lunghezze di essi pia-

ni; sicchè quando per esempio il piano A C fosse lungo il doppio del C E, e quadruplo del C B, il tempo della scesa per C A sarebbe doppio del tempo della scesa per C E, e quadruplo della caduta per C B. In oltre ricordiamoci, che per far montare o vogliam dire, per strascicare l'istesso peso sopra i diversi piani inclinati, sempre minor forza basta per muoverlo sopra il più inclinato, che sopra il meno, secondo che la lunghezza di questo è minore della lunghezza di quello. Ora stante questi veri supposti finghiamoci il piano A C (Fig. XLIII.) esser v. gr. dieci volte più lungo del perpendicolo C B, e sopra esso A C esser posato un solido S, pesante cento libbre: è manifesto, che se a tal solido fusse attaccata una corda, la quale calcasse sopra una girella posta più alta del punto C, la qual corda nell' altro suo capo avesse attaccato un peso di 10 libbre, qual sarebbe il peso P, è manifesto, che tal peso P, con ogni poco di giunta di forza, scendendo tirerebbe il grave S sopra il piano A C. E qui si dee notare, che sebbene lo spazio, per lo quale il maggior peso si muove sopra il suo piano soggetto, è eguale allo spazio per lo quale si muove il piccolo descendente (onde alcuno potrebbe dubitare sopra la generale verità di tutte le meccaniche proposizioni, cioè che piccola forza non supera, e muove gran resistenza, se non quando il moto

assolutamente farebbero effetto ed operazione assai maggiore in muoverlo, e superarlo, che applicato in tempo benchè brevissimo; dico effetto maggiore, perchè pure qualche effetto faranno eglino contro il percosso, quantunque minima si sia la percossa, e grandissima la cedenza; ma sarà forse impercettibile tale effetto a' nostri sensi, contuttochè realmente vi sia, il che a suo luogo dimostreremo; ma pure ciò manifestamente si scorge dall'esperienza; poichè se con un ben piccolo martello si andrà con percosse uniformi incontrando la testa di una grandissima trave, che sia a giacere in terra, dopo molte e molte percosse si vedrà finalmente essersi mossa la trave per qualche spazio percettibile, segno evidentissimo, che ogni percossa operò separatamente per la sua parte nello spingere la trave; poichè se la prima percossa non fusse a parte di tal effetto, tutte le altre susseguenti, come in luogo di prime, niente affatto opererebbero, la qual cosa è contraria all'esperienza, al senso, ed alla dimostrazione, che si apporterà, ec.





La forza della percossa è di infinito momento, perchè non vi è resistenza benchè grandissima, che non venga superata da forza di percossa minimissima.


Colui che serra le porte di bronzo di S. Giovanni, invano tenterebbe di serrarle

con una sola e semplice spinta, ma con impulso continuato va imprimendo in quel corpo mobile gravissimo forza tale, che quando arriva a percuotere, ed urtare nella soglia, fa tremare tutta la Chiesa. Da questo si veda come si imprima ne' mobili, e più ne' più gravi, ed in essi si moluplichì, e conservi la forza, che con qualche tempo gli si va comunicando, ec.



Simile effetto si vede in una grossa campana, che non con una sola tirata di corda, nè quattro, nè sei si mette in moto gagliardo ed impetuoso, ma con molte e molte, le quali a lungo reiterate, le ultime vanno aggiugnendo forza sopra quella acquistata dalle prime, e precedenti strappate, e quanto più grossa e grave sarà la campana, tanto maggiore forza ed impeto acquisterà, essendogli comunicato in più lungo tempo, e da maggior numero di strappate, che non si ricerca ad una piccola campana; che ben presto si mette in impeto, ma presto ancora le si toglie, non essendosi ella imbevuta (per così dire) di tanta forza quanto la più grossa.

Il simile accade ne' navigli ancora, i quali non alle prime vogate de' remi, o ai primi impulsi del vento si mettono in furioso corso, ma dalle continue vogate, e dalla continua impressione di forza, che fa il vento nelle vele, acquistano impeto grandissimo atto a fracassare gl' istessi vascelli,







F. 30.




F. 37.



F. 44.



F. 43.





mentre da quello portato dessero d'urto in uno scoglio.

L'arco dolce, ma grande d'una balestra, farà talvolta maggior passata d'un altro assai più duro, ma di minor tratta, poichè quello accompagnando per più tempo la palla, gli va continuamente imprimendo la forza, e questo tosto l'abbandona.

TRATTATO DELLE RESISTENZE

PRINCIPIATO DA

VINCENZIO VIVIANI

PER ILLUSTRARE L'OPERE

DEL GALILEO,

Ed ora compiuto, e riordinato colla giunta di quelle dimostrazioni che vi mancavano

DAL P. D. GUIDO GRANDI

Abate Camaldolese, Matematico di S. A. R.
e dello Studio Pisano.



Definizioni Prime.

I. *M*omento assoluto d'un grave, e d'altra qualsivoglia forza, animata, o no, s'intenda quel premere libero, e non

impedito, che fa il grave, o la forza all'ingiù per la perpendicolare all'orizzonte.

II. Resistenza assoluta della sezione d'un corpo, s'intenda quella repugnanza, che le parti del solido, mediante la coerenza di dette parti in quella sezione, hanno ad essere separate dal momento assoluto d'un grave, o d'una forza.

III. Misura assoluta della resistenza assoluta d'una sezione s'intenda quel momento assoluto d'un grave, o d'una forza, che equivaglia alla detta resistenza assoluta: cioè che con ogni poco di giunta di peso, o di forza ne segua lo strappamento delle dette parti in detta sezione.

IV. Resistenza omogenea uniforme.....

V. Centro delle resistenze....

N O T E.

Prima di supplire queste due definizioni rimase imperfette, piacemi d'illustrare, colla scorta di ciò, che altrove accenna il nostro Autore, le definizioni precedenti, e d'inserirvene prima alcune altre, le quali pare che manchino, e verisimilmente vi sarebbero state aggiunto dallo stesso Autore, se avesse potuto dare compimento a quest'Opera.

Galileo Galilei Vol. IX. 13

Il premere libero, e non impedito d'un grave, o d'altra forza animata s'intende, quando preme senza verun vantaggio, o svantaggio, che possa apportargli l'ajuto d'una leva, o di una contralleva, per cui operi la forza, o la resistenza contrapposta: e questo dicesi momento assoluto, il quale in se stesso è sempre invariabile, dipendendo dal peso di quel grave, o pure da quella quantità di peso; che quella forza animata regger potrebbe, senz'altra macchina applicandosi a sostenerlo. Onde coerentemente altresì la resistenza assoluta della sezione d'un corpo è la quantità di quella forza, che tiene attaccate nella detta comune sezione le parti del corpo, sicchè resistano allo strappamento, che ne farebbe, direttamente tirando, cioè con direzione perpendicolare al piano di detta sezione, un peso attaccatovi, o pure una forza animata, che vi si applicasse col suo assoluto momento, cioè senza l'ajuto d'alcuna leva, che ne faciliti l'effetto dello spezzarsi.

E perchè quella tal qual forza, che connette le parti del solido, non è a noi in se stessa nota: e si disputa ancora tra i filosofi naturali, donde ella dipenda; se dalla tessitura ed intralciamento delle fibre, o dallo squisito contatto d'ogni particella, o dalla pressione dell'ambiente, o da altro glutine interpostovi; perciò volendo pure esaminarne il valore, e paragonare le di-

verse resistenze, che a varie figure, o quantità di sezioni possono convenire, non si può far altro, che misurare il valore di qualunque resistenza col minimo peso, che possa direttamente premendo superarla, o col grandissimo e sommo peso, che dal solido regger si possa prima di cedere, e di spezzarsi: essendo pure il dovere, che se una forza, appoco appoco crescendo, giugne finalmente a vincere un'altra forza, prima d'arrivare a questo segno, si equilibri con essa, e precisamente uguagli col l'assoluto momento suo il valore di quella, non potendo di minore diventare successivamente maggiore, se prima in qualche differenza di tempo non si fa uguale alla forza competitrice. E però, se avendo attaccato fortemente in alto alla volta d'una camera un cilindro di vetro, di pietra, o di metallo s'intenderà questo talmente prolungarsi, che venga col proprio peso a rompersi: o pure se vi si attaccherà successivamente maggiore e maggior peso, finattanto che tra il proprio peso del cilindro, e quello che si aggiunge da' piedi, ne succeda finalmente l'effetto dello strappamento: quel minimo peso, che è abile a spezzare il corpo, o veramente quel sommo, che da esso si può sostenere senza spezzarsi, e che precisamente pareggia l'assoluta resistenza di quella sezione del cilindro, che dovrà scoprirsi nella rottura, con ragione si assumono per determinata

misura di quella resistenza. E torna lo stesso prender l'uno, o l'altro dei detti pesi, cioè il maggiore che possa reggersi, ed il minimo abile a rompere il corpo: non differendo questi da queglii, che d'una quantità minore di qualsisia proposta, e per così dire infinitamente piccola, per cui appresso a' Matematici non si altera l'uguaglianza.

Ma sentiamo il nostro Autore, che in questo proposito altrove si dichiara così.

La resistenza d'un solido assolutamente presa, s'intenda esser sempre misurata da quel peso, che posto nell'estremità del solido fitto per di sopra in una volta, o comunque fermato da un capo nel muro, purchè il peso tiri direttamente a perpendicolo del piano della rottura, è bastante appunto a spezzarlo.

Sicchè nel prolungare perpendicolarmente il cilindro A B (Fig. 1.), finchè segua il moto, cioè si faccia lo strappamento di esso dalla parte superiore, si viene con ciò a misurare la sua resistenza, imperocchè questo è l'istesso appunto, che dire, che la resistenza in B equivale al momento assoluto B A.

Si sperimenti adunque quanto peso ci voglia a strappare i cilindri di vetro per diritto a piombo, che abbiano questa, o simil figura. A B (Fig. 11.) sia un piano stabile in forma di due piastre, ne' tagli delle quali siano gli scavi in semicircolo

d'un foro , dove accostate insieme, passi la verga di vetro C D. rimanendovi impegnata col suo termine superiore C più grosso del fusto , attaccando poscia al termine inferiore D tanto peso E , che faccia lo strappamento.

Di qui si cava la tariffa delle resistenze assolute d' uguali sezioni di metalli , e si può provare , se doppia sezione voglia doppio peso , come la ragione ce ne persuade.

Però supposta nota la resistenza d'un solido d' una data materia , che vien misurata dalla forza , che la supera , tirandola perpendicolarmente , si potrà con regola misurare le resistenze rispettive (secondo la diffinizione da apportarsi qui appresso) de' medesimi solidi tenuti orizzontalmente , o in altra inclinazione.

Ora seguendo l' ordine delle prime definizioni , per supplire ciò che manca nel MS. del nostro Autore , diremo.

Defin. IV. *Momento rispettivo d'un grave , o d'altra forza animata s'intenda quell' energia , che ha in riguardo alla maniera , con cui si applica per via di leva , o d'altra macchina , a muovere qualsivoglia resistenza ; il quale momento conseguentemente varia , secondo la distanza dal centro del moto , e secondo la lunghezza della contralleve , con cui opera il resistente , dalla quale riceve maggiore , o minore vantaggio.*

V. Resistenza rispettiva della sezione d' un corpo è quella forza , con cui contrasta ad essere spezzato esso corpo nella detta sezione , posata sopra qualche sostegno , quando il peso , o altra forza animata , cho s' applica a farne lo strappamento , tira obliquamente al piano della medesima sezione , coll' ajuto di maggiore , o minor leva , secondo cui conseguentemente si varia in diverse circostanze il valore di tal resistenza : venendo sempre misurata dal più gran peso , che possa reggere , o dal minimo di quelli , che in tal disposizione sieno abili a superarla ; e viene a significare lo stesso , che il momento della resistenza assoluta , che gli conviene in diverse circostanze.

VI. Resistenza omogenea uniforme della sezione d' un solido , è quando ciascuna fibra d' essa ha uguale resistenza assoluta , sicchè dallo stesso momento assoluto d' un grave , o d' altra forza perpendicolarmente applicatavi può ciascheduna essere superata.

VII. Resistenza varia e difforme della sezione di un solido sarà , quando le fibre di esso , non essendo ugualmente forti , non averanno ugual resistenza assoluta , ma da diversi momenti assoluti potrà qualunque di esse venire costretta allo strappamento , come accade in un legno nodoso , in un marmo di varie vene vergato , ec.

VIII. Centro delle resistenze è quel punto, in cui raccolta si concepisce tutta la forza delle resistenze sparse per ogni fibra; nella maniera che il centro di gravità si dice quel punto, in cui raccolta si concepisce l'azione della gravità d'un corpo; anzi si crede l'uno, e l'altro centro essere lo stesso punto.

Così il Galileo, Padre di questa scienza, da per tutto suppone; ed è senza contestata alcuna in ciò seguitato dal Blondello, dal Leibnizio, dal Varignonio, e dal Bernoullio, e da quant'altri hanno poscia trattato di resistenze: i quali tutti concepiscono la resistenza rispettiva di qualsivoglia sezione d'un corpo, applicata nel centro di gravità, e come riunitasi in esso: mentre gli danno per leva, con cui l'azione sua si rende più vantaggiosa, la distanza di detto centro di gravità dall'appoggio, sopra di cui far si debbe lo strappamento; della quale supposizione però niuno mettendosi in pena d'assegnarne qualche verisimil ragione, tanto più è da stimarsi l'acutezza del nostro Autore, che si provò, come sopra, a dare una particolare definizione del centro delle resistenze: sebbene non l'abbiamo ne' suoi scritti ritrovata compiuta: e di più ne accenna altrove il fondamento col seguente discorso.

E verissimo, che il centro di gravità della sezione del solido fitto nel muro è il centro della resistenza dell'attaccamento

dell' una superficie coll' altra sua contigua: poichè gl' infiniti attaccamenti, e resistenze si debbono supporre e considerare tutte uguali, mentre il solido sia di materia omogenea. Se dunque le resistenze di que' filamenti del solido sono tutte uguali, e di uguale spessezza, saranno come tanti pesi eguali distribuiti in distanze eguali in una leva, che è la sezione, e che gravitano nel loro centro di gravità comune, che è il centro di gravità di detta leva.

Il che volendo più pienamente dichiarare, secondo la mente del nostro Autore, la quale abbastanza riluce dallo schizzo d' una figura ivi disegnata, e dalle parole addotte di sopra: diremo, che la forza, per cui attaccate si tengono le fibre d' un corpo, fa il medesimo effetto, che farebbe un peso, il quale calcasse, e comprimesse ciascuna parte contro dell' altra, onde siccome se innumerabili colonnette gravi *S T*, *S T* (Fig. III.) egualmente alte premessero contro la superficie orizzontale *E A C*, l'azione loro s'intenderebbe riunita nel centro comune di gravità di esse, che corrisponderebbe appunto al centro *D* della figura *E A C*, quando le dette colonnette colle basi loro tutta la riempissero: di maniera che essendo la figura *A E C* sostenuta sopra la linea *E C*, sarebbe lo sforzo delle colonnette prementi eguale al momento di un peso, il quale pareggiando il peso di tutte, fosse applicato nel punto

D della leva D B, mobile d'intorno al sostegno B; Così ancora, rivoltandosi la figura E A C (Fig. IV.), e diventando verticale, o stendendosi in qualsivoglia altro piano, come quando è la comune sezione d'un muro, e di un solido impegnatovi dentro, le fibre S T, S T, che tengono attaccato il solido A H I C alla superficie E A C, essendo tante forze premententi per la direzione S T, si debbono intendere come riunite nel centro di gravità D della figura E A C, ed operanti col vantaggio della leva D B, mobile d'intorno al sostegno B; non essendovi altro divario da questa disposizione all'altra di prima, che dell'essere le direzioni S T parallele, o inclinate all'orizzonte, dove prima elle erano perpendicolari; il che non può variare nulla nel modo di operare, sicchè ciò, che prima facevano per un verso, ora non lo facciano per l'altro corrispondente alla loro costituzione, diretta non più al centro della terra, ma ad un altro punto lateralmente posto in una infinita distanza, nella medesima dirittura perpendicolare alla stessa sezione.

Supposizioni.

I. Qualunque peso sempre discende, qualunque volta il suo centro di gravità

movendosi, può accostarsi al centro comune de' gravi, se da maggiore forza, e resistenza non venga impedito.

II. Qualunque peso liberamente si sospenda pel suo centro di gravità, non potersi giammai fermare, finattanto ch'esso centro non abbia acquistato l'infimo punto della circonferenza, per cui si muove.

III. Qualunque solido posato sopra un sostegno, allora fermarsi, quando la linea retta, che congiugne il centro di gravità del solido, ed il contatto di esso col sostegno, sarà perpendicolare all'orizzonte. Cioè allora il cilindro A B (Fig. v.), o cono, o altro solido starà fermo sopra il sostegno C, quando tirata dal centro di gravità loro D la linea D C, sarà perpendicolare all'orizzonte: perchè qualunque grave ha momento per la perpendicolare tirata dal suo centro di gravità, che è la brevissima verso il centro comune de' gravi; e dovendosi muovere, non è maggior ragione, che si muova dall'una parte più, che dall'altra.

IV. Qualunque resistenza potersi superare da un peso, o da un momento, che sia maggiore di essa resistenza.

V. In questa scienza delle resistenze, doversi astrarre dalla flessibilità de' corpi, che fanno molla, potendo questi alterare le proporzioni investigate: siccome si dee prescindere ancora dalle tempere, e varie crudenze de' metalli.

Imperocchè la cedenza delle materie de' solidi altera le proporzioni delle resistenze a segno tale, che un medesimo ferro sarà ora più, ora meno resistente, secondo la differenza delle tempere, e secondo la sua flessibilità, che in virtù di dette tempere si fa or maggiore, or minore; e però, data la resistenza assoluta d'un solido in una tal sezione, volendo ricercare la resistenza rispettiva, che è quella, quando se gli fa forza pel traverso, converrà immaginarsi la materia nulla cedente, perchè più e più che cederà, maggiore e maggior peso vi vorrà a fare la rottura.

Quindi è, che una spada ben temperata si piega bensì facilmente, ma non così agevole cosa è il romperla, come si farebbe d'una pari lastra di ferro, che fusso crudo e rozzo. Così per la stessa ragione più facilmente si spezza una verga di legno secco, che quando era verde, e flessibile; ed è stato osservato da Monsù Parent, che l' Abete, il quale è più cedente della Quercia, sostiene maggior peso prima di rompersi: di maniera che ordinariamente la resistenza di quello alla resistenza di questa si stima essere, come 358 a 300, o come 119 a 100, secondo le sperienze rapportate nelle memorie dell' Accademia Reale di Parigi del 1707. Dove ancora si riferisce dal medesimo Autore, che nel cadere e piegarsi le fibre d'un solido, la

curvatura di esso raccorcia la leva d'intorno a una sua parte quadragesima quinta, allorchè il solido è ritenuto in un termine solo: ma la scorcchia d'un sessagesimo solamente, quando sia ritenuto in ambi gli estremi. Il che però ricercerebbe più esatta e diligente osservazione; essendo verisimile, che la varietà delle materie permetta, che le fibre superiori diversamente si stendano, e l'inferiori si comprimano, cagionandosi uno stiramento, ed una compressione, quando più, quando meno violenta, la quale un grandissimo dispendio di forze richiede, ed a cui una diversa piegatura del solido corrisponde, e per conseguenza si viene a scorcicare con diversissima proporzione la leva; onde non solamente delle resistenze assolute, ma ancora delle rispettive, considerate per altro in pari circostanze, è vero ciò che altrove dice il nostro Autore, e può registrarsi per sesta supposizione, cioè che

VI La diversità della materia altera la resistenza, poichè due solidi eguali, e simili, ma di materia diversa, come di vetro l'uno, e l'altro d'acciajo ec. resistono disugualmente.

VII. La separazione delle due superficie del solido tenuto per traverso si fa nel medesimo instante, tanto nei punti remoti dal sostegno, che nei vicini, e che in quelli di mezzo: stante che tale separazione si fa con moto regolare dell'una

superficie che si muove , dall' altra che sta ferma.

Il che è coerente all'ipotesi del Galileo, che suppose altresì strapparsi in uno istante tutte le fibre del solido, quando si rompe trasversalmente: come di necessità debbe succedere, secondo la quinta supposizione, che le fibre non sieno cedenti, ma che senza allungarsi, o stendersi per di sopra, nè serrarsi, o comprimersi per di sotto, si strappino. È ben vero, che il Mariotte nel suo trattato del moto dell'acque part. 5. disc. 2. il Leibnizio negli Atti di Lipsia del mese di Luglio 1684. ed il Varignonio nelle memorie dell' Accademia Reale 1702 stimarono più verisimile ipotesi il supporre, che si stendano, e stirino alquanto le fibre, e più le lontane dal sostegno, che le vicine, a proporzione della distanza dal centro del moto, cioè dal sostegno, sopra di cui si fa la rottura; e poscia il Sig. Jacopo Bernoulli di questa medesima supposizione non contento, ne propose un' altra da lui, e da altri creduta più vera, in cui s'immagina, che prima di spezzarsi il solido, alcune fibre vicino all'appoggio si comprimano, altre più sopra si stendano: sicchè tra l' une, e l' altre vi abbia un punto di mezzo, che non soffre veruna compressione, o stendimento alcuno, e da cui verso l' una, e l' altra parte sempre più si aumentino l'estensioni delle fibre superiori, e le compressioni del-

l'inferiori, come apparisce da una lettera di questo celebre Matematico, scritta li 12 Marzo 1705, ed inserita nelle memorie dell'Accademia Reale di Parigi dello stesso anno. Ma queste diversità d'opinioni dimostrano appunto, quanto difficil cosa sia il determinare la vera e naturale ipotesi, la quale può essere, che in varj casi molto diversa si trovi: e però quanto meglio sia l'astrare da cotesti accidenti, per illustrare teoricamente la materia, che abbiamo per le mani, come ha fatto il Galileo, e con esso il nostro Autore: lasciando ai Filosofi, ed a' Pratici osservatori della natura, il mettere in conto quelle differenze, che può recar seco la diversa tessitura, e forza e flessibilità delle fibre in qualsivoglia materia; limitando con esse, o modificando le conclusioni dedotte generalmente da' fondamenti teorici di questa dottrina.

*VIII. Nello strappare un solido per diritto, si hanno da considerare due resistenze: una è quella dell'attaccamento de' filamenti del solido, la quale è diversa, secondo le diversità delle materie d'esso solido, e ne' metalli secondo le tempe-
re: l'altra è quella del vacuo, che in tutte le materie è sempre la stessa, a proporzione delle grossezze del solido; ma nello strappare il solido per traverso, pare che la resistenza del vacuo cessi affatto, poichè mostra l'esperienza, che volendo separare con moto parallelo una la-*

mina di vetro liscio da un'altra lamina simile, vi vuole buona forza, che è quella del vacuo; ma volendole separare con moto angolare, non vi si ricerca punto di forza.

Da molti luoghi di quest'opera già espressamente apparisce, che l'Autore nostro vi lavorava intorno per fino dall'anno 1644 ma quando la malignità di qualche invidioso volesse sospettare, essere stata per affettazione aggiunta assai dopo in varj luoghi del MS. la nota di tempo più antico: eccone in questa stessa supposizione un altro evidente riscontro, dove nomina *la forza del vacuo*, seguendo la maniera di favellare degli antichi, adoperata ancora dal Galileo suo maestro nel primo dialogo; il che dimostra, essere ciò stato scritto prima dell'anno 1644. in cui il Torricelli per mezzo della sua famosa sperienza, di cui appunto fu ministro e primo esecutore il nostro Viviani, rinvenisse la vera cagione di ciò, che s'attribuiva alla forza del voto, e palesasse esser questa la sola pressione dell'aria; non essendo verisimile, che dopo sì celebre e sì felice scuoprimento, a lui prima che ad altri notissimo, seguitasse il nostro Autore a chiamare col volgo *forza del voto*, cioè di un mero nulla, quello che potea, con maggiore proprietà di parlare, e con più ragionevole sentimento, chiamare forza della pressio-

ne dell' aere esterno , o d' altro fluido ambiente.

Diremo adunque , che siccome essendo congiunte insieme due pulitissime lastre di marmo , o di vetro , si sperimenta grandissima difficoltà in separarle direttamente , non ostante che a tale effetto non sia d' uopo lo strappare veruna fibra , per cui si connetta questa lastra con quella : ma in vigore solamente della pressione , con cui l' aere esterno (o forse altro fluido più tenue) calca l' una contro dell' altra , resistono alla separazione , mancandovi l' aria di mezzo , che ajuti a spingere , secondo la direzione della forza , che tenta disgiungerle ; così dovendosi direttamente strappare un corpo , separandone un pezzo dall' altro contiguo , si sente la stessa ripugnanza , che si proverebbe , quando fussero già divisi , ma da uno squisito contatto , per opera della pressione del fluido ambiente , stessero insieme attaccati : ed oltre a ciò si prova tutta la difficoltà , che risulta dalla tessitura , intralciamento , o forza interna , che hanno le fibre , per cui resistono alla divisione. Laddove quando trasversalmente si tenta lo spezzamento d' un solido , rimane solo la seconda difficoltà da superare , ma non la prima , perchè da ogni lato essendo premuto il solido , cioè da destra a sinistra , e da sinistra a destra , ogni poco di forza che si applichi , per volerlo spingere più per un verso ,

che per l' altro , viene ajutata dall' una , o dall' altra delle pressioni opposte , che si equilibrano ; onde (se non ostasse l' intralciamento delle fibre , o l' interna forza , con cui esse alla divisione resistono) facilmente ne seguirebbe la separazione d' un pezzo dall' altro ; e per ciò molto più agevole sarà ancora per questo capo il vincere la resistenza rispettiva , che l' assoluta , benchè non vi fusse il vantaggio della leva , come se il solido sporgesse fuori del muro per una distanza uguale al suo semidiametro , e che perciò il peso attaccato alla sua estremità fosse lontano dal sostegno altrettanto , quanto ne è lontana la resistenza , che si concepisce tutta ridotta nel centro della sua base , ad ogni modo maggior peso sarebbe necessario per romperlo , tirando con direzione perpendicolare alla base , che tirando obliquamente.

E potrebbe anch' essere , che questa , e non lo stiramento delle fibre fosse la cagione , per cui le sperienze fatte dal Signor Paolo Wrrzio , come riferisce il Blondello , ed il Leibnizio , e le altre fatte dal Mariotte , mostrarono ricercarsi allo strappamento diretto de' solidi un molto maggior peso , di quello , che secondo la teoria del Galileo avrebbe dovuto bastare , in paragone di quel peso , che li rompeva , tirandoli obliquamente. Per esempio , riferisce il Mariotte : che per istrappare direttamen-

Galileo Galilei Vol. IX. 14

te un cilindretto di legno, il cui diametro era di 3 linee, vi vollero 330 libbre di peso: quando, secondo il calcolo del Galileo, se ne sarebbero ricercate solo 160. Chi sa, che quelle 150 di più, le quali vi s'impiegarono, non corrispondessero appunto alla pressione dell'aria, da cui il Galileo fece astrazione, per non averne alcuna notizia?

È ben vero, che se avesse il Sig. Viviani riveduta e perfezionata questa sua opera, non solamente in vece della forza del vacuo, surrogata averebbe la pressione dell'aria, ma non credo, che impegnato si sarebbe a dire, essere questa forza la stessa in tutte le materie, solamente variando a proporzione delle grossezze de' solidi; perchè secondo la tessitura, ed intralciamento delle parti componenti de' solidi, è manifesto, alcuni essere di più rara, altri di più serrata struttura, e da' pori di queste, o di quelle materie, dove più, dove meno perfettamente venir esclusa l'aria grossa, o sottile: dalle quali circostanze si varia in molte maniere il momento dell'aria esterna premente, facendosi ora maggiore, ed ora minore. Si può prescindere però ancora da questa forza, per dar luogo alla teoria generale, mettendola poi in conto, quando occorra, nella pratica.

IX. In oltre poi si possono considerare le sezioni de' solidi come gravi, e a guisa d' Archimede figurarsi, che i piani

abbiano peso , e che poi tali piani posati sul sostegno della leva ec.

M'immagino volesse dire, che tali piani, considerati come gravi, applicati al sostegno della leva, contrastino col peso, o colla forza, che tende a fare lo strappamento, e così l'immaginario peso di detti piani (considerato però come tendente ad un centro posto in infinita distanza da essi, per una direzione perpendicolare a' medesimi) equivalga alla forza della resistenza assoluta, o rispettiva, che per un verso direttamente, o almeno in parte opposto alla direzione della potenza, che cerca di effettuare lo strappamento, li va continuamente tirando. Donde tanto più chiaro apparisce, che il centro delle resistenze (come si è detto alla defin. 8.) sia il medesimo, che il centro di gravità della sezione, in cui si fa la rottura.

Anzi in seguito di questa supposizione il nostro Autore ha proposte quest'altre da lui chiamate.

Definizioni Seconde.

I. Piani, o sezioni d'uguale gravità in specie chiamo quelle, delle quali parti eguali pesano ugualmente.

II. Piani, o sezioni d'ugual gravità assoluta, quelle che pesano ugualmente,

o uguali, o disuguali che sieno tra di loro.

III. Piani, o sezioni di diversa gravità in specie quelle, delle quali parti uguali pesano disugualmente.

IV. Piani, o sezioni di diversa gravità assoluta quelle, le quali pesano disugualmente, o uguali, o disuguali che siano tra di loro.

Queste diverse maniere di gravità, credo che appresso il nostro Autore equivalgano a varie resistenze uniformi, o difformi già di sopra definite; in quanto che ce ne possono rappresentare varj gradi, riducendoli ad un'idea più distinta, che abbiamo della diversa gravità, che in varie materie corporee già ci è nota e manifesta; il che giova a fissarci meglio la fantasia, e fare sì, che più chiaro concepisca la diversa forza di resistenza, che per esempio ha il marmo dal ferro, o dal legno, coll' analogia del peso diverso, che in pari mole hanno varj corpi, come piombo, argento, acqua, pietra, ec.

E sebbene vi ha chi crede, che io avrei fatto meglio a dissimulare queste seconde diffinizioni, per essere superflue, secondo il detto d'alcuni moderni, da' quali viene risolutamente asserito, non doversi definire l'uguaglianza, e disuguaglianza, essendo a suo giudizio cose chiare per se stesse, e manifeste, *e di lor natura, per così dire, indefinibili*, assicurando che nè

Euclide, nè alcun altro Matematico si è mai messo a definire l'egualità, quando l'ha voluta applicare ad altre cose; tuttavolta io non ho stimato bene di ometterle: sì per dar fuori intieramente tutto ciò, che il nostro Autore avea preparato sopra questa materia; e sì perchè sono di parere, che non si possano riprendere queste definizioni del Sig. Viviani, a similitudine di quelle, che nello stesso proposito per i corpi d'egual gravità assoluta, e d'egual gravità specifica, recò il Galileo nelle Galleggianti, ed il Borelli nel suo Archimede: per non dir nulla, che la pretesa induzione di Euclide, e degli altri Matematici è falsa, avendo noi da Euclide nel lib. 3. degli Elementi la definizione 1. de' cerchi eguali, e la quarta delle rette egualmente lontane dal centro del cerchio; e nel lib. 11. la decima de' solidi eguali, e simili; e nel frammento che di lui ci resta delle cose leggeri, e gravi, defin. 1. de' corpi uguali in grandezza, e la defin. 4. de' corpi eguali in potenza: e da Apollonio nel lib. 6. la defin. 1. delle sezioni coniche uguali, è la sesta de' segmenti loro uguali, e da Teodosio nel lib. 1. degli sferici la sesta de' cerchi ugualmente distanti dal centro della sfera; e da Gregorio di S. Vincenzio nel lib. 5. della quadratura del cerchio, la defin. 7. delle parabole uguali, e nel sesto l'ottava dell'iperbole uguali; e da Alessandro Mar-

di loro , come le distanze del centro di gravità d'esse dal sostegno.

Ciò è evidente , perchè essendo la stessa grandezza di sezione , e supponendosi le materie omogenee , sarà la stessa resistenza assoluta , e solo varierà la rispettiva , cioè il momento di detta resistenza , a misura della leva favorevole , cui viene applicata , la qual leva non è altro , che la distanza del centro di gravità della figura (in cui riconcentrata si concepisce la resistenza per la definizione) dall'appoggio , sopra di cui si fa il moto nella rottura del solidq.

Proposizione II. Teorema II.

I momenti delle resistenze nelle sezioni de' solidi , le di cui basi siano disuguali , ed eguali le altezze , sono come le medesime basi.

Ciò si verifica in tutte quelle figure di sezioni , nelle quali i centri di gravità dividono gli assi nella medesima ragione.

Imperocchè essendo uguali l'alttezze , saranno altresì uguali le distanze de' centri di gravità da' sostegni ; e però i momenti delle resistenze di tali sezioni varieranno solamente a misura , che variano le grandezze loro ; onde saranno come le basi disuguali di esse.

Corollario I. In qualsivoglia sorta di

figure, essendo uguali le distanze del centro di gravità di esse dal sostegno, saranno i momenti delle loro resistenze proporzionali alle grandezze di esse figure.

Corollario II. Quindi è agevol cosa il raccogliere, che generalmente i momenti delle resistenze di due sezioni A, C, hanno la ragione composta di quella, che è tra le grandezze di esse, e di quella che passa fra le distanze de' loro centri di gravità da' sostegni; imperocchè presa di mezzo un' altra sezione B uguale di grandezza alla A, ma che abbia il centro di gravità ugualmente distante dal sostegno, come ha l' altra C; sarà il momento della resistenza A al momento della resistenza C in ragione composta di quella che ha il momento della resistenza A al momento della resistenza B, e di quella che è tra il momento della resistenza B, ed il momento della resistenza C; ma la prima ragione (per la prop. 1.) è eguale alla ragione delle distanze de' centri di gravità da' sostegni, che sono in A, ed in B (ovvero in C;) e la seconda ragione è quella, che passa tra le stesse grandezze delle sezioni B (ovvero A) e C (pel Coroll. preced.) dunque il momento della resistenza A a quello della resistenza C è in ragione composta delle ragioni di esse grandezze A, C, e delle distanze de' centri loro di gravità da' sostegni.

A C
B

Proposizione III. Teorema III.

I momenti delle resistenze nelle sezioni de' solidi, le quali abbiano ugual base, e disuguale altezza, sono tra di loro, come i quadrati dell' altezze (Purchè le dette sezioni sieno tali, che i centri di gravità di esse dividano gli assi della stessa ragione.)

Siano le figure A C B, G E H (Fig. VI.) le comuni sezioni di alcuni solidi, orizzontalmente distesi, e dal muro, in cui perpendicolarmente sono fitti, e si suppongano o mezze ellissi, o rettangoli, o triangoli, o parabole: purchè abbiano le basi uguali A B, G H, ma l' altezze disuguali C D, E F. Dico, che il momento della resistenza E G H (i quali momenti pel corollor. 2. della precedente, provengono dalle grandezze delle dette sezioni, e dalle distanze de' centri di gravità loro da' sostegni, ne' quali si sostengono i detti solidi, cioè dalle O D, P F) sta come il quadrato dell' altezza C D al quadrato dell' altezza E F di dette sezioni.

Imperocchè questa sorta di figure, avendo ugual base, sono come l' altezze C D, E F; ed i centri loro di gravità sono dalla base distanti per una parte proporzionale di dette altezze: di maniera che O D a P

F sia come C D ad E F; e però la ragione dei detti momenti, composta di quella delle grandezze, e dell'altra delle dette distanze, è duplicata di ciascuna di esse; onde è come la ragione de' quadrati dell'altezza C D, E F. Il che ec.

Corollario. Quindi ancora può dedursi essere la ragione dei detti momenti duplicata di quella delle distanze da' sostegni, cioè come i loro quadrati.

Proposizione IV. Teorema IV.

I momenti delle resistenze nelle sezioni simili di qualche solido sono tra di loro, come i cubi dell'altezze.

Perchè la grandezza delle figure simili è in ragione duplicata di quella de' lati omologhi, o dell'altezze loro: si aggiunga la ragione delle distanze de' centri di gravità da' sostegni, la quale è pure la medesima con quella dell'altezze; ne risulterà la ragione composta di quella delle grandezze, e delle dette distanze, cioè (pel Corollario 2. della prop. 2.) quella de' momenti delle resistenze, uguale alla triplicata dell'altezze: cioè a quella de' cubi delle medesime; il che ec.

Corollario. Quindi i momenti delle sezioni di qualsivoglia solido rotondo sono come i cubi de' diametri d'esse sezioni.

Proposizione V. Teorema V.

Dei cilindri, e prismi ugualmente grossi, e [disugualmente lunghi, le resistenze ad essere spezzati per traverso hanno reciproca proporzione delle lunghezze; o per meglio dire, le forze che si ricercano per ispezzare tali solidi, hanno reciproca proporzione delle lunghezze.

Poichè, posto che il peso E (Fig. vii.) sia il minimo, che appeso in C serva per ispezzare in B A, colla leva B C; con leva minore di essa, maggior peso si richiederà per fare l'istesso effetto; e tanto maggiore, quanto la prima leva supera la seconda: non essendo altro il ridursi tal solido prossimo allo spezzarsi, che un farsi l'equilibrio tra la resistenza posta nel centro della base B A, ed il peso posto in diversi luoghi della lunghezza del solido, considerato come nulla pesante.

L'intenzione del Sig. Viviani era, che questa proposizione si ponesse dopo la prima delle resistenze del Galileo, perchè questi non la prova, ma bensì la suppone per se nota nella proposizione quinta.

Proposizione VI. Teorema VI.

Se A (Fig. VIII.) equilibra B, e D equilibra C; sempre il peso A al peso D ha la proporzione composta di quella della distanza G E alla E H, e di quella del peso B al peso C, o resistenza B alla C, e della distanza L F alla F I.

Poichè il peso A al peso D ha la proporzione composta del peso A al peso B, del B al C e del C al D; ma il peso A al B sta come G E ad E H; e il peso B al C sta come l'istesso B al C, o come la resistenza B alla C; ed il peso C al D, come la distanza L F alla F I; dunque il peso A al peso D è in ragione composta delle suddette proporzioni. Il che ec.

Proposizione VII. Teorema VII.

Se saranno le due libre A B, C D, (Fig. IX.) con i sostegni E, F, e colle contrallevé A E, C F; uguali tra loro, e con i pesi, e resistenze G, H, che tra loro stiano, come le leve E B, F D omologamente; dico che se in B, e D si appenderanno i pesi I, L che equilibrino le

resistenze G, H , i detti pesi I, L , saranno uguali.

Poichè, per l' antecedente, il peso I al peso L ha la proporzione composta della $A E$ alla $E B$, del peso G al peso H , cioè per supposizione, della $E B$ alla $F D$, e della $F D$ alla $F C$; ma anche l' $A E$ alla $F C$ ha la proporzione composta delle medesime linee, cioè della $A E$ alla $E B$, della $E B$ alla $F D$, e della $F D$ alla $F C$; dunque il peso I al peso L sta come la $A E$ alla $F C$, cioè gli è uguale; il che ec.

Proposizione VIII. Teorema VIII.

Siano le due libre, come sopra, con i bracci uguali $A E, C F$, (Fig. x.) e le resistenze G, H , che tra loro abbiano suddupla proporzione delle leve $E B, F D$. Dico, che il contrappeso I al contrappeso L , (da quali si equilibrano le G, H) ha suddupla proporzione delle leve reciprocamente prese, cioè della leva $F D$ alla $E B$; o pure sta come la leva $F D$ alla media $F M$ tra $F D$, ed $E B$.

Poichè per la propos. 6. il peso I al peso L ha proporzione composta delle proporzioni di $A E$ ad $E B$, e della resistenza G alla resistenza H , cioè della

leva E B ad F M (che ha suddupla proporzione della E B alla F D) e della leva F D alla F C, cioè della F M alla F N) quarta proporzionale dopo F D, F M, F C) ma ancora l'A E alla N F ha la proporzione composta delle medesime linee; e però come il peso I al peso L, così sta A E, ovvero C F ad F N, cioè F D ad F M; ma la F D alla F M ha suddupla proporzione della F D alla E B, per essere F M media proporzionale fra esse: dunque il peso I al peso L ha suddupla proporzione della leva F D alla E B reciprocamente prese, il che ec.

Proposizione IX. Teorema IX.

Se sarà come il peso A (Fig. XI.) al peso B, così la leva D G alla F H, sarà il contrappeso I al contrappeso L, come la C D alla E F.

Poichè il peso I al peso A sta come C D alla D G, ed il peso A al peso B sta come la D G alla F H; dunque per l'uguaglià, il peso I al peso B sta come la C D alla F H; ma il peso B al peso L sta come H F ad F E: dunque per l'uguaglià, il peso I al peso L sta come la C D alla E F; Il che si dovea dimostrare.

Corollario. Agevolmente quindi si ri-

cava, che nelle premesse circostanze, essendo ancora $C D$ uguale ad $E F$, saranno i contrappesi I , ed L tra di loro uguali, che è la prop. 7. già di sopra dimostrata.

Proposizione X. Teorema X.

Se nelle libbre similmente divise $C G$; $E H$, (Fig. XII.) ne' loro sostegni D , F , sarà come la resistenza A alla resistenza B , così il quadrato $D G$ al quadrato $F H$: sarà il contrappeso I , che equilibra lo A , al contrappeso L , che equilibra B , come il quadrato $C D$ al quadrato $E F$.

Perchè presa la $D M$ media tra $C D$, $D G$, e la $F N$ media tra $E F$, $F H$, sarà come il peso I alla resistenza A , così la $C D$ alla $D G$, cioè come il quadrato $C D$ al quadrato $D M$: e come la resistenza A alla B , così il quadrato $D G$ al quadrato $F H$, cioè come il quadrato $D M$ allo $F N$ (il che appresso dimostrerassi) dunque per l'ugual proporzione come il peso I alla resistenza B , così il quadrato $C D$ al quadrato $F N$; ma la resistenza B al peso L sta come la $F H$ alla $F E$, cioè come il quadrato $F N$ al quadrato $E F$: dunque di nuovo per l'ugual proporzione, il peso I al peso L starà,

*come il quadrato C D al quadrato E F.
Il che si dovea dimostrare.*

Non si trova nel MS. del Sig. Viviani la promessa dimostrazione di quell' assunto, cioè che il quadrato D G al quadrato F H sia come il quadrato D M al quadrato F N; ma si raccoglie ciò agevolmente, supposta la simile divisione delle due leve C G, E H in D ed F (da noi però aggiunta nel titolo di questa proposizione, la quale altrimenti non si potrebbe verificare) stante la quale, per essere le proporzioni di G D a D C, e di H F ad F E, tra di loro uguali, aneora le loro sudduple (e lo stesso sarebbe delle suttriple, suquadruple ec. e d' altre quantosivoglia ugualmente multipliei, o summultipliei di esse) saranno tra di loro parimente uguali; e però G D a D M sarà, come H F ad F N; e permutando, tanto esse, quanto i loro quadrati, saranno proporzionali.

Anzi si potrebbe quindi rendere la proposizione più generale, ed ancora dimostrarla più speditamente, dicendo, che se nelle due libre C G, E H, similmente divise da' sostegni D, F, le resistenze A, B saranno in qualsivoglia proposizione multiplie, o summultiplie delle braccia D G, F H, o come i quadrati, cubi, ec. o radici quadrate eubiche ec. di esse: i contrappesi I, L averanno la stessa ragione ugualmente multipliee, o summultiplie di quella delle braccia C D, E F, o saranno pa-

rimente come i quadrati; o cubi, o radici quadre, o cubiche ec. loro corrispondenti. Perchè essendo A ad I, come G D a D C, cioè come H F ad F E, per l'ipotesi, ovvero come B ad L, per l'equilibrio, sarà permutando, come A a B, così I ad L, onde se la prima ragione è multiplice, o summultiplice di quella di D G ad F H, la quale permutando è la medesima con quella di C D ad E F, ancora la seconda ragione, cioè di I ad L, sarà parimente multiplice, o summultiplice di quella di C D ad E F. Il che ec.

Ma se le due libre C G, E H non fossero proporzionalmente divise in D, F, supponendosi col nostro Autore, essere le resistenze A, B, come i quadrati delle braccia D G, F H, saranno i contrappesi I, L, come i rettangoli C D G, E F H; imperocchè starà I ad A, come C D a D G, o pure come il rettangolo C D G al quadrato D G; ed A a B sta come il quadrato D G al quadrato F H, e B ad L, come F H ad E F, cioè come il quadrato F H al rettangolo E F H, dunque per l'ugual proporzione starà I ad L, come il rettangolo C D G al rettangolo E F H; Il che ec.

Proposizione XI. Teorema XI.

Se le resistenze di due libre staranno come le dignità dello stesso grado delle contralleve, e le leve saranno uguali, i contrappesi staranno, come le dignità delle medesime contralleve d' un grado più alte.

In questa bellissima, ed universale proposizione intende l' autore per dignità le potestà algebriche, come quadrati, cubi, biquadrati, sursolidi, ec. denominate da' loro esponenti 2. 3. 4. 5. ec. e dice, che essendo I ad L, come qualunque dignità della leva E B, denominata dal numero m , ad una simile della leva F D, (Fig. 1x.) essendo le due E A, F C uguali, saranno i contrappesi G, H nella ragione delle dignità d' un grado più alte, appartenenti alle medesime leve E B, F D, cioè denominate dal numero m i.

Imperocchè G ad I sta, come B E ad E A; I ad L sta, come la dignità di E B denominata dal numero m alla simile della F D; L ad H è come C F, ovvero A E ad F D; adunque G ad H ha ragione composta di B E ad E A, e di E A ad F D (le quali due faranno la sola ragione di E B ad F D) e di quella, che ha la dignità di E B, denominata da m , alla simile

dignità di F D; e però sta, come la dignità della E B un grado più alta, cioè denominata da *m i* alla simile dignità di F D: perchè queste tali dignità avrebbero altresì la proporzione composta delle medesime proporzioni. Il che si dovea dimostrare.

Corollario I. Quindi se I ad L sta, come il quadrato E B al quadrato F D, sarà G ad H, come il cubo di E B al cubo di F D.

Corollario II. Viceversa, se G ad H ha la proporzione, che è tra qualsivogliano dignità dello stesso grado, di E B ad F D, saranno I, ed L nella proporzione delle dignità un grado più basse, delle medesime E B, F D.

Corollario III. Quando G ad H fosse in ragione suddupla delle E B, F D (che è quanto dire corrispondenti alle dignità di E B; F D, denominate dalla metà dell'unità) allora per essere I ad L, come le stesse dignità di E B, F D un grado più basse, cioè denominate da una metà meno del nulla, saranno reciprocamente in ragione suddupla di F D ad E B, come nella proposizione ottava.

Corollario IV. Ma essendo G ad H, come appunto E B ad F D (che sono le dignità semplici denominate dall'unità) per essere le I, ed L corrispondenti alle dignità delle medesime un grado più basse, cioè denominate dallo zero, dovranno essere tra

di loro nella ragione di ugualità, come proposizione settima.

Proposizione XII. Teorema XII.

Nei cilindri senza peso proprio, che si vanno allungando fuori del muro a squadra, i pesi equivalenti alle resistenze vanno scemando colla proporzione reciproca delle lunghezze.

Il peso F equilibri la resistenza A B, (Fig. XIII.) ed il peso G la resistenza C D; dico che il peso F al peso G sta, come la D E alla B E; poichè congiunta la E C, convenga colla B A in H. Per la prop. 6. il peso F al G averà proporzione composta della contralleve A B alla leva B E, e della resistenza A B alla resistenza C D, cioè della B E alla medesima B E, e della leva D E alla contralleve D C, cioè della E B alla B H; ma ancora la A B alla B H ha proporzione composta delle medesime linee, cioè di A B alla B E, e della B E alla medesima B E, e della B E alla B H; adunque come il peso F al peso G, così la B A (ovvero la D C) alla B H, cioè la E C alla E H, o pure la lunghezza del cilindro E D alla lunghezza del cilindro E B, che è la proporzione reciproca proposta da dimostrarsi.

Ciò era stato di sopra già dimostrato dal Sig. Viviani alla prop. 5. con maggiore speditezza, ma con minor rigore geometrico; onde non ho stimato superfluo l'apportare l'una, e l'altra proposizione.

Proposizione XIII. Teorema XIII.

Se saranno le due libre A B, C D, (Fig. XIV.) sostenute in E, F, e le resistenze nell'estremità delle contralleva A E, C F siano G, H, che fra loro stiano, come i quadrati delle medesime contralleva, e siano le leve E B, F D uguali fra loro, ed i pesi I, L, che pareggino le dette resistenze: dico, che il peso I al peso L sta come il cubo di A E al cubo di C F.

Si faccia, come A E a C F, così C F ad M, e così M ad N; e si faccia come la A E alla M, così la F D alla P: che essendo la A E alla M, come la C F alla N sarà anche la F D alla P, come la C F alla N; e permutando la F D alla C F, come P alla N; e perchè il peso I al peso L ha proporzione composta di I a G, di G ad H, e di H ad L; e come I a G, così A E ad E B, cioè A E ad F D; e come G ad H, così il quadrato A E al quadrato C F per supposizione, cioè la linea A E alla M, cioè come la F D alla P per costruzione: sarà per l'u-

gualità ordinata il peso I all' H, come la A E alla P; ed il peso H al peso L sta, come la D F alla F C; cioè come la P alla N, come già si è dimostrato: dunque di nuovo per l'ugualità il peso I al peso L sta, come l'A E alla N, cioè come il cubo di A E al cubo di C F; il che ec.

Ciò si deduce dalla generale proposizione undecima: come nel coroll. 1. di essa ho fatto vedere.

Proposizione XIV. Teorema XIV.

Stanti le medesime cose, se si farà, come il peso I al peso L, (Fig. XIV.) così D F ad F G, ed in G si ponga il peso K uguale al peso I; dico, che il peso K si equilibrerà col peso H: e che la leva B E alla leva F G sarà come il cubo della contralleve A E al cubo della contralleve C F.

Imperocchè essendo il peso I, ovvero K al peso L, come D F ad F G reciprocamente, sarà uguale il momento d'ambidue i pesi L, K; ma il momento di L uguagliava quello di H; adunque ancora il momento di K uguaglierà quello di H: onde ambidue staranno in equilibrio: ma come si è dimostrato nella precedente, il peso I al peso L è come il cubo di A E al cubo di C F; ed ora si è fatto, come

I ad L, così D F ad F G, o pure B E ad F G: dunque B E ad F G è come il cubo di A E al cubo di C F. Il che si doveva dimostrare.

Proposizione XV. Teorema XV.

*Dimostrare altrimenti,
e con maniera più generale la proposizione
quarta del Galileo.*

Siano i cilindri, o prismi, o altri solidi A C: E G (Fig. xv.) ugualmente lunghi, e disugualmente grossi, e senza peso: ed i pesi D, H equilibrino le resistenze A B, E F. Dico, che il peso D al peso H sta, come il cubo del diametro A B al cubo del diametro E F.

Poichè le C B A, G E F sono due libbre, come nella prop. 13. colle leve uguali B C, F C, e contralleve A B, E F, i quadrati delle quali stanno, come le resistenze A B, E F; ed i pesi D, H, le equilibrano; dunque staranno questi tra loro, come i cubi delle contralleve A B, E F. Il che si dovea dimostrare.

Corollario I. Se le gravità specifiche de' cilindri A C, E G ugualmente lunghi saranno come i loro diametri; riusciranno i detti cilindri ugualmente resistenti, attesa

la propria gravità di essi. Imperocchè essendo di pari lunghezza, le loro moli saranno, come le basi, cioè come i quadrati de' diametri; ma le gravità specifiche sono come i medesimi diametri, per la supposizione; dunque i pesi assoluti di essi cilindri, i quali hanno la ragione composta di quella delle moli, e di quella delle gravità specifiche, saranno come i cubi de' diametri, o come le resistenze rispettive, colle quali contrastano i detti pesi in pari distanza, per essere applicati ne' centri di gravità d'essi cilindri, cioè nel mezzo delle leve uguali BC , FG ; e però tanto averà di momento, e vigore il peso del primo cilindro contro la resistenza della propria base, quanto il peso del secondo contro la resistenza della sua.

Corollario II. Anzi ciò vale ancora in due coni, o conoidi, o piramidi, o altri solidi dello stesso nome; e tra di loro proporzionali colle proprie basi in pari lunghezza: quando le basi di essi non solamente siano simili; ma ancora similmente siano fitte nel muro.

Proposizione XVI. Teor. XVI.

I momenti de' pesi de' cilindri AB , (Fig. xvi.) egualmente lunghi, contro le loro resistenze CD , EF , sono come le basi, & come i cilindri omologamente.

Ciò è manifesto, perchè il peso di ciascuno è distante ugualmente dal sostegno; onde il momento dee corrispondere alla sola ragione de' pesi, o delle moli, o delle basi de' medesimi cilindri ugualmente lunghi, ed altronde supposti omogenei.

Proposizione XVII. Teor. XVII.

I momenti rispettivi, che hanno i cilindri, o prismi gravi dell'istessa materia, egualmente lunghi, e disegualmente grossi, in ordine a superare per traverso le resistenze delle loro grossezze, hanno fra loro reciproca proporzione dei diametri delle medesime grossezze, o basi.

Siano i due cilindri A C, D F, (Fig. xvii.) quali si è detto, ed il più grosso sia A C. Dico, che il momento del proprio peso del cilindro A C per superare la resistenza della base A B, al momento del proprio peso del cilindro D F per vincere la resistenza della base D E, ha la medesima proporzione del diametro D E, all' A B. Per scienza di che immaginiamoci i medesimi cilindri segnati G, H pendere dai mezzi I, L delle leve B C, E F; sono collocati ne' mezzi delle dette leve (rispondendo in tali luoghi i centri delle gravità loro) tanta forza faranno i cilindri A C, D F così disposti verso le loro resistenze, quanta ne fanno

i soli G, H loro eguali, pendenti in I, L: cioè i momenti de' soli A C, D F sono i medesimi de' soli G, H verso le dette resistenze. Intendasi di più . . .

Sin qui il Viviani, a compire la di cui dimostrazione, secondo quel poco di barlume, che si cava dalla figura quivi abbozzata, convien proseguire così. Intendasi di più un cilindro NOP uguale al DEF, dal cui centro di gravità M posto nel mezzo di sua lunghezza penda un cilindro K eguale al primo ABC; e siano le rette DE, AB, QR continuamente proporzionali. Sarà il momento rispettivo di G al momento pur rispettivo del peso uguale K, ed ugualmente lontano dal sostegno, come il cubo di NO, ovvero di DE, al cubo di AB, cioè come DE alla quarta R (imperocchè è tanto meno potente il momento di G a vincere la resistenza rispettiva della base AB, che non è il momento di K, per altro assolutamente uguale al primo, per superare la resistenza rispettiva della base NO, quanto viceversa questa resistenza, che si oppone al secondo, è minore di quella, che contrasta al primo, e lo rende però tanto meno efficace: sicchè tali resistenze essendo, per la prop. 4 del Galileo, o per la 15 di questo, proporzionali a cubi de' diametri, ancora i detti momenti saranno nella stessa ragione. Il momento poi del peso K al momento del peso H (contrastando ambidue in pari

lontananza coll' uguali resistenze NO , DE) sta come il peso al peso, cioè come i quadrati de' diametri AB , DE , o pure come R ad AB ; dunque per l'ugualità ordinata, il momento rispettivo di G al simile momento di H , cioè quello del proprio peso di ABC contro la resistenza della sua base, al momento del proprio peso di DEF contro la resistenza della sua, è reciprocamente, come il diametro DE al diametro AB . Il che ec.

Proposizione XVIII. Teor. XVIII.

I momenti de' pesi de' cilindri eguali A , B (Fig. XVIII.) stanno fra loro, come l'alttezze, ovvero in reciproca proporzione delle basi.

Essendo uguali i pesi degli uguali cilindri, si varia il momento loro solamente in ragione delle distanze da' sostegni, che sono la metà delle lunghezze, che misurano l'altrezza de' cilindri; e però sono proporzionali alle dette alttezze, o reciprocamente corrispondono alle basi de' medesimi cilindri.

Proposizione XIX. Teor. XIX.

Nei cilindri, o prismi uguali, la resistenza dei più corti cresce in quintupla

proporzione dei diametri delle loro grossezze, e basi.

Siano i due cilindri uguali A B C, D E F. (Fig. XIX.) Dico la resistenza del più corto D F alla resistenza del più lungo A C all'esser rotti, aver quintupla proporzione del diametro D E all'A B. Poichè delle A B, D E piglinsi le quattro G, H, I, K in continua proporzione. Per la quinta del Galileo, la resistenza del cilindro D F alla resistenza del cilindro A C, ha la proporzione composta della proporzione del cubo D E al cubo A B, e della lunghezza B C alla E F, cioè del quadrato D E al quadrato A B, per l'uguaglianza de' cilindri; ma come il cubo D E al cubo A B, così la linea H alla B A, ovvero la K alla G; e come il quadrato D E al quadrato A B; così la linea G alla B A; adunque la proporzione della resistenza del cilindro D F a quella dello A C si compone delle proporzioni di K a G, e di G a B A, delle quali si compone ancora la proporzione di K a B A; e però come la resistenza del cilindro D F a quella dello A C, così la linea K alla B A; ma la K alla B A ha quintupla proporzione della K alla I, cioè della E D alla A B; adunque la resistenza del cilindro D F a quella del cilindro A C averà quintupla proporzione del diametro D E al diametro A B; il che ec. Cioè, se un peso quanto A B pendente in C basta per rompere, e staccare la base B A; per ispez-

zare in D E bisognerà mettere in F un peso quanto K; e questo precisamente segue, considerando i solidi senza gravità, ec.

Che se metteremo in conto le gravità loro, se saranno dell' istessa materia, come uguali, peseranno ugualmente; e se la gravità dell' A C prossimamente serve per fare la rottura in A B: acciò segua l'effetto medesimo nel cilindro D F, il suo peso non sarà bastante; ma tanto più ce ne bisognerà, di quanto la linea A B, considerata come misura del peso A C, o D F, è superata dalla linea K; e tal aggiunta di peso andrà posta nel mezzo della leva E F; essendo che l'uno e l'altro cilindro gravita col suo centro di gravità sopra il mezzo delle due leve B C, E F.

Se la gravità specifica del cilindro D F a quella del cilindro A C, sarà in quintupla proporzione de' diametri D E, A B; i cilindri uguali di mole A C, D F saranno ancora ugualmente resistenti; imperocchè i pesi loro assoluti (essendo in pari mole) saranno come le loro gravità specifiche, cioè in quintupla ragione de' diametri, onde saranno proporzionali alle resistenze delle loro basi, per questa proporzione.

Proposizione XX. Teor. XX.

I momenti de' cilindri, e de' conì d'ugual base sono tra loro, come i quadrati delle lunghezze.

Ciò è manifesto dalla proposizione 3 del Galileo, in cui questo stesso si dimostra ne' momenti de' prismi; e la stessa ragione vale in tutte le figure, che hanno il centro di gravità in una parte proporzionale dell'asse, e che altronde crescono in pari base, come le altezze loro: quali sarebbero non solamente i cilindri, i conì, e le piramidi, ma ancora le conoidi paraboliche, e le mezze sferoidi, i prismi eretti sopra parabole di varie maniere ec.

Proposizione XXI. Teor. XXI.

I momenti de' pesi de' cilindri simili contro le attaccature delle loro basi, stanno fra loro, come il quadrato della lunghezza d'uno al quadrato della terza proporzionale dopo le lunghezze dei dati cilindri.

Siano i cilindri simili A B C, D E E (Fig. xx.) e si faccia, come la lunghezza D E alla lunghezza A C, così questa ad una terza I. Sarà il momento del peso F E al momento del peso B C, come il quadrato D E al quadrato I; imperoc-

chè continuando la stessa proporzione ai termini M, O, sarà il momento di F E al momento di B C in ragione composta di quella de' pesi, o moli di tali cilindri, che è quella del cubo D E al cubo A C, cioè la stessa, che della D E alla quarta proporzionale M, e della ragione delle lunghezze D E, A C, o pure di M ad O; adunque il primo momento al secondo sta come D E ad O; ma per essere le cinque grandezze D E, A C, I, M, O continuamente proporzionali, la mezzana I è media proporzionale fra le due estreme D E, O; onde quella a questa è come il quadrato D E al quadrato I; dunque il momento del cilindro F E al momento del simile cilindro B C è come il quadrato della lunghezza del primo, al quadrato della terza proporzionale dopo le due lunghezze de' cilindri proposti. Il che ec.

Perechè la ragione del quadrato A C al quadrato I è doppia di quella della linea A C alla I; e la D E alla I di nuovo ha doppia ragione delle A C, D E, sarà la ragione del quadrato D E al quadrato I quadrupla di quella delle lunghezze A C, D E; e però i momenti de' cilindri simili sono in ragione quadrupla di quella delle lunghezze, o de' diametri loro. Nè ciò si oppone alla prop. 6 del Galileo, in cui dice, essere i momenti de' suddetti cilindri *in triplicata proporzione dei diametri delle basi loro, e però in sesquialtera ra-*

gione delle resistenze delle medesime basi ; le quali (assolute, o rispettive che siano, come si vedrà nella prop. seguente) sono in duplicata ragione dei medesimi loro diametri ; imperocchè ivi si parla de' momenti rispettivi di essi cilindri, nella considerazione de' quali secondo la defin. 4 si debbe aver riguardo alla lunghezza delle contrallevé, alle quali si applicano le resistenze opposte a' pesi de' cilindri, co' quali contrastano; ed essendo le dette contrallevé proporzionali alle lunghezze delle leve, cioè delle lunghezze, nelle quali sono collocati i pesi de' cilindri, vengono a defalcare dalla ragione de' momenti assoluti (di cui qui dal Sig. Viviani si tratta) una delle semplici ragioni delle lunghezze; onde di quaprupla resta solamente tripla appresso il Galileo la ragione de' momenti rispettivi da lui considerati della ragione de' diametri medesimi, ed appresso il Viviani, senza il detto defalco, rimane la ragione de' momenti assoluti quadrupla di quella delle lunghezze, ovvero de' diametri de' cilindri.

Proposizione XXII. Teor. XXII.

Le resistenze, anco. rispettive de' cilindri, o prismi simili, astraendo dalla gravità loro, stanno come le loro basi, o come le loro grossezze.

I due cilindri simili siano A B C, D E D. Dico che la resistenza del cilindro A C alla resistenza dell'altro D F, ha l'istessa proporzione della base A B alla base D E. Per dimostrare ciò, pigliansi nella proporzione del diametro A B al diametro D E, le due G, H continue proporzionali. Per la quinta del Galileo, la resistenza di A C alla resistenza di D F averà proporzione composta del cubo di A B al cubo di D E, e della lunghezza E F alla B C; ma il cubo A B al cubo D E sta come la linea A B alla quarta H; e la lunghezza E F alla B C sta per la similitudine de' cilindri come la E D alla B A, cioè come la H alla G; adunque la proporzione delle dette resistenze si compone della proporzione dell' A B alla H, e di H alla G; delle quali proporzioni si compone ancora la proporzione della A B alla G; e però la resistenza di A C a quella di D F sta, come la A B alla G, cioè come la base A B alla base D E, che è quello che si doveva dimostrare.

Sicchè i cilindri, o prismi, e solidi simili tanto più sono resistenti, quanto più sono grossi; sempre però astraendo la loro gravità ec.

Per esempio, se per superare la resistenza A B si ricerca in C un peso almeno quanto è la linea B A: per superare la resistenza D E, bisognerà in F un
Galileo Galilei Vol. IX. 16

peso, quanto è la *G*, terza proporzionale delle *A B*, *D E*.

Onde si potrà dire, che de' solidi simili i più corti sieno a proporzione più resistenti dei lunghi; poichè essendo il solido *C A* al solido *D F*, come la prima *A B* alla quarta *H*: se la forza d'un peso, quanto è la *A B*, serve per superare, posto in *C*, la resistenza *B A*, dovrebbe un peso, quanto la *H*, posto in *F*, essere bastante per vincere la resistenza *D E*; ma non basta, volendovi un peso, quanto la *G*, la quale è maggiore di *H*; dunque ec.

Proposizione XXIII. Quesito I.

Cercare la proporzione de' momenti di due cilindri, quali si sieno, risultanti dalle loro gravità, e dalle loro lunghezze, rispetto alle loro resistenze.

Sone in ragione composta di quella de' quadrati fatti da' diametri delle basi loro, e di quella delle lunghezze presa una volta (dalle quali due risulta la ragione de' pesi) e di quella delle stesse lunghezze prese un'altra volta (per conto delle distanze de' centri di gravità d'essi da' loro sostegni, le quali distanze sono ad esse lunghezze proporzionali) che vuol dire in duplicata ragione sì de' diametri, come delle lunghezze: o pure in duplicata ra-

gione de' rettangoli, che passano per l'asse, ovvero delle superficie curve, che sono a' detti rettangoli proporzionali, come è manifesto, ed è stato dimostrato dal Torricelli.

Proposizione XXIV. Quesito II.

Cercare la proporzione delle resistenze di due cilindri voti, ugualmente lunghi.

Siano le canne vote A B F, G H M, (Fig. XXI.) i di cui centri C, I; gli esteriori cerchi, da' quali si comprendono, A B, G H; gl'interiori O D, N K; e tirinsi le D E, K L perpendicolari a' diametri ne' punti D, K. Saranno le resistenze della prima, e della seconda in ragione di quella, che ha il quadrato D E al quadrato K L, e di quella del semidiametro C B al semidiametro I H.

Imperocchè le resistenze sono in ragione composta delle sezioni medesime, cioè dell'armille, per cui sono congiunte, e delle distanze dall'appoggio, sopra di cui si tenta di fare la rottura, per le coroll. 2 della propos. 2 ma le dette armille sono come le differenze del cerchio esteriore dall'interiore, o come l'eccesso del quadrato C B sopra il quadrato C D, all'eccesso del quadrato I H sopra il quadrato I K: che è quanto dire, come il quadrato D E al quadrato K L; e le dette

distanze sono i semidiametri $C B$, $I H$; dunque le resistenze di queste canne sono nella di già detta ragione. Il che ec.

Proposizione XXV. Quesito III.

Cercare la resistenza di due cilindri voti, qualunque si siano.

Alle proporzioni assegnate nella precedente si aggiunga la reciproca delle lunghezze; e si averà, per la 5 del Galileo, la proporzione desiderata delle resistenze di dette canne, composta delle due addotte di sopra, e della contraria delle lunghezze $H M$, $B F$. Il che ec.

Proposizione XXVI. Quesito IV.

Cercare la proporzione delle resistenze di due cilindri voti simili.

Essendo simili le canne $A B F$, $G H M$ della figura antecedente, averanno le resistenze proporzionali a' soli quadrati $E D$, $L K$: o pure a' rettangoli $B D A$, $H K G$; imperocchè, per la similitudine dei cilindri, l'altre due ragioni de' semidiametri $C B$, $I H$, e delle lunghezze prese reciprocamente, $H M$, $B F$ (le quali sono, come gli stessi semidiametri $I H$, $C B$) compongono la ragione di uguaglià, da cui

nulla si aggiugne, che alterar possa le resistenze.

Corollario. Quindi se i rettangoli, o quadrati suddetti fossero uguali, cioè quando le basi sode armillari delle canne saranno di uguale estensione, essendo altronde i cilindri, da cui sono cavate, simili, averanno uguale resistenza.

Proposizione XXVII. Quesito V.

Cercare la proporzione delle resistenze in due cilindri, uno voto, e l'altro pieno, qualunque si siano.

Suppongasi il cilindro A B F nella suddetta figura rimaner voto, ma l'altro G H M essere tutto pieno; è manifesto, che le resistenze loro saranno in ragione composta di quella del quadrato D E al quadrato I H (che è quella delle sezioni, cioè dell'armilla D B A al cerchio G H) e delle distanze C B, I H dagli appoggi, e delle lunghezze H M, B F prese reciprocamente.

Proposizione XXVIII. Quesito VI.

Cercare lo stesso ne' cilindri simili, l'uno voto, e l'altro pieno.

Saranno le resistenze loro, come il quadrato D E al quadrato I H, imperoc-

chè l'altre due ragioni, per la simiglianza de' cilindri, sono reciprocamente le medesime; e però si compensano.

Coroll. I. Quando D E sarà uguale ad I H; cioè che il rettangolo, o armilla D B A pareggerà rispettivamente il quadrato, o cerchio del raggio I H, cioè essendo il sodo della canna uguale alla base del cilindro, saranno ambidue d'uguale resistenza, purchè sieno simili nella figura esteriore.

Coroll. II. E perchè ad un dato cilindro si possono ritrovare infiniti cilindri simili, di base maggiore e maggiore in infinito, al diametro delle quali si può applicare perpendicolarmente una retta uguale al semidiametro del minore; si potranno quindi determinare infinite canne simili, che averanno il sodo della base uguale alla base del dato cilindro, e ciascuna sarà di uguale resistenza con esso.

Coroll. III. Anzi ancora determinare si possono infinite canne di uguale resistenza, le quali siano di base sode disugualissime; purchè si faccia, come il cubo del raggio I H del cilindro pieno, al prisma eretto sopra il quadrato D E (corrispondente alla quantità della sezione armillare del voto, determinata a capriccio, anche in un semidiametro C B arbitrario, purchè di essa D E sia maggiore) coll'altezza del raggio B C: così la lunghezza H M del dato cilindro alla lunghezza B E.

della canna di uguale resistenza, che si cercava; imperocchè per la precedente le ragioni componenti queste resistenze saranno appunto reciproche; onde ci daranno la ragione di uguaglià.

Proposizione XXIX. Quesito VII.

Data la lunghezza A (Fig. xxii.) fare un cilindro uguale al dato B C.

Facciasi, come la A alla B, così il diametro C del dato cilindro alla retta E; e sia D media tra le due C, E. Dico D essere il diametro del cerchio del cilindro D A uguale al dato B C; perchè sta la A alla B, come la C alla E, cioè il cerchio C al cerchio D; saranno, per la 25 del 12 i cilindri A D, C B uguali; che è quello, che si aveva a trovare.

Proposizione XXX. Quesito VIII.

Data la lunghezza A D, fare un cilindro uguale alla data canna F C B G.

Sia, per l'antepenultima del Galileo, la C B (Fig. xxiii.) diametro del cerchio uguale alla ciambella C B F, e facciasi, come l' A D alla B G, così la C B ad un' altra A E; dico A E essere il diametro della base del cilindro, che si cerca: essendo manifesto, che il cilindro di D A, A E, è uguale al cilindro di B G, B

C; ma questo è uguale alla canna, perchè il cerchio di C B è uguale alla ciambella; adunque il cilindro D A E è uguale alla canna. Il che è quello, che ec.

Proposizione XXXI. Quesito IX.

Data la lunghezza A B (Fig. xxiv.) sotto di essa fare una canna uguale alla data C D E.

Facciassi sotto la lunghezza A B per la precedente il cilindro A F B uguale alla canna C D E, e trovissi tra il diametro F A, ed il doppio A H, la media proporzionale A G; ed intorno al diametro G A descrivasi un cerchio, ponendovi concentrico un altro M L uguale ad F A. Dico, la ciambella G M A L essere la base della canna, che si cerca; perciocchè sta, come A F al doppio A H, così il cerchio F A al cerchio della media G A; dunque il cerchio F A, ovvero L M, è la metà del cerchio G A; e però la ciambella G L M A è uguale al cerchio F A; onde, per la comune altezza A B, la canna G L A B è uguale al cilindro F A B, cioè alla canna C D E. Il che ec.

Questo problema è capace d' infinite soluzioni, imperocchè trovato che sia il cilindro F A B (Fig. xxv.) uguale alla data canna C D E, nella data lunghezza A B, basta d'intorno al cerchio F A far-

vene un altro $N P$ concentrico, di qualsivoglia grandezza ad arbitrio; e conducendo le due tangenti $Q F S$, $V A T$ nell'estremità del diametro $A F$, stenderle fino attanto, che seghino la circonferenza del cerchio esteriore $N P$ ne' punti Q, S, V, T ; che condotta $Q V$ segata in R ad angoli retti dal diametro $N P$ parallelo alle dette tangenti; e coll'intervallo $O R$ conducendo l'altro cerchio $R X$, avremo la ciambella $N R X P$ uguale al medesimo cerchio $A F$: per essere la differenza dei quadrati $N O, O R$, cioè il rettangolo $N R P$ uguale al quadrato $R Q$, ovvero $O F$; e però altresì la differenza de' cerchi $N O, R O$ (cioè la ciambella $N R X P$) uguale al cerchio del raggio $O F$; e però la canna, che all'altezza $A B$ si facesse sopra la detta ciambella, uguaglierebbe il cilindro fatto sopra il cerchio $A F$ alla medesima altezza: cioè sarebbe uguale all'altra data canna $C D E$; e ciò in infinite maniere, potendo il diametro $N P$ del cerchio esteriore essere determinato ad arbitrio.

Proposizione XXXII. Quesito X.

Sotto la lunghezza $A B$ (Fig. xxiv.), fare una canna uguale al cilindro soda $C D E$.

Facciassi per la propos. 29. nella lunghezza A B il cilindro F A B uguale al dato C D E, ed il cerchio A G (secondo la costruzione della precedente) doppio della base F A (ovvero L M postavi concentrica) dico la ciambella G L A essere la base di quella canna, che si cerca; imperocchè il cilindro C D E è uguale al cilindro F A B: ma la canna G L A B è uguale al cilindro F A B; adunque l'istessa è uguale al cilindro C D E. Il che ec.

Questo ancora può farsi in infinite maniere, secondo la nota fatta alla precedente, dove si è insegnato di fare quante ciambelle si vogliano, e di qualunque diametro della loro esteriore convessità, tutte uguali al cerchio A F, il quale colla data lunghezza A B si suppone, che pareggi il dato C D E; si può quindi ancora dedurre, potersi fare una canna della medesima materia, e lunghezza d'un'altra, ma per cagione della maggiore grossezza, che ne slontana il centro della base dall'appoggio, più e più resistente in infinito.

Proposizione XXXIII. Teor. XXIII.

Le lunghezze massime de' cilindri orizzontalmente fitti nel muro, che sieno d'uguale grossezza, ma di differente gravità

in ispecie , non istanno in reciproca proporzione delle medesime gravità.

Imperocchè in tal caso, essendo le moli de' cilindri d'ugual base, come le lunghezze loro, e queste essendo reciproche della gravità in ispecie, i cilindri avrebbero le moli reciproche delle loro specifiche gravità; e però sarebbero di peso assoluto uguale; onde i momenti loro sarebbero proporzionali alle lunghezze, quando altronde i momenti delle resistenze nelle loro uguali sezioni sarebbero gli stessi; e però i più lunghi cilindri si proverebbero di minor resistenza.

Proposizione XXXIV. Teor. XXIV.

Allora tali cilindri sono d'egual momento verso le loro resistenze, quando i quadrati delle loro lunghezze hanno reciproca proporzione delle gravità in ispecie; ovvero che le lunghezze hanno reciproca proporzione delle gravità assolute.

Siano i cilindri ugualmente grossi A B C, H G L (Fig. xxvi.), e la gravità in ispecie del cilindro G L a quella del cilindro B D sia reciprocamente, come il quadrato della lunghezza A D al quadrato della lunghezza H L. Dico essere uguale il momento d'entrambi verso le resistenze loro: imperocchè si tagli dal cilindro B D

la parte $B F$ ugualmente lunga, e però di mole eguale al cilindro $G L$; sarà il peso assoluto $G L$ al peso assoluto $B F$, o pure (per l'uguale distanza dagli appoggi H , A) il momento di $G L$ al momento di $B F$, come la gravità specifica di quello alla gravità specifica di questo; cioè, per l'ipotesi, come il quadrato $A D$ al quadrato $H L$, ovvero $A F$; ma ancora il momento del cilindro $B D$ al momento del cilindro $B F$ sta come il quadrato $A D$ al quadrato $A F$, per la prop. 20. dunque il momento di $B D$ uguaglia il momento di $G L$. Il che si dovea dimostrare.

Perchè poi si è veduto, essere il cilindro $G L$ al cilindro $B F$, quanto al loro peso assoluto, come il quadrato $A D$ al quadrato $A F$; ed essendo il cilindro $B D$ allo stesso $B F$ quanto al peso, come la lunghezza $A D$ alla lunghezza $A F$; ne segue, che il peso assoluto $G L$ al peso assoluto $F B$ ha doppia proporzione di quella, che ha il peso $B D$ al peso $B F$; cioè, che l'assoluto peso $B D$ è mezzano proporzionale tra i pesi assoluti $G L$, $B F$; onde ancora l'assoluto peso $G L$ all'assoluto peso $B D$ starà, come il peso $B D$ al peso $B F$, cioè reciprocamente, come la lunghezza $A D$ alla lunghezza $A F$, ovvero $H L$; e però si verifica ancora la seconda parte di questa proposizione. Il che ec.

Si potrebbe ancora cercare con questa occasione, di due cilindri ugualmente lunghi, qual proporzione debbano avere le grossezze, e le gravità specifiche, per riuscire ugualmente resistenti. E trovo, che i diametri delle basi debbono essere, come le gravità specifiche; imperocchè ciò essendo, la ragione composta della mole alla mole (che in pari lunghezza de' cilindri è come i quadrati de' diametri) e della gravità specifica dell' uno alla gravità specifica dell' altro, cioè per l'ipotesi, del diametro al diametro, sarà la ragione de' cubi d'essi diametri; ma il peso assoluto al peso assoluto ha la ragione composta di quella delle moli, e di quella delle gravità specifiche; dunque nel nostro caso sarebbe il peso assoluto dell' uno al peso assoluto dell' altro, come il cubo del diametro del primo al cubo del diametro del secondo; cioè, per la prop. 15. come la resistenza rispettiva della base del primo alla resistenza rispettiva della base del secondo; che però essendo essi pesi, mercè dell' uguale lunghezza dei cilindri, ugualmente distanti da' loro sostegni, averanno i momenti loro proporzionali a' momenti delle resistenze delle loro basi, supposte altronde omogenee. Il che ec.

Che se più generalmente volessimo investigare due cilindri di varia lunghezza, e grossezza, e di differente gravità specifica. ugualmente però resistenti, basterebbe fare, che i loro diametri fossero in ra-

gione composta di quella delle gravità specifiche, e di quella de' quadrati delle lunghezze: come agevolmente dalle cose sopradette si può inferire, ma non merita il conto stenderne più proposizioni, si per non uscire da' limiti del trattato del Sig. Viviani; e sì perchè ad ogni modo fisicamente sarà impossibile, che la resistenza di più materie differenti di specie sia omogenea; onde l'ipotesi di simiglianti conclusioni non si troverebbe in pratica conforme alla natura, se non in casi rarissimi.

Proposizione XXXV. Quesito XI.

Perchè un prisma triangolare più facilmente si pieghi voltandolo colla superficie allo in giù, che quando posa su l'angolo.

Non è la medesima forza, che si richiede a superare la resistenza del triangolo A, che del triangolo B (Fig. xxvii.), essendo per altro triangoli eguali, e simili; e lo stesso può dirsi d'altre figure simili, ed uguali, ma che tocchino in diversi luoghi: stante che i centri di gravità di dette figure non sono sempre nelle medesime distanze da' sostegni.

Sicchè la difficoltà di rompere il prisma triangolare A sopra la base, sta alla difficoltà di romperlo nella disposizione B,

dove posa su l'angolo, come la distanza del centro di gravità del triangolo dalla sua base alla distanza del medesimo dalla cima; come si può raccogliere dalla prop. 1. di questo trattato; il che nel caso nostro dà una proporzione suddupla; ed in altri generi di figure dà altre proporzioni dipendenti da quelle, in cui si dividono gli assi da' loro centri di gravità.

Proposizione XXXVI. Quesito XII.

Se essendo eguali, e dissimili le figure, che servono di base a' prismi, segue lo stesso?

Alle volte senza dubbio seguirà il medesimo: quando cioè si varj la distanza del centro di gravità delle figure uguali, e dissimili, da' loro appoggi, sopra de' quali si cerca di fare la piegatura, o lo strappamento; ma non già sempre: potendo, non ostante la dissimiglianza dell'uguale figura, mantenersi la medesima distanza dall'appoggio; come, per cagione d'esempio, sia il quadrato $ABCD$ (Fig. xxviii.), il cui centro di gravità H ; onde la sua distanza dal sostegno della base sia HI . Si faccia l'altezza EI tripla della HI , e la base GF sesquiterza della BC ; dico che il triangolo GEP sarà uguale al quadrato $ABCD$, e sarà d'uguale resistenza,

ancora rispettiva, con esso, per avere il centro H comune al medesimo, e però ugualmente lontano dall'appoggio BC , ovvero GF : imperocchè posta FG uguale ad S , la BC sarà uguale a 6 , l' HI eguale a 3 , la EI uguale a 9 , la GI uguale a 4 ; e però tanto la perpendicolare EI moltiplicata per GI , metà della base GF del triangolo, fa 36 , quanto il lato BC moltiplicato per se stesso dà il quadrato $ABCD$ parimente uguale a 36 , sicchè il triangolo è uguale al quadrato: ed altronde, per essere la distanza HI un terzo dell'altezza EI , sarà il punto H centro di gravità del triangolo, siccome era ancora del quadrato; sicchè l'una, e l'altra figura dovrà ugualmente resistere.

Proposizione XXXVII. Teor. XXV.

La proporzione de' momenti ne' coni ugualmente lunghi, o uguali di mole, o simili, o di base uguale ec. è la stessa, che l'assegnata ne' cilindri.

In questa proposizione ho ridotte, per brevità, 4. proposizioni distintamente proposte dal nostro Autore; potendosi provare col medesimo, o simil progresso delle passate, senza moltiplicare figure, e parole di soverchio.

Proposizione XXXVIII. Teor. XXVI.

Se saranno due leve divise proporzionalmente, le potenze sostenenti saranno, come le resistenze.

Siano le due leve A C, F H (Fig. xxix.) proporzionalmente da' loro sostegni divise in B, G. Dico, che la potenza E applicata in C a sostenere la resistenza D posta in A, alla potenza K, la quale collocata in H regge l'altra resistenza I posta in F, sta come la stessa resistenza D all'altra I.

Imperocchè, in vigore dell'equilibrio, sta la potenza E al peso, o resistenza D, come A B a B C, cioè come F G a G H, per l'ipotesi, o di nuovo, per l'equilibrio, come K ad I; dunque s'ha E a D, come K ad I; e permutando, E a K, come D ad I. Il che ec.

Proposizione XXXIX. Teor. XXVII.

Le forze per ispezare un cono fitto nel muro, vanno scemando colla proporzione, che scemano le sezioni

Sia il cono D B C (Fig. xxx.) fitto nel muro colla sezione B D, il cui centro

A; ed in tale stato la sua resistenza sia pareggiata dal peso, o potenza E. Poi s'intenda l'istesso cono impegnato similmente nel muro colla sezione I G, il di cui centro F, e la resistenza di questa resti uguagliata dal peso, o potenza K. Dico essere E a K, come B D ad I G; Imperocchè le due leve A B C, F G C sono similmente divise dagli appoggi B G, per la similitudine de' triangoli A B C, F G C; dunque le forze E, K sono come le resistenze assolute poste in A, ed F, per l'antecedente proposizione: ma le resistenze assolute sono, come le sezioni medesime D B, I G; adunque le forze E, K sono proporzionali alle dette sezioni. Il che si dovea dimostrare.

Corollario. È manifesto, che il medesimo accade in qualsivoglia Piramide, le cui sezioni parallele alla base sono ancor esse, come i cerchi d'un cono ugualmente alto, e segato ne' medesimi punti della sua lunghezza; il che è avvertito ancora dal Sig. Viviani nel dimostrare altrimenti questa medesima proposizione, distesa altrove, come appresso si vedrà.

Proposizione XL. Teor. XXVIII.

Nei coni, o piramidi fitte nel muro a squadra, i contrappesi equivalenti alle

resistenze delle sezioni di diverse lunghezze, crescono come le sezioni medesime, considerato il cono, o la piramide senza peso: cioè riescono, come i quadrati delle lunghezze.

Sia il cono fitto nel muro A B G (Fig. xxxi.), ora fuori del muro, quanto E G, ed ora quanto F G; ed il peso H equilibri la resistenza C D, il peso I la resistenza A B. Dico, che il peso H al peso I sta come la sezione C D alla A B.

Perchè presa la G L terza proporzionale dopo le G F, G E, e da L tirata la L M parallela alle A E, C F, la quale si congiunga colla G A prolungata in M, averà il peso H al peso I la proporzione composta della contralleve C F alla F G, e della resistenza C D alla A B, cioè del quadrato C D al quadrato A B, o pure del quadrato G F al quadrato G E, cioè della G F alla terza proporzionale G L, e della leva G E alla contralleve E A, (per la prop. 6.) cioè della G L alla L M; ma anche la C F alla M L ha la proporzione composta delle medesime C F ad F G, ed F G a G L, e G L ad M L; dunque il peso H al peso I starà come la C F alla M L, cioè come il quadrato C F al quadrato A E, ovvero come la sezione C D alla A B, cioè come il quadrato della lunghezza G F al quadrato della lunghezza G E; il che ec.

Potea questa stessa proposizione, siccome ancora la precedente, che è la medesima, dedursi immediatamente dalla proposizione 10. la quale a tale oggetto si vede essere distesa dal Viviani nel suo MS imperocchè, essendo le leve $F D G$, $E B G$ divise similmente da' sostegni $D B$, e le resistenze $D C$, $B A$ essendo come i quadrati delle lunghezze $D G$, $B G$, saranno i pesi equivalenti allo dette resistenze, cioè i pesi H , I proporzionali a' quadrati delle contralleve $D F$, $B E$, o come le sezioni medesime $D C$, $B A$, ovvero come i quadrati stessi delle lunghezze $D G$, $B G$, o degli assi $F G$, $E G$; il che, ec.

Proposizione XLI. Teor. XXIX.

Diversi solidi simili dell' istessa materia, uguali di mole, e in conseguenza di peso, e della medesima lunghezza, e di resistenza assoluta uguale, ricercano forze diverse per romperli, non ostante che il centro delle loro resistenze sia egualmente in tutti lontano dal sostegno.

Sembra questo anzi un paradosso, che un Teorema, di cui non è così facile a rintracciarne il vero, e legittimo senso: nè altra prova si vede ad esso essere soggiunta nel MS. del Sig. Viviani, che una

figura in cui si esprimono 4. piramidi quadrangolari, fitte colla base in uno stesso muro verticale, altre dirette, altre inclinate, ma tutte colla cima terminanti in una stessa linea parallela al detto muro; dal quale sbozzo non si può raccorre principio veruno atto ad illustrare il concetto dell' Autore, ma sembra egualmente strano in confronto di cotale disegno, che senza di esso. Imperocchè, come mai puote verificarsi, che diversa forza si richiegga allo spezzamento di due solidi omogenei, della stessa figura, e grandezza, quando la resistenza loro assoluta si suppone la medesima, e dall' appoggio ugualmente lontana, e che i pesi, o forze che s' applicano per superarla, o sia nel centro di gravità di detti solidi (il quale è in una stessa linea verticale parallela al muro, ed in conseguenza in una stessa distanza da' sostegni) o nella cima, ed estremità di tali corpi lontanissima dal muro, in cui sono impegnati (che vale a dire in una medesima distanza, misurata dall' altezza comune ad essi, come è necessario, che sia, a volere che in ugual base, ugual mole, e peso ritengano) adoperano la stessa leva, ricevendo dall' appoggio sopra le direzioni loro una medesima perpendicolare?

Ad ogni modo, non potendomi persuadere, che il nostro Autore ciò proponesse inavvedutamente, e senza verun fondamento, mi sono studiato d' indovinare il

pensiero di lui, riflettendo ad una diversa direzione, che può considerarsi nella resistenza de' solidi, la quale non è mai stata da verun Autore, ch'io sappia, avvertita; e pure, mettendola in conto, varia di molto il momento della resistenza, e serve appunto a scoprire, e salvare il sentimento del Viviani, proponendolo nella seguente maniera.

Si equilibri il peso H (Fig. xxxii.), pendente dalla cima d'una piramide, cono, prisma, conoide, o altro solido fitto nel muro colla sua base $A B C D$, a cui sia perpendicolare l'asse $G E$, colla resistenza di detta base: ed il peso o si equilibri similmente colla resistenza d'una ugual base, simile, e similmente posta, $I K L M$, d'un altro solido uguale al primo, e dello stesso genere di figura: ma il di cui asse $N P$ sia obliquo al piano di detta base. Dico, che il peso H al peso O , sarà come il seno totale al seno dell'angolo $R P Q$, che fa l'asse del solido obliquo colla sua base, ovvero col muro medesimo, in cui sta fitto.

Da' centri delle basi E, P si mandino le perpendicolari $E F, P R$ sopra gl'infimi lati confinanti col muro $B C, K L$, sopra il taglio de' quali si dee far la rottura. Si tiri ancora la perpendicolare $R Q$ dal punto d'appoggio R sopra l'asse obliquo $N P$, e si conducano altresì $F H, R S$ perpendicolari sopra le direzioni $G H, N S$ dei

pesi attaccati alle cime G , N . È manifesto, che saranno uguali, non solo le due $E F$, $P R$, ma ancora le $F H$, $R S$. E perchè la forza, che tiene insieme attaccate le fibre de' solidi secondo ciò, che si è detto alla defin. 8. si stima dal Galileo, e dagli altri meccanici riunita nel centro di gravità, di quella sezione, in cui debbe seguire la rottura; ne segue, che nell'asse $G E$, $O N P$, il quale passa pel centro di gravità di tutte le sezioni parallele alle base del solido, si dee considerare raccolta la resistenza di tutte le sue parti; e però nel detto asse conviene, che si stenda la direzione di quella forza, che fa la resistenza de' solidi. Per la qual cosa sarà $F E$ nel primo, e $Q R$ nel secondo solido la vera distanza de' sostegni F , R dalle direzioni delle resistenze d'essi solidi. E giacchè in caso d'equilibrio esser debbe il peso H alla resistenza della base $A C$ del primo solido, come $F E$ ad $F H$ (cioè ad $R S$) e similmente la resistenza d'essa base $A C$, o dell'uguale $I L$ (che assolutamente è la medesima) sta al peso O , come $R S$ ad $R Q$; dunque per l'uguaglià ordinata, sarà il peso H al peso O , come $E F$, ovvero $R P$ ad $R Q$: cioè, come il seno totale al seno dell'angolo $R P Q$, col quale resta inclinato al muro l'asse $P N$ del solido obliquo; il che dovevasi dimostrare.

Corollario I. Quindi è, che in diverse inclinazioni le resistenze rispettive d'un

medesimo solido saranno come i seni d'esse inclinazioni.

Corollario II. Le resistenze di sezioni diverse averanno la ragione composta e della grandezza d'esse, e delle distanze dei loro centri da' sostegni (come nel corollario 2. della prop. 2. di questo) e de' seni dell'inclinazione de' solidi col muro, in cui sono fitti, e della reciproca delle lunghezze d'essi solidi, misurate nella distanza perpendicolare, dalla cima loro alla base: come si cava dalla quinta del Galileo intesa più generalmente, e da ciò, che in questa si è dimostrato; di maniera che essendo le sezioni di due solidi S, s , le distanze de' centri dal sostegno D, d ; i seni dell'inclinazioni I, i ; le lunghezze d'essi solidi L, l , saranno le resistenze del primo, e del secondo solido, come i prodotti $S D I l, s d i L$.

Corollario III. Se le sezioni, e le distanze de' loro centri di gravità, o i seni dell'inclinazioni de' solidi saranno come le lunghezze di essi, il resto essendo uguale, riusciranno le resistenze de' solidi uguali. Come per esempio, se sopra lo stesso cerchio $A S$ (Fig. xxxiii.), il di cui centro è C vi saranno due solidi, l'uno retto $A B S$, l'altro inclinato $A F S$; di maniera che l'asse $C B$ sia uguale all'asse $C F$, onde le loro cime B, F sieno nell'arco d'un quadrante circolare $B F G$; lo stesso peso, che sospendendosi in B sa-

rebbe precisamente bastante a vincere la resistenza della sezione A S, ancora appeso dalla cima F basterebbe a vincere la resistenza della medesima sezione della base comune; imperocchè tirata F E perpendicolare all'orizzonte, sarà la lunghezza C B, ovvero C F alla lunghezza C E, come la C S raggio della base alla S D condotta sopra la direzione F C della resistenza ad angoli retti: cioè come il seno totale al seno dell'inclinazione dell'angolo F C G, che fa l'asse del solido colla parete, di maniera che (ritenendo i simboli del corollario precedente) per essere in questo caso L ad l , come I ad i , sarà i L uguale ad l l ; ed essendo la stessa sezione circolare, e la medesima distanza dal sostegno C S in ambedue i solidi, e s d uguale ad S D; dunque S D I l è uguale ad s d i L, cioè le resistenze rispettive dell'uno, e dell'altro solido sono uguali.

Proposizione XLII. Teorema XXX:

In diversi piani inclinati, le resistenze de' medesimi solidi si diversificano nel volerli rompere col medesimo peso; ed ancora considerando i soli momenti de' solidi.

Secondo lo sbizzo d' una figura seguita dall'Autore appresso a questa proposizio-

ne, credo che si debba esporre nella maniera, che segue.

Sia il solido $A B G$ (Fig. xxxiv.) impiegato in varj muri $K A$, $K A$ diversamente inclinati all'orizzonte, ed il peso H sia abile a superarne la resistenza, quando è fitto il solido nel muro verticale: il peso O sia quello, che la vinca nel muro inclinato; e dal sostegno B al punto G , a cui si attaccano i detti pesi, conducasi la retta $B G$; siccome siano le $B H$, $B I$ perpendicolari dal detto sostegno sopra la direzione de' pesi. Dico che il peso H al peso O starà reciprocamente, come $B I$ a $B H$, che sono i seni degli angoli $B G I$, $B G H$; ed in conseguenza le resistenze del solido in questi varj siti saranno diverse, e diversa impressione riceverebbero da un medesimo peso. E lo stesso vale quando in luogo de' pesi aggiunti, si considerasse il momento del solo peso del solido, raccolto nel suo centro di gravità.

Imperocchè il peso H all' assoluta resistenza del solido raccolta nel centro C dalla sua base, sta come $C B$ a $B H$; e l' assoluta resistenza medesima sta al peso O , come $B I$ a $C B$; dunque per la ragione perturbata, il peso H al peso O sta, come $B I$ a $B H$; il che dovea dimostrarsi.

Che se intenderassi il solido $A B G$ tanto prolungarsi, che il punto G rimanga lo stesso col suo proprio centro di gravità; allora prescindendo dal peso aggiunto, e

considerando la gravità sola del solido raccolta in G , ed operante colla direzione GH , ovvero GO , è manifesto, che volendo supporre equilibrata la resistenza del solido in tutti questi siti col proprio peso, non potrebbe questi essere il medesimo, ma dovrebbe similmente variare in ragione reciproca de' seni BI , BH , corrispondenti agli angoli d'inclinazione BGO , BGH ; e però quando suppongasì essere lo stesso peso del solido, averà viceversa i suoi momenti misurati dalla ragione diretta de' medesimi seni BH , BI . il che ec.

Corollario I. La più gran resistenza rispettiva sarà d'un solido applicato al piano orizzontale, come accade a quello, cui tende a rompere, o a schiacciare il peso R , il quale uguagliar debbe la resistenza assoluta di esso. La minima resistenza rispettiva sarà d'un solido applicato al muro verticale: e negli altri piani, secondo che saranno più all'orizzonte inclinati, si troverà sempre resistenza maggiore.

Corollario II. E viceversa nel piano verticale avrà un solido il maggior momento, e disposizione a rompersi col proprio peso, o con uno stesso alla sua cima attaccato; e nel piano orizzontale avrà il minimo de' suoi momenti, siccome ne' piani di mezzo l'averà mediocre; e tanto maggiore, quanto più al verticale si accosta, ma tanto minore, quanto più all'orizzontale si avvicina.

Proposizione XLIII. Prob. XIII.

Si assegni la proporzione de' pesi minimi rompenti il medesimo solido col proprio peso: e qual linea descrivano l'estremità

Si è già veduto nell' antecedente, qual proporzione abbiano i minimi pesi, da' quali si spezzi il medesimo solido, in varj piani diversamente inclinati fitti a squadra colla stessa sezione; ma nel medesimo piano diversamente inclinandosi un dato solido, varierà la sezione, in cui seguir dee la rottura (siccome in un cilindro, o cono la base non si manterrebbe circolare, ma diventerebbe ellittica) onde crescerebbe per tal capo la resistenza nella ragione sì dell' ampiezza di tal sezione, e sì della distanza, che averebbe il suo centro di gravità dal sostegno; ma scemerebbe viceversa il suo momento, a misura del seno dell' inclinazione (per le cose dette nella prop. 41.) siccome nella stessa proporzione scemerebbe ancora il momento del peso attaccato alla cima del solido.

Sia per cagione d' esempio il cilindro G D K (Fig. xxxv.) fitto a squadra in un muro verticale, e la resistenza della sua base circolare G L D sia equilibrata dal peso M. Poi s' intenda l' asse A C del ci-

lindro muoversi attorno al punto C, rimanendo nel suo piano verticale, e venire nel sito C B, sicchè il cilindro sia H B O, il quale sega lo stesso muro nella base ellittica H L E; e la resistenza di essa venga pareggiata dal peso N. Dico, che M ad N ha la ragione composta della reciproca delle distanze E I, D K, per cui i sostegni E, D sono lontani dalle direzioni d'essi pesi, e di più di quella de' semidiametri C D, C E, che risultano nelle dette sezioni in ambidue i casi, e che sono le lontananze del centro della resistenza C, dalli due appoggi D, E.

Imperocchè, per cagione dell'equilibrio, starà il peso M all'assoluta resistenza delle base G L D, come C D ad D K; e la resistenza assoluta G L D all'assoluta resistenza H L E sarà come la sezione alla sezione, cioè (per essere ad ambidue comune il semidiametro L C) come C D a C E: e finalmente la resistenza assoluta di questa sezione L H E (per la prop. 41.) al peso N, che ne uguaglia il momento, è come la distanza E I alla distanza E F, o pure all'uguale B O, cioè alla C D; dunque per l'ugual proporzione sarà il peso M al peso N in ragione composta di E I a C D, di C D a D K e della C D alla C E; ma le prime due ragioni formano quella di E I a D K; dunque il peso M al peso N starà in ragione composta della reciproca delle distanze E I; D K, e della

diretta de' semidiametri CD , CE ; il che dovea dimostrarsi.

Corollario. Il peso M al peso N , cioè la resistenza del cilindro orizzontale alla resistenza dell'obliquo, sta come il quadrato del semidiametro CD al quadrato del semidiametro CE . Imperocchè $E I$ a DK , ovvero a CA , sta come CP a CB , ovvero come FE (cioè CD) a CE , essendo simili i triangoli $C F E$, $C B P$, dunque la ragione composta di $E I$ ad DK , e di CD a CE è duplicata di questa, o pure è la stessa, che la ragione del quadrato CD al quadrato CE , e però i detti pesi M , N , o resistenze de' solidi corrispondenti, sono come i quadrati de' semidiametri CD , CE .

Quanto all'altra particolarità del presente quesito, cioè di sapere, qual linea descrivano l'estremità di questi solidi, non è così agevole il determinare, che cosa l'Autore desiderasse per ciò di rinvenire; ma da una figura ivi disegnata, in cui si esprime un piano orizzontale, ed un cilindro da esso in giù pendente a piombo, con un altro obliquamente inclinato, accennando, che sieno i minimi, abili a sostenersi in tale positura, pare che il suo pensiero fusse d'indagare a qual linea terminino l'estremità di varj cilindri, o con, o altri solidi di un medesimo genere, diversamente inclinati allo stesso piano, e condotti alla precisa lunghezza, in cui regge-

re si possano; ma perchè, secondo che si supponessero l'uno dall'altro più, o meno distanti, la curva, in cui anderebbero a finire, sarebbe diversa; io li supporrò tutti coll'asse, che passi per lo stesso punto del piano, in cui sono fitti; e di più stenderò la speculazione (oltre all'orizzontale accennato nella bozza del Sig. Viviani) ancora al verticale; dal che sarà facil cosa l'immaginarsi quello che debba succedere in un piano di mezzo tra l'una, e l'altra posizione.

Sia dunque il piano orizzontale $D A G$, (Fig. xxxvi.) dentro a cui fitto a squadra si trovi il solido $D B M$ (sia cono, o cilindro, o conoide ec.) la di cui base $D M$, e l'asse $A B$, in cui sia il suo centro di gravità I ; e sopra la stessa base sia obliquamente disposto il solido $D Q M$ dello stesso nome, il di cui asse $A Q$, ed il centro di gravità E ; dico che i centri di gravità E, I (supponendo ciascuno di questi solidi, per mezzo del proprio suo peso, equilibrarsi colla resistenza della base comune) saranno in una curva $I E P$ di tal natura, che condotte le $E F, I K$ parallele all'orizzonte, e terminate dalla verticale $D C$, che passa per l'estremo D della base, saranno sempre il rettangolo $A E F$ uguale al rettangolo $A I K$; e dico ancora, che le cime B, Q di detti solidi terminano alla curva $B Q G$ simile all'altra $I E P$, la quale riferendosi alla retta $H L$

T parallela a C D, ma da essa distante in maniera, che C B a B H sia come I A ad A B, ovvero E A ad A Q (essendo gli assi di detti solidi proporzionalmente divisi da' loro centri di gravità) sarà parimente il rettangolo A Q L uguale al rettangolo A B H.

Si conduca D V perpendicolare sopra l'asse Q A, ed E X perpendicolare a D M; pareggiandosi dunque il momento del solido D Q M col momento della resistenza nella base D M, sarà il peso di esso all' assoluta resistenza D M, ovvero al peso del solido D B M, che direttamente tirando l'uguaglia, come reciprocamente la D V (distanza della direzione Q A della resistenza del sostegno D) alla D X (distanza della direzione del centro d'esso solido dal medesimo sostegno) cioè alla F E; ma il peso del solido D Q M al peso dell' altro D B M, sta come la mole alla mole, cioè (per avere la base D M comune) come l'altezza Q R all'altezza B A; dunque Q R a B A sta come D V ad F E; e permutando Q A a D V, cioè (per la similitudine de' triangoli Q R A, D V A) Q A ad A D e come B A ad F E; e di nuovo permutando Q A a B A (ovvero E A ad I A, che sono parti proporzionali degli assi tagliate da' loro centri di gravità) sarà come A D ad F E; onde il rettangolo A E F sarà uguale al rettangolo D A I

K; e però la natura della curva I E P dipende dall'uguaglianza di detti rettangoli.

E perchè i rami A Q, A B sono proporzionalmente divisi in E, I; è manifesto, essere la curva B Q G, condotta per le cime dei detti solidi della stessa natura della curva I E P; e che però dipende da una simile uguaglianza di rettangoli A Q L, A B H; siccome in fatti, essendo H B a B C, ovvero L N ad F O, come B A ad A I, cioè come Q A ad A E, o come Q N ad E O; ancora la somma degli antecedenti L Q alla somma de' conseguenti F E starà nella stessa ragione di H B a B C; e permutando L Q ad H B sarà come F E a B C, cioè a D A; ovvero (per le cose già dimostrate) come I A ad A E, che è quanto dire come B A a Q A; e però il rettangolo A Q L sarà uguale al rettangolo A B H; il che ec.

Quanto alla descrizione di questa curva; se col centro A, e semidiametro A B nella precedente figura si descriverà l'arco circolare B S, ed inclinata qualunque A S si prolungherà fino al concorso della H L in T; basterà dividere A S in Q in maniera, che le tre linee T A, A Q, Q S siano continuamente proporzionali; che il punto Q sarà nella curva cercata; imperocchè componendo, sarà A S, ovvero B A ad A Q, come Q T a T A, cioè come Q L ad A Z., o pure ad H B; e però il rettangolo A B H sarà uguale al rettangolo A

Q L, come ricerca la natura della curva B Q G, proposta da costruirsi.

Ma se il muro D A R (Fig. xxxvii.) sarà verticale, ed in esso parimente siano fitti, il solido D B M retto, e l'altro D Q M obliquo, sopra la comune base, il di cui diametro D M, ambidue minimi tra gli atti a rompersi in vigore del proprio peso, e però equilibrati colla resistenza della base suddetta. Dico che la curva, in cui terminano le cime di tali solidi, è di tale natura, che sempre al rettangolo A Q R uguaglia il quadrato A B, e la curva I E P, la quale passa pel centro di gravità dei detti solidi, è simile all'altra: sicchè ancora il rettangolo A E X pareggia il quadrato A I.

Imperocchè il peso del solido M Q D alla resistenza della base M A D sta per le cose sopra dimostrate, come D V a D F, cioè ad E X, o pure (per la simiglianza de' triangoli D V A, E X A) come D A ad A E; ma la resistenza d'essa base M A D è al peso del solido M B D, come D K, cioè A I a D A; dunque per l'uguaglianza perturbata il peso del solido M Q D a quello del solido M B D sta come I A ad A E; ma il primo peso al secondo sta come l'altezza Q R all'altezza A B; dunque Q R ad A B sta, come I A ad A E, cioè (per la proporzionale divisione degli assi fatta ne' centri di gravità de' solidi dello stesso genere) come A B ad A Q;

e però il rettangolo AQR uguaglia il quadrato di AB ; il che era da dimostrarsi.

Ed essendo il rettangolo AEX al rettangolo AQR , come il quadrato AE al quadrato AQ , cioè come il quadrato AI al quadrato AB : l'uguaglianza de' conseguenti ci assicura dell'uguaglianza degli antecedenti; e però la curva, che passa per tutti i centri di gravità di detti solidi, ci darà sempre il rettangolo AEX uguale al quadrato AI ; onde sarà simile all'altra, che passa per le cime de' medesimi. Il che ec.

Per la costruzione poi di questa curva, descrivendo col centro A , ed intervallo AB l'arco circolare BS , la cui tangente sia BT , ed inclinata qualsivoglia secante AT , basterà interporre fra le due AT , AS la mezzana proporzionale AQ : che sarà il punto Q della curva BQG ricercata; imperocchè la similitudine de' triangoli ABT , AQR , ci darà QR ad AB , come AQ ad AT , cioè come AS (ovvero AB) ad AQ ; e però il rettangolo AQR sarà uguale al quadrato AB , come richiede la natura di essa curva.

Proposizione XLIV. Quesito XIV.

Data la linea A B (Fig. xxxviii.) centrica (cioè che sia la distanza del centro di gravità B d'un solido C D dal centro A della sua base C E) di un solido fitto a squadra nel piano orizzontale C G colla sua base C E di maniera, che col proprio peso equilibri la resistenza di detta base: e data l'inclinazione dell'asse A F d'un altro solido, che abbia la medesima base, e sia simile al primo: determinare la lunghezza, che debbe avere, acciocchè aggravando col proprio peso contro il sostegno C, equilibri appunto la medesima resistenza C E (quando ancora si prescinda dalla diversa direzione, che in tal sito pare che acquisti la forza della resistenza.

Dal centro di gravità del solido B si tiri la B F parallela alla A G, che concorra coll'asse inclinato in F, e per F la F C parallela alla B A: dipoi alla C A si applichi un parallelogrammo rettangolo, uguale al rettangolo G A C, e che ecceda d'una figura quadrata; e sia questo il rettangolo C H A; e da H sia tirata H I parallela alla G F, che concorra in I colla A F. Dico che la A I è la centrica del solido ricercato.

Perchè essendo il rettangolo C H A uguale al rettangolo G A C, sarà come H C a C A, così G A ad A H, ovvero F A ad A I, o pure come il solido della centrale A F, al solido della centrale A I, per esser questo su la medesima base C E; ma il solido della centrale A F è uguale al solido della centrale A B essendo su la stessa base, e della medesima altezza; dunque H C a C A starà, come il solido della centrale A B al solido della centrale A I, cioè come il peso assoluto del primo al peso assoluto del secondo: ma il peso assoluto del solido della centrale A B è la misura della resistenza assoluta di C E; adunque la resistenza assoluta di C E alla forza assoluta, cioè al peso del solido della centrale A I starà, come H C a C A, cioè come la leva alla contralleve, e però si farà l'equilibrio tra questo e quella. Il che ec.

E perchè il rettangolo G A C è uguale al rettangolo C H A, sarà G A ad A H, come H C a C A; e dividendo G H ad H A, come H A ad A C; ovvero (tirata C L parallela ad A B, e prolungata la F A in L) come F I ad I A, così I A ad A L; quella curva adunque, che partendosi da B verso G, segnerà le rette A F in I, in modo che (le medesime prolungate sino a C L) stia L A ad A I, come A I ad I F, sarà quella, che darà tutti i centri de' solidi similari, che

col momento del proprio peso saranno bastanti a pareggiare la resistenza della propria base, qualunque si sia la loro inclinazione. E tal linea curva sarà asintotà alla A G.

Se fusse stato riveduto questo trattato, ed a perfezione ridotto dal suo Autore, egli senza dubbio primieramente accorto si sarebbe, che la curva B I, da lui qui descritta, è una vera Iperbola d'Apollonio; imperocchè, stando H C a C A, come G A ad A H, ovvero come F G (cioè B A) ad H I, il rettangolo dell'estreme C H I uguaglia quello delle mezzane C A B; e però la curva B I è una Iperbola, che ha per asintoti le linee C K, C G.

In secondo luogo forse averebbe osservato, che la vera distanza della resistenza, che è nella base C E dal suo sostegno C, non è la C A in riguardo al solido inclinato colla direzione dell'asse A F, in cui si raccoglie l'azione della resistenza del solido, passando per tutti i centri di gravità delle sezioni parallele a detta base C E, come si è avvertito nella prop. 41. ma bensì cotale distanza è la C M, perpendicolare alla detta direzione della resistenza, secondo l'asse del solido I A; il che fa degenerare l'Iperbola B I nella curva da noi sopra descritta nella prop. antecedente, la quale fu da me distesa, prima che giungessi a vedere nel MS. del Sig. Viviani questa sua costruzione; ed io non ho voluto omet-

tere nè l' una nè l' altra: parendomi quella ben fondata secondo i principj meccanici, e questa almeno verificandosi, astraendo da quella particolare considerazione della direzione diversa, che sembra avere la resistenza in un solido obliquo (il perchè ho aggiunta al titolo della proposizione del Sig. Viviani quell' ultima parentesi) tanto più, che questa nuova considerazione delle direzioni nelle resistenze potrebbe non riuscire a gusto di tutti, e però era dovere, che secondo l' ipotesi di chi ancora credesse universalmente esercitarsi la forza della resistenza secondo una direzione sempre perpendicolare alla base, non ostante qualunque obliquità dell' asse d' un solido, si determinasse la curva, in cui terminano i centri, o le cime de' solidi precisamente abili a sforzare la comune resistenza della base, come acutamente ha fatto qui il nostr'Autore.

Proposizione XLV. Teor. XXXI.

Dimostrare in altra maniera la proposizione 14. del Galileo: cioè che nel cuneo A B G, (Fig. xxxix.) il quale posa sul muro con uno de' suoi parallelogrammi, le resistenze all' esser rotto crescono, come le lunghezze del cuneo fuori del muro.

Equilibri H la resistenza A B, ed I

la resistenza C D. Dico che H ad I sta come A G a G C.

Poichè H ad I ha proporzione composta della E A ad A G, e della resistenza A B alla C D, cioè della linea E A alla C F, ovvero della A G alla G C, e della G C alla C F (per la prop. 6.) ma anche E A a C F ha proporzione composta delle medesime E A ad A G, A G a G C, G C a C F; dunque H ad I sta come E A a C F, cioè come la lunghezza A G alla lunghezza G C; il che ec.

Proposizione XLVI. Quesito XV.

Nel cuneo triangolare, F A B (Fig. XL.) quando il peso N fusse bastante a spezzare A F fitta nel muro: perchè più tosto il medesimo peso, anzi ancora minore, non dee prima spezzarlo in un'altra sezione O P più vicina all'estremo B, dove è sempre minor resistenza, col fare il cuneo in que' luoghi di mezzo sostegno di se medesimo?

Perchè dovendosi strappare non direttamente, ma obliquamente, conviene che si spezzi sopra di un sostegno veramente immobile, o pure che si muova all'opposite parti, cioè allo insù, mentre il peso N, ed il carico del muro sopra F, premtono all'ingiù, o almeno trattengono gli estre-

mi del solido , che non si lascino trasportare dall' azione del sostegno , che spinge all' insù. Ma nè il punto O , nè verun altro peso tra A , e B , è sostegno immobile , o che abbia veruna azione da spingere insù , anzi è disposto a secondare il moto della leva A B , discendendo col peso N , e piegandosi in arco circolare d' intorno al centro A , il quale solo è veramente immobile ; adunque lo spezzamento non può farsi in veruna sezione intermedia O P , ma unicamente nella A F , a cui sta sottoposto il taglio del muro,

Del resto , se talmente ferma fusse , e rigida la porzione F O , che non potesse cedere , ed accompagnare in alcuna maniera il moto della parte O B , potrebbe il peso N sforzare la sola parte O B , alla separazione sopra il sostegno stabile , che la fermezza del solido porgerebbe in tal caso nel punto O. E credo che talvolta ciò succeda , vedendosi delle mensole di pietra sporte in fuori del muro , tronche , o mozzate assai lontano dal taglio d' esso muro , in cui erano impegnate.

Proposizione XLVII. Quesito XVI.

Se i cunei triangolare , e semiparabolico debbano spezzarsi più tosto nella sezione A M (Fig. XLI.) fatto dalla minima

retta A M sopra la linea F M B, dove è minore la resistenza, che nella A F: perchè la resistenza assoluta non può essere tanta in A M, quanta in A F, per essere rettangoli della medesima altezza, che sono come le basi A M, A F: ed anco perchè la contralleve, dove tali potenze sono poste, è minore in A M, che in A F, presa la distanza dallo stesso sostegno A, che è nel taglio del muro, in cui si suppongono i cunei impegnati.

Dee seguire la rottura regolarmente parlando, nella A F, sezione comune del cuneo colla parete, in cui è fitto: perchè quantunque sia minore la resistenza di A M, che di A F, la parte F M non essendo premuta contro il sostegno, e tenuta fissa nel muro, come si è avvertito essere necessario nella proposizione precedente, potrà secondare il moto dell'altra parte contigua M B, tirata giù dal peso N: onde cedendo, e piegandosi con essa, non potrà da lei separarsi; e però non seguirà la rottura nella retta perpendicolare A M, se non in caso, che la materia F A M fosse talmente ferma, e rigida, che non potesse nella maniera accennata cedere, e piegarsi: perchè allora sarebbe, come se il cuneo M A B fosse fitto in un muro A M inclinato all'orizzonte, e lo spezzamento seguirebbe secondo le regole di sopra assegnate nella prop. 42.

Proposizione XLVIII. Teor. XXXII. .

Se il cuneo triangolare A B C D (Fig. XI. II.) sarà fitto nel muro perpendicolarmente, ora colla sezione A B, ed ora con l'altra E F parallela all' A B; appendendo all'estremità D un peso H, che sia bastante appunto a spezzare il solido nella sezione A B; ed un'altra G, che sia appunto bastante per superare la resistenza della sezione E F, dico, che i pesi G, ed H sono eguali: cioè a dire, che detto cuneo è per tutto egualmente resistente, considerato senza peso.

Dividasi la A I per mezzo in O, e giungasi la D O, segante la E N per mezzo in Q. Da O Q si alzino O P, Q R, che congiungano i punti P R, centri di gravità delle sezioni A B, E F (le quali, per essere parallelogrammi, che hanno eguali altezze A L, E M, daranno le distanze de' centri loro P O, R Q eguali) Ora qui le D Q, D O saranno le leve, dove in D sono applicate le forze, o pesi G H; e le Q R, O P le contralleve, all'estremità delle quali in R, P sono applicate le resistenze E F, A B; ed il peso G pareggia la resistenza E F, ed il peso H equilibra la resistenza A B. Dunque per la prop. 6 il peso G al peso H ha la proporzione composta dalla con-

tralleva RQ alla leva QD , e della resistenza EF alla AB , cioè della linea EN alla AI (essendo parallelogrammi con eguali altezze, che sono fra loro come le basi) cioè della leva DQ alla DO , e della leva DO alla contralleva OP ; ma anche la QR alla OP ha la proporzione composta delle medesime RQ a QD , QD a DO , e DO ad OP , dunque il peso G al peso H sta come la QR alla OP ; e però sono tra loro uguali. Il che si dovea dimostrare.

In altra maniera si discorra così; il momento della resistenza AB al momento della resistenza EF sta, per la prop. 2 come la base AI alla base EN , cioè come la leva OD alla QD , ovvero come il momento del peso H pendente dalla leva OD , al momento del medesimo peso pendente dalla leva QD ; e permutando il momento della resistenza AB , al momento del peso H pendente da OD , starà come il momento della resistenza EF , al momento del medesimo peso H pendente da QD ; ma i primi momenti sono uguali, dunque ancora i secondi; e però il medesimo peso, che pendente da OD equilibra la resistenza AB , pendendo da QD equilibrerà la resistenza EF . Il che ec.

Più speditamente, per la prop. 7 essendo nelle leve POD , RQD , le uguali braccia PO , RQ ; ed in esse le resistenze proporzionali alle contralleva OD ,

Q D: da uguali contrappesi H, G si equilibreranno le suddette resistenze; il che ec.

Proposizione XLIX. Teor. XXXIII.

Se il cuneo parabolico A D I (Fig. XLIII.) sarà fitto nel muro perpendicolarmente, ed il peso L equilibri la resistenza A D, il peso M la resistenza E G, dico che il peso L al peso M ha suddupla proporzione della leva I P alla leva I Q: che è la proporzione reciproca delle lunghezze di detto cuneo.

Poichè la resistenza A D alla E G sta come la linea A B alla E H; ma la A B alla E H ha suddupla proporzione del quadrato A B al quadrato E H, cioè della leva Q I alla I P; e le contrallevi Q O, P N, all'estremità delle quali sono appese le resistenze A D, E G, sono uguali; dunque per la prop. 8 il peso L, che equilibra la resistenza A D, al peso M, che equilibra la E G, ha suddupla proporzione della leva I P alla leva I Q; il che si dovea dimostrare.

Corollario. Prendendo la I R media fra I P, ed I Q, la quale ad I Q ha parimente suddupla proporzione della I P alla I Q, sarà il peso L al peso M, come I R ad I Q, o come I P ad I R: onde se per pareggiare la resistenza A D si ricerca il peso L, per pareggiare la E G,

quando il cuneo sarà più corto fuori del muro, ci vorrà un peso M, che sia maggiore della L: e tanto maggiore, quanto la media R I tra le due leve Q I, P I, è maggiore della minor leva P I.

Proposizione L. Teor. XXXIV.

Se saranno due leve divise da' loro sostegni in maniera, che le distanze, dove si hanno da costituire le potenze, abbiano tra di loro doppia proporzione delle distanze, dove saranno le resistenze: le quali resistenze siano tra loro in doppia proporzione delle loro distanze medesime; le potenze sostenenti fra loro saranno, come le distanze delle resistenze.

Sia B C a G H (Fig. xxix) in ragione doppia di A B ad F G; e sia ancora la resistenza D alla resistenza I nella stessa doppia ragione A B ad F G; le forze sostenenti E, K saranno come A B ad F G; imperocchè starà E a K in ragione composta di E a D, di D ad I, e di A K; ma la prima ragione è per l'equilibrio quella di A B a B C; la seconda per l'ipotesi quella di B C a G H (essendo tanto l'una, che l'altra doppia della ragione di A B ad F G) e la terza quella di G H ad F G; dalle quali ne risulta quella di A B ad F G; dunque E a K sta come A B ad F G. Il che ec.

Corollario. Quindi è chiaro, che lo stesso accaderebbe, se fusse D ad I, come B C a G H, quantunque l'una, e l'altra ragione non fusse doppia di quella di A B ad F G: seguendone subito, che sia E a K, come A B ad F G, in vigore della precedente dimostrazione, indipendente da quella circostanza d'ragione doppia, per cui si limita il Teorema del Sig. Viviani.

Proposizione LI. Teor. XXXV.

Le forze per ispezzare un conoide parabolico, fitto nel muro, accorciando il conoide, scemano colla proporzione, che scemano i diametri delle sezioni.

Perchè nel conoide B C D (Fig. XLIV.) parabolico, segato col piano I G parallelo alla base, sta la distanza A C alla distanza F G, (nelle quali si costituiscono le potenze E, K abili a vincere la resistenza di dette sezioni, spezzando in esse il solido) in doppia ragione delle distanze A B, F G, nelle quali si applicano le resistenze, e queste sono come i cerchi D B, I G, i quali altresì hanno doppia ragione delle stesse distanze A B, F G; dunque per la precedente sarà E a K, come A B ad F G, o pure come tutto il diametro D B al diametro I G; il che era da dimostrarsi.

Proposizione LII. Teor. XXXVI.

Se nelle libbre A B C, O D E (Fig. XLV.) in cui i pesi F, G, H, I sono equilibrati, sarà il peso F al peso H, come il quadrato del vette A B al quadrato del vette O D, e la contralleve B C alla contralleve D E sia come il cubo del vette A B al cubo del vette O D, saranno i pesi G, ed I tra loro uguali.

Si pigli D K uguale a B C, ed il peso L posto in K, si equilibri con H; dunque il peso G al peso L, per la prop. 13 starà, come il cubo di A B al cubo di O D, cioè per l'ipotesi, come la distanza B C, ovvero D K, alla distanza D E; ma per essere uguali i momenti de' pesi I, ed L, i quali si equilibrano collo stesso H, starà ancora I ad L, come D K a D E; adunque G ad L sta, come I ad L; e però G, ed I sono uguali; il che ec.

Proposizione LIII. Teor. XXXVII.

La conoide nata da una parabola cubica, essendo fermata colla base nel muro, resiste ugualmente in qualsivoglia delle sue sezioni.

Se nel rettangolo A B (Fig. XLVI.) e nel triangolo A C B siano applicate le

rette D H E, F I G, e tra le due D E, E H si piglino due medie proporzionali E L, E M; e similmente fra le due F G, G I le due medie O G, N G, e così sempre, i punti B, O, L, A saranno nel contorno d'una parabola cubica; di maniera che D E ad E H; o pure A C ad E H, cioè C B a B E, sarà come il cubo D E, o pure A C, al cubo E L; e ciò sempre. Ora dico, che se questa parabola cubica si r avvolgerà d'intorno all'asse B C, il solido rotondo A P B da esse generato, essendo fitto colla base nel muro, e da esso tirandolo fuori a qualsivoglia lunghezza, resisterà sempre ugualmente. Imperocchè il cerchio generato dal raggio A C al cerchio fatto dal raggio L E, cioè la resistenza assoluta del primo alla resistenza del secondo, è come il quadrato del braccio della leva A C al quadrato del braccio della leva L E; ma la contralleva B C alla contralleva B E è come il cubo della leva A C, al cubo della leva L E; dunque per la precedente, lo stesso peso, che attaccato in B supera la resistenza della sezione A C, supererà ancora la resistenza di qualsivoglia altra sezione L E. Il che dovea dimostrarsi: avvertendo però, che tutto questo si verifica, astraendo dal proprio peso di detta conoide.

O pure in altra maniera si discorra così. Il momento della resistenza del cerchio

Galileo Galilei Vol. IX. 19

chio A C al momento della resistenza del cerchio L E sta , come il cubo A C al cubo L E (per la prop. 4) cioè , per la natura del solido , come C B a B E , o come il momento d'uno stesso peso attaccato in B , nella distanza B C , tale che pareggi il momento della resistenza A C , al momento del medesimo peso attaccato in B colla distanza B E ; adunque permutando il momento della resistenza A C al momento del peso in B colla distanza B C sarà , come il momento della resistenza L E a quello del peso in B colla distanza B E ; ma il peso in B colla distanza B C pareggia il momento della resistenza A C ; dunque lo stesso colla distanza E B pareggerà il momento della resistenza L E ; il che ec.

Proposizione LIV. Quesito XVII.

Cercare d'una figura piana , come A B C (Fig. XLVII.) talmente disposta d'intorno al suo asse B C , che i quadrati dell'applicate A C , D E , abbiano tra di loro la proporzione composta della superficie A B C alla superficie D B E , e dell'altezza B C all'altezza B E .

Questa sarà un trilineo parabolico A B C , in cui la base B C sia tangente della cima B , e le A C , D E siano parallele all'asse della parabola ; imperocchè , es-

sendo il trilineo $A C B$ un terzo del rettangolo circoscritto $A C B$, ed il trilineo $D E B$ un terzo parimente del circoscritto rettangolo $D E B$, averà la superficie $A C B$ alla superficie $D E B$ la ragione composta delle ragioni de' lati $C A$ a $D E$, (cioè del quadrato $C B$ al quadrato $E B$) e di $C B$ a $B E$; onde sarà come il cubo $C B$ al cubo $B E$. Si aggiunga ora da entrambe le parti la ragione di $C B$ a $B E$; sarà la ragione composta della superficie $A C B$ alla superficie $D E B$, e della $C B$ a $B E$, uguale a quella del biquadrato $C B$ al biquadrato $B E$; ma stando $A C$ a $D E$, come il quadrato della $C B$ al quadrato della $B E$; raddoppiata l'una e l'altra ragione, sarà il quadrato $A C$ al quadrato $D E$, come il biquadrato $C B$ al biquadrato $B E$; adunque il quadrato $A C$ al quadrato $D E$ ha la ragione composta di quella della superficie $A C B$ alla superficie $D E B$, e di quella dell'altezza $B C$ all'altezza $B E$; che è quello che si dovea ritrovare.

Proposizione LV. Teor. XXXVIII.

La figura dotata delle condizioni sopradette nell' antecedente proposizione, sarà ugualmente resistente in tutte le sezioni: intesa però cavata fuori di un muro coll' asse $B C$ orizzontale. E similmen-

te il prisma, che averà per base detta figura, sarà ugualmente resistente (attesa la propria gravità del medesimo prisma)

La ragione è perchè le resistenze (rispettive) delle linee , o piani A C , D E sono fra loro , come i quadrati di dette linee , per la prop. 3 ed i momenti delle superficie , o solidi A B C , D B E hanno la proporzione composta delle dette proporzioni (cioè delle superficie A B C , D B E , e della distanza B C alla B E , delle quali proporzioni si suppone composta ancora la ragione del quadrato A C al quadrato D E) dunque le resistenze rispettive delle sezioni , cioè i momenti co' quali esse resistono allo strappamento , staranno come i momenti delle figure cavate fuori del muro ; e però da per tutto ugualmente resisteranno , in riguardo del proprio peso.

Proposizione LVI. Quesito XVIII.

Cercare d' un' altra figura solida rotonda d' intorno al suo asse , di cui i cubi de' diametri ne' cerchi applicati A B , C D (Fig. XLVIII.) abbiano la proporzione composta del solido A G B al solido C G D , e dell' altezza E G all' altezza F G.

La tromba parabolica , nata dal avvolgersi il trilineo parabolico G E B d' intorno alla tangente della sua cima G. E , soddisfa al Quesito. Imperocchè il solido

A B G al solido C D G (essendo ciascuno d'essi un quinto del cilindro circoscritto) ha ragione composta di quella de' cerchi, e de' quadrati A B, C D, e di quella dell'altezze E G, F G. Si aggiunga un'altra volta di comune la ragione di E G ad F G, sarà dunque la ragione composta di quella de' solidi A B G, C D G, e di quella dell'altezze E G, F G, uguale a quella che si compone dalla ragione dei quadrati A B, C D, e dell'altra de' quadrati E G, F G, cioè delle linee A E, C F, o delle duple di esse A B, C D; ma la ragione de' quadrati A B, C D, giunta a quella delle linee A B, C D forma quella de' cubi A B, C D; dunque i cubi de' diametri A B, C D hanno la proporzione composta di quella del solido A G B al solido C G D, e di quella dell'altezza E G, F G. Il che si dovea ec.

Proposizione LVII. Teor. XXXIX.

La figura ritrovata nella precedente proposizione ci dà un solido, che fitto nel muro sarà per tutto ugualmente resistente, considerato come grave.

Perchè la resistenza del cerchio A B alla resistenza del cerchio C D ha proporzione composta del cerchio, o quadrato A B al cerchio, o quadrato C D, e della linea A B alla linea C D (pel co-

roll. 2 della prop. 2 che parla de' momenti delle resistenze assolute, i quali sono la medesima cosa colle resistenze rispettive, delle quali qui si tratta, per la definizione 5) *ma ancora il cubo di A B al cubo di C D ha proporzione composta delle medesime proporzioni; e però dette resistenze sono, come i cubi de' diametri A B, C D (come nella prop. 4 si è dimostrato) ma i momenti de' solidi hanno altresì la proporzione composta della proporzione de' medesimi solidi, e delle loro altezze; dunque in questo caso le resistenze sono proporzionali a' momenti del peso de' solidi; e però tanto resiste l'uno, che l'altro, in riguardo del proprio peso. Il che ec.*

Proposizione LVIII. Quesito XIX.

Cercare qual sia quel piano, e quel solido, che tirato fuori di una parete, sia in ogni stato ugualmente resistente, o potente a reggere il proprio peso.

Al quesito ho soddisfatto nel mio problema 6 della parte 1 della risposta Apologetica al Sig. A. M. in infinite maniere, dalle quali si deduce il cuneo parabolico, e la tromba altresì parabolica, che si generano dal compimento della parabola ordinaria, o combinandosi col rettangolo, per farne nascere un prisma, o rivolgendosi

attorno la tangente verticale, per avere un solido rotondo, de' quali si è parlato nelle proposizioni 54 55 56 e 57 siccome ancora fu avvertito dal Sig. Leibnizio negli Atti di Lipsia del 1684 e da Monsù Varignonio nelle memorie dell'Accad. Reale di Parigi del 1702 ed in oltre con infinite iperbole, o con lo spazio logaritmico, o con un prisma sopra di esso spazio eretto a qualsivoglia altezza, si ottiene il medesimo intento: come ho dimostrato nel luogo citato, da ripetersi nell'Appendice aggiunta in piè del Trattato presente, Probl. 6 coroll. 3 e 4.

Proposizione LIX. Quesito XX.

Cercare qual sia quel solido, cioè di che figura, il quale tenuto in piombo ha in ogni sezione ugual resistenza: cioè che la sezione alla sezione stia, come il solido al solido sopra di esse sezioni costituito.

Tale sarebbe il solido fatto dalla logaritmica A H B (Fig. II.) girata d'intorno al suo asintoto D O. Imperocchè, o si pigli il solido infinitamente lungo, che avrebbe la sezione della sua base nel cerchio descritto dal raggio F B, o quello che l'avrebbe nell'altro cerchio del raggio D A, sarebbe per lo teor. 9 di Cristiano Ugenio, da me dimostrato negli Ugeniani cap. 9 n. 16. 9 il primo solido sesquialtero del cono descritte dal triangolo F B O nel girare

intorno ad FO ; ed il secondo sarebbe pure sesquialtero del cono similmente descritto dal triangolo DAC , i quali conì, avendo per base i cerchi FB , DA , e per altezza le suttangenti FO , DC , che sono per la natura di questa curva tra di loro uguali, sarebbero in proporzione degli stessi cerchi FB , DA ; e però ancora l'uno all'altro de' solidi fatti da essa logaritmica, sarebbe nella ragione delle basi, o sezioni, quali sarebbero i cerchi descritti dai raggi FB DA . Il che ec.

Lo stesso si dica d'un solido, le cui sezioni fossero tanti quadrati, o triangoli, o poligoni, o altre figure simili, fatte sopra l'ordinate della detta logaritmica; o che avesse per sezioni tanti rettangoli uguali, o proporzionali agli stessi quadrati, o alle medesime ordinate, come sarebbe un prisma d'una determinata altezza, fatto sopra la base dello spazio logaritmico suddetto infinitamente lungo; imperocchè secondo ciò che dimostrai negli Ugeniani cap. 3 n. 7 gli spazj logaritmici $DABO$, FBO , sono come l'ordinate medesime DA , FB , e però il prisma eretto sul primo spazio a quello che si alzerebbe sul secondo colla medesima altezza averebbe la proporzione delle dette ordinate, ovvero de' rettangoli fatti da esse nella comune altezza del prisma; i quali sarebbero le sezioni dello stesso prisma ne' punti D , F ; ed immaginandosi due figure, delle quali una

fosse determinata a capriccio, crescente però in infinito col prolungamento dell'asse, e l'altra avesse per ordinata una quarta proporzionale dopo l'ordinata arbitraria della prima, l'ordinata della logaritmica allo stesso punto, ed un'altra qualsivoglia costante, intendendo fatti gl'infiniti rettangoli dall'ordinate di queste due figure, moltiplicate l'una coll'altra, il solido, che ne risulterebbe, sarebbe dotato della stessa proprietà col suddetto prisma, avendo le sezioni uguali sempre, o proporzionali ai rettangoli di quello; sicchè infiniti solidi possono determinarsi, i quali, nella maniera desiderata in questo quesito, cioè coll'avere le sezioni delle grossezze loro proporzionali a' pesi de' medesimi, fossero d'eguale resistenza in riguardo allo strapparsi direttamente da un piano orizzontale, in cui fitti fossero a squadra, ed a piombo quindi pendessero; i quali tutti però sono di lunghezza infinita, e dipendono sempre nella generazione loro dalla descrizione della logaritmica; nè a me sovviene altra specie di solido, che possa soddisfare al quesito; anzi credo assolutamente impossibile, che verun solido di lunghezza determinata possa avere le suddette condizioni per l'effetto, che si desidera.

Proposizione LX. Quesito XXI.

Cercare ancora quale sia quello spazio superficiale, che considerato in piombo, cioè pendente da alto, sia pure ugualmente resistente: cioè che il taglio al taglio sia come la superficie alla superficie, qual sarebbe A E B (Fig. 1.) se stesse alla porzione sua C E D, come A B a C D.

Questo altresì non può essere altro, che il medesimo spazio della logaritmica, le di cui porzioni infinitamente lunghe, tagliate da qualsivoglia ordinata, sono come l'ordinate medesime, dalle quali resta segato, per le cose dimostrate ne' luoghi di sopra citati: e potrebbe anche aggiugnersi la superficie rotonda generata dalla Trattoria B D E rivoltata intorno il suo asse F E in cui parimente le superficie infinitamente lunghe A B E, C D E tagliate con varj piani paralleli alla base, sono come le circonferenze A B, C D nelle quali si fa il taglio medesimo; come può ricavarsi da ciò, che dimostrai negli Ugeniani capit. 12 num. 15 e nella Pistola geometrica al chiarissimo P. Ceva n. 19.

Proposizione LXI. Quesito XL.

La figura piana d'intorno al proprio asse, le superficie della quale tagliate dall'applicate, siano tra loro, come le medesime applicate non è figura di proporzionale aumento, o estensione.

Figura di poporzionale aumento d'intorno al proprio asse intendo quella, della quale qualunque parte terminata da qualunque applicata al suo parallelogrammo circoscritto ha la medesima proporzione, che qualunque altra parte terminata da un'altra applicata al suo parallelogrammo circoscritto; come segue nell'infinite parabole, che nella prima; cioè nel triangolo $A B C$ (Fig. LI.) il triangolo $B A C$, al parallelogrammo $B D$ sta come il triangolo $E A F$ al suo parallelogrammo $E G$, perchè è sudduplo ec.

E nella seconda parabola (cioè quella d'Apoilonio) il bilineo $B A C$ al suo parallelogrammo $B D$ sta, come il bilineo $E A F$ al suo parallelogrammo $E G$, perchè è sesquialtero ec. e così nell'altre.

Se dunque nella figura $A B C$ (Fig. LII.) d'intorno l'asse $B O$, fusse come la superficie $A B C$ alla $D B E$, così la linea applicata $A C$ alla $D E$, e così sempre; dico che questa figura non è di proporzionale aumento; perchè essendo tale, sa-

rebbe come il parallelogrammo A B al trilineo A B O, così il parallelogrammo B D al trilineo D B H; e permutando, il parallelogrammo A B al parallelogrammo B D, come il trilineo A B O al trilineo D B H, cioè (per la supposta proprietà della figura) come l'applicata A O alla D H, cioè alla I O; o pure come il parallelogrammo A B al parallelogrammo I B; adunque i parallelogrammi D B, I B sarebbero uguali tra loro, il tutto alla parte; il che è assurdo; adunque ec.

È da notarsi, che sebbene il Sig. Viviani non giunse a terminare la natura di cotesto spazio; il che non è maraviglia, essendo che la curva logaritmica allora non era assai nota fra' Matematici, e molto meno divulgate erano le sue proprietà mirabili pubblicate da Cristiano Ugenio, e poscia da noi dimostrate: sebbene, assai prima dello stesso Ugenio, era stata ritrovata la dimensione dello spazio logaritmico, e dei solidi da esso generati, dall' incomparabile Evangelista Torricelli; come apparisce dall' indice dell' opere inedite di lui, rimase fino a questi ultimi tempi chiuse in una cassa serrata a chiavi tenute appresso di più possessori, della notizia delle quali ne abbiamo l' obbligo all' Autore della Prefazione stampata poco fa, e premessa alle Accademiche lezioni di esso Torricelli; e speriamo un giorno di doverlo altresì ringraziare per l' edizione di tutti que' preziosi

monumenti, ehe con grandissimo vantaggio delle scienze, e somma gloria della nostra Italia, ci ha lasciati quel grand'ingegno. Per altro è assai, che almeno il nostro Autore indovinasse, e dimostrasse, non poter essere lo spazio, di cui si trattava, proporzionale al parallelogrammo circoscritto: siccome poco credo che vi mancasse all'accorgersi, che nè meno essere poteva alcuno spazio di finita, e terminata lunghezza.

Oltre di ciò, in proposito delle figure di proporzionale augumento, si vede, che il Sig. Viviani fin d'allora per se stesso avvertì alla proporzione dell'infinite parabole co' parallelogrammi circoscritti, o a triangoli iscritti de' quali fa menzione in questa stessa pagina colla nota seguente, in cui si vede una bellissima proprietà di questa progressione di spazj, scoperta avanti ad ogni altro dal nostro Autore.

Termini di proporzioni tra i parallelogrammi circoscritti all'infinite parabole, colle loro parabole.

Parabole: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ec.

Parallelogrammi: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ec.

Termini di proporzione dell'infinite parabole con i loro iscritti triangoli, e regola per ritrovarli con facilità, scrivendo prima un sì, ed un no, come si vede,

i numeri dispari dall'unità, ed a dirimpetto (ovvero direttamente al di sotto) i numeri della progressione naturale dall'unità: riempiendo poi i mezzi colla somma del termine di sopra (cioè dell'antecedente) con quel di sotto (vale a dire col conseguente) come si vede qui appresso.

~~~~~

*Parabole*    1 4 3 8 5 12 7 16 9 ec.

*Triangoli*    1 3 2 5 3 7 4 9 5 ec.

~~~~~

Anzi trovo, essere stata dalla stesso nostro Autore determinata la ragione, che osservano le porzioni, non solo dell' infinite parabole, ma ancora de' con, e conoidi da esse generate, come si vede nella seguente sua proposizione.

Proposizione LXII. Teor. LXI.

Nella parabola lineare ABC (Fig. LIII.), la superficie A B C alla superficie D B E sta come il quadrato A C al quadrato D E.

Nel cono A B C (girando la parabola lineare intorno all'asse B C) il co-

no $A B C$ al cono $D B E$ sta come il cubo $A C$ al cubo $D E$.

Nella parabola quadratica $A B C$, la superficie $A B C$ alla $D B E$ sta, come il cubo $A C$ al cubo $D E$.

Nel conoide quadratico $A B C$ il solido $A B C$ al solido $D B E$ sta, come il biquadrato $A C$ al biquadrato $D E$.

Nella parabola cubica la superficie $A B C$ alla $D B E$ sta come il biquadrato $A C$ al biquadrato $D E$.

Nel conoide cubico, il solido $A B C$ al solido $D B E$ sta, come il surdesolido $A C$ al surdesolido $D E$ (intendendosi appresso gli *Algebristi antichi* per surdesolidi le quinte potestà di esse linee)

Nella parabola quadrato-quadratica, la superficie $A B C$ alla $D B E$ sta, come il surdesolido $A C$ al surdesolido $D E$.

Nel conoide biquadratico, il solido $A B C$ al solido $D B E$ sta, come il cubo quadrato (cioè la stessa potestà) di $A C$ al cubo quadrato (cioè parimente alla stessa potestà) di $D E$ ec.

E così gradatamente salendo, secondo la progressione delle medesime potestà algebratiche; ovvero per dirla più generalmente, se le parti dell'asse tagliate dalla cima, cioè $C B$, $E B$, sono proporzionali alle potestà dell'ordinate: $A C$, $D E$, il di cui esponente, dal quale si denominano, sia qualunque numero m , la superficie $A B C$ alla superficie $D B E$ starà,

come la potestà dell' ordinata A C, il di cui esponente sia maggiore d' una unità, cioè $m + 1$ ad una simile potestà dell' ordinata D E. Ma il solido A B C al solido D B E starà, come la potestà dell' ordinata A C, il di cui esponente sia maggiore di m per due unità, cioè $m + 2$, ad una simile potestà dell' ordinata D E; il che può vedersi dimostrato appresso l' Angeli, il Vallisio, ed altri tali Autori.

Proposizione LXIII. Quesito XXII.

Cercare un solido rotondo d' intorno al proprio asse, come F L G (Fig. LIV.), di cui i piani applicati F G, H I, stiano tra loro, come i solidi F L G, H L I; che questo ancora appeso perpendicolarmente sarà per tutto di uguale resistenza.

Già si è veduto nella prop. 59. essere questo un solido generato dallo stesso spazio logaritmico, ovvero che abbia le sezioni proporzionali alle ordinate della logaritmica, o a' quadrati di esse; nè occorre qui aggiungere altro, se non che di esso pure si verifica, non esser cotal solido figura di proporzionale aumento, cioè non avere sempre qualunque sua porzione una medesima relazione al cilindro, o prisma circoscritto; potendosi qui applicare la stessa dimostrazione addotta dal Viviani

nella proposizione precedente; il che con espresso avviso fu accennato dal medesimo Autore nel luogo di sopra addotto; ove dopo le parole: *il che è assurdo, adunque ec.* così immediatamente soggiunge.

L'istesso si concluderà de' solidi rotondi, de' quali segati con piani paralleli alla base, stia come la base alla base, così il solido al solido.

Proposizione LXIV. Teor. LXII.

Se del cono solido, o piramide A B C G (Fig. LV.), sospesa perpendicolare all'orizzonte, il peso della parte A C G B sarà bastante appunto a superare la resistenza della sezione B C; e che la misura della resistenza B C si figuri essere la linea A G, e la misura del peso A G G B sia la medesima A G; accorciando il cono, o piramide fino alla sezione E F, dico, che il solo peso della piramide D G non è bastante a superare la resistenza E F, e che per superarla si richiede un peso H, il quale al peso della piramide D G abbia la proporzione della A D differenza dell'altezze, alla D G, altezza della minore.

Poichè prese dopo le A G, G D, G I, G L continue proporzionali, essendo
Galileo Galilei Vol. IX. 20

la quarta GL misura del peso EFG (perchè le piramidi simili hanno triplicata proporzione de' lati omologhi) ed essendo la medesima prima AG misura della resistenza BC , sarà la terza GI misura della resistenza EF (perchè le resistenze assolute BC , EF , sono tra loro, come le sezioni BC , EF , che per essere simili, hanno doppia proporzione de' lati omologhi AB , DE , cioè delle AG , DG .) se dunque una resistenza BC , rappresentata dalla linea AG , per essere superata vuole un peso, quanto rappresenta la medesima linea AG ; la resistenza EF rappresentata dalla GI , vorrà un peso, quanto la medesima GI : ma il peso della piramide EFG è quanto la linea GL ; adunque il peso, che manca per istrappare la piramide EFG , cioè il peso H , dovrà essere quanto la linea LI ; e però il peso H al peso della sua piramide EFG starà, come LI ad LG , cioè come AD di differenza dell' altezze, a DG altezza della piramide, o cono più corto. Il che ec.

Da questa utilissima proposizione, e dall' ingegnosa maniera, con cui l' Autore l' ha dimostrata, moltissime altre importanti verità si possono dedurre, le quali io brevemente accennerò ne' seguenti Corollarij, per non accrescere il numero delle proposizioni.

Corollario I. Giacchè il peso H al peso della piramide $FDEG$ sta, come IL ad LG ; ed il peso di detta piramide al peso dell'intera CBG sta come LG ad AG ; sarà per l'ugual proporzione il peso H al peso dell'intera piramide CBG come IL ad AG .

Corollario II. O pure, essendo il peso H al peso $FDEG$, come AD a DG , cioè, preso per base comune il quadrato DG , come il prisma dell'altezza AD eretto sopra il quadrato DG , al cubo DG ; ed il peso $FDEG$ al peso $CABG$ essendo, come il cubo DG al cubo AG , sarà per l'ugualità ordinata il peso H al peso $CABG$, come il prisma, che abbia per altezza AD , e per base il quadrato DG , al cubo AG .

Corollario III. Quindi può agevolmente determinarsi, quale sia quella porzione di cono, o piramide, che oltre al proprio peso, è capace di reggere il maggior peso H aggiuntovi; imperocchè il maggior prisma, che far si possa dalle parti d'una data linea, delle quali una serva per altezza, e la rimanente sia il lato del quadrato della sua base, è quando l'altezza sia un terzo, ed il lato quadro della base comprenda gli altri due terzi della data linea, conforme è già noto a' Geometri, e fu dimostrato dal Borelli nel sedicesimo assunto d'Archimede; dunque allora il pe-

so II sarà il maggior di tutti, quando la sezione FDE si farà in lontananza dalla base CAB per un terzo di tutta l'altezza di quella piramide CBG , che sarebbe sufficiente col proprio peso a vincere la resistenza della sua base; e conseguentemente la piramide $FDEG$ così tagliata, riuscirà della maggior resistenza che sia possibile.

Corollario IV. Per lo contrario, sapendosi per ipotesi, o per esperienza che una piramide abbia la maggiore sua resistenza nella sezione FDE , cioè che sostenuta in essa sia capace di reggere, oltre la propria gravezza, il maggior peso possibile: si saprà ancora, che accrescendola fino al piano CAB , distante da detta sezione per la metà dell'altezza GD , la piramide $CABG$ dovrà rompersi col proprio peso.

Corollario V. Quando il cono, o piramide fosse fitto colla base nel muro, sporgendo fuori di esso coll'asse orizzontalmente disteso, e fusse come prima $CABG$ il solido, che in tale stato si rompesse col proprio peso: se poi si supponesse sporgersi fuori del muro la sola parte FGE , sarebbe questa parimente capace di reggere oltre la propria gravità un tale peso H , che liberamente pendendo dal termine G stesse al peso di tutta la piramide $CABG$ come un quarto del prisma contenuto dall'altezza DA , e dal quadrato DG ,

al cubo della $G A$: come è facile il dedurlo dalle cose dette di sopra.

Corollario VI. Onde ciò che si è detto nel corollario 3. e 4. del massimo peso, che regger possa una piramide pendente da alto, come fitta a piombo in una volta, vale ancora nel sito, che fosse impegnata in un muro coll'asse orizzontale.

Corollario VII. Si potrebbe ancora collo stesso metodo determinare la maggior resistenza di qualsivoglia altra specie di solido, e principalmente di quelli, che nascono dall'infinite parabole, o iperbole; e già ne ho in pronto alcune regole generali: ma non avendo tempo di stenderle, e di confermarle colle dovute dimostrazioni, lascerò all'industria de' Lettori il piacere di ritrovarle.

Proposizione LXV. Teor. XLIII.

Ne' cilindri, o prismi, coni, o piramidi, le basi loro essendo uguali, e l'altezze disuguali, le forze abili a sostenerli eretti sopra di un punto del contorno della loro base, come sopra un sostegno, saranno tra di loro eguali.

Sia il cilindro retto $A B$ (Fig. LVI.), la cui base $D B$, e l'altezza $A B$; e sia un altro cilindro. la di cui altezza $C B$ sopra la stessa base $D B$. Dico, che le

potenze E, F dalle quali applicate a' punti A, C, si mantengono i detti cilindri eretti, e perpendicolari all'orizzonte, sopra il sostegno B, d'intorno a cui senza il ritegno di dette potenze, si potrebbero rivoltare, sono tra di loro uguali.

Imperocchè la potenza E, che col vette B A sostiene il peso A B D, sta al detto peso, come D B semidiametro della base (gravitando il cilindro sopra il centro d'essa base, cioè sopra il punto D) alla B A; ed il peso A B D sta al peso C B D, come B A a B C, ed il peso C B D sta alla forza F, che lo sostiene applicata in C, come B C a B D; dunque, per l'ugual proporzione, la forza E alla forza F sta, come B D alla stessa B D, cioè in ragione di ugualità; il che ec.

Corollario I. Per altissima che sia la colonna D B A, e conseguentemente essendo quantosivoglia pesantissima, si potrà da una piccola forza applicata all'estremo A sostenere ritta sopra un appoggio B, egualmente, che possa la medesima forza reggere qualunque piccolo pezzo D B C della stessa colonna, applicandosi a sostenerla in C. E così uno Scaffale, una Spera, un Armadio, e cose simili, che sogliono col piede posare sopra una tavola, o sul pavimento, o sopra le sue mensole, o altri ritegni, e di sopra fermarsi con arpioni, e spranghe attaccate al muro, non richiede maggior forza, per essere più al-

to, di quella che richiederebbe, se in pari base fosse più basso, ed uniformemente gravato venisse in tutte le sue parti.

Corollario II. Un uscio, o imposta di finestre, la quale si regge sopra due cardini: purchè abbia il cardine inferiore proporzionato a sostenere il peso totale di essa, potrà avere il cardine superiore di non maggior forza di quella, che si richiederebbe a sostenerne una assai più bassa; e spesso nella pratica alle porte principali de' palazzi, o delle città s'impiega in ciò soverchia mole di ferro, o moltiplicando senza necessità gli arpioni, o facendoli troppo più del dovere massicci.

Corollario III. Similmente ne' coni $A B D$, $C b d$ (Fig. LVII.) che abbiano l'uguali basi $D B$, $d b$ appoggiate a' sostegni B , b , e di altezza quantunque disuguale $D A$, $d C$, le forze E , F applicate per sostenerli alle loro cime, saranno uguali, per lo stesso raziocinio addotto in questa proposizione dal Sig. Viviani; e lo stesso vale d'altri solidi del medesimo nome, purchè sieno di tale specie di figura, che in ugual base siano proporzionali alle loro altezze: nulla importando, che qui i lati $B A$, $b C$ non sieno le vere altezze de' solidi, ma bensì gli assi $D A$, $d C$, perchè essendo appunto i lati $B A$, $b C$ obliqui alla direzione delle potenze E , F , i momenti di esse debbono corrispondere alle $D A$, $d C$, che sono i seni dell'inclina-

zione delle braccia BA , bC colle direzioni delle potenze; onde corre a cappello la dimostrazione del Sig. Viviani, anche quando si trattasse di conoidi, o sferoidi, il profilo de' quali sarebbe curvo.

Proposizione LXVI. Teor. XLIV.

Le potenze G , H (Fig. LVIII.), che sostengono eretti i prismi simili ABC , DBE , intorno i punti C , E , sono fra loro, come i pesi assoluti de' medesimi prismi.

Ciò vale ancora ne' con, piramidi, ed altri corpi simili: perchè averanno i loro centri di gravità similmente collocati nei loro assi, e però corrispondenti alle basi loro in una lontananza simile da' sostegni C , E , cioè proporzionale alle leve CB , BE , onde il momento del solido ABC uguagliando quello del peso G , ed il momento del solido DBE pareggiando quello del peso H , sarà il primo momento al terzo, come il secondo al quarto; sicchè la ragione composta della ragione de' pesi de' solidi ABC , DBE , e di quella delle distanze de' centri loro di gravità da' sostegni C , E , sarà uguale alla ragione composta di questa de' pesi G , H , e delle distanze CB , BE ; tolte adunque dall'una, e dall'altra parte le ragioni uguali delle di-

stanze de' centri di gravità, e delle distanze $C B$, $E B$, in cui operano i pesi G , H , rimarrà la ragione de' pesi de' solidi $A B C$, $D B E$ uguale a quella de' pesi, ovvero potenze G , H . Il che si dovea dimostrare.

Proposizione LXVII. Quesito XXIII.

Sia $A B$ (Fig. LX.) minima lunghezza, ed $A C$ diametro della base d'un cilindro, che fitto a squadra in un muro, si spezzi dal proprio peso: e sia un'altra lunghezza data O di un altro cilindro; Cercasi, quanto dovrà essere il diametro della sua base, acciocchè tal cilindro sia prossimo a spezzarsi dal proprio peso?

Prendasi qualunque punto D , e si giungano le $D C$, $D A$, $D B$, e prolunghinsi in infinito: e nel triangolo $A D B$ adattisi la $F G$ parallela alla $A B$, ed eguale alla data lunghezza O , e prolunghisi in H , e per i punti D , C passi una parabola, la di cui cima sia D , e tangente $D A$, e seghi la $G H$ in E . Dico $E F$ essere il diametro della base, che si cerca.

Imperocchè il momento della resistenza del cerchio, il cui diametro $C A$, nel cilindro, che ha la lunghezza $A B$, al momento della resistenza del cerchio, che ha

per diametro $E F$, nel cilindro della lunghezza $F G$, per la prop. 4 è sempre in triplicata ragione di $C A$ ad $E F$. Ma il momento del peso del primo al momento del peso del secondo cilindro, per la prop. 23. è in duplicata ragione de' rettangoli per l'asse $C A B$, $E F G$: ovvero $C A D$, $E F D$; cioè in duplicata ragione delle $C A$, ed $E F$, e nella duplicata delle $A D$, $D F$; la quale per cagione della parabola è la medesima colla semplice di $C A$ ad $E F$, che aggiunta alla duplicata delle medesime compone la ragione altresì triplicata di $C A$ ad $E F$. adunque il momento della resistenza $C A$ al momento della resistenza $E F$ sta come il momento del peso del cilindro $C A B$ a quello dell'altro cilindro $E F G$; e però se il primo uguaglia il terzo, ancora il secondo uguaglierà il quarto. Il che ec.

Corollario I. Quindi si può dedurre, che ancora i cilindri fatti da rettangoli $D F E$, $D A C$, circoscritti al trilineo parabolico $D E F$, e girati d'intorno alla retta $D A$, che tocca la parabola nella sua cima D , sarebbero di ugual resistenza, posto che fossero fitti colla base in un muro.

Corollario II. Anzi la stessa tromba parabolica, nata dalla rivoluzione del trilineo $E C D F$ attorno la detta tangente $D F$, sarebbe d'ugual resistenza, come nella prop. 56. si è avvertito, perchè le

sue parti essendo proporzionali a' cilindri circoscritti, e col centro di gravità altresì proporzionalmente distante dalla sua base, si manterrebbe la medesima proporzionalità de' momenti de' pesi di esse, co' momenti delle resistenze nelle loro basi, appunto come avviene, pel corollario precedente, ne' cilindri circoscritti.

Proposizione LXVIII. Quesito XXIV.

Sia AB (Fig. LX.) diametro, e B C lunghezza minima d'un cilindro, che fitto in un muro a squadra pel proprio peso si spezzi; e sia nel triangolo ABD applicata la EF parallela ad AB , che sia il diametro della base, o grossezza d'un altro cilindro dell'istessa materia. Cercasi, quale dovrà essere la sua lunghezza, acciocchè si riduca indifferente, e prossimo allo spezzarsi pure dal suo proprio peso.

Colla cima D , ed intorno al diametro DBF , descrivasi la parabola DCG , che passi pel punto C ; imperocchè prolungata EF in G , sarà la FG contenuta nella semiparabola la cercata lunghezza. Congiungasi DC , e si prolunghi, siccome ancora la FG in H . BC ad FG sta, come FG ad FH , per lo lemma 24. de motu aequabili del Torricelli.

Sumo di più facile, e di più breve riuscita, il dimostrare altrimenti questa proposizione, che l'indovinare, come prosegue la sua dimostrazione il Sig. Viviani; che però diremo in questa maniera. Il momento della resistenza nella sezione A B del cilindro A B C, al momento della resistenza nella sezione E F del cilindro E F G, sta per la prop. 4. come il cubo A B al cubo E F; ma il momento del peso del primo al momento del peso del secondo cilindro essendo in ragione composta della duplicata di A B ad E F, e della duplicata di B C ad F G (per la prop. 23.) che per la natura della parabola è la medesima colla semplice di B D a D F, cioè di A B ad E F, la quale aggiunta alla duplicata di esse linee, forma la triplicata delle medesime, è altresì come il cubo A B al cubo E F; dunque i momenti delle resistenze delle basi sono proporzionali a' momenti de' pesi de' cilindri; onde se il momento del peso del primo cilindro uguaglia quello della sua resistenza, ancora il momento del peso del secondo cilindro uguaglierà il momento della resistenza sua. Il che cc

Corollario Lo stesso, che si è detto de' cilindri, vale de' coni, conoidi paraboliche, emisferoidi, ed altri solidi, il cui centro di gravità divida l'asse proporzionalmente.

Proposizione LXIX. Teor. XLV.

Se sarà, come il quadrato della prima A (Fig. LXI.) al quadrato della seconda B, così la terza C alla quarta D; così la quinta E alla sesta F; il biquadrato della prima A al biquadrato della seconda B sta, come la quinta E alla sesta F.

Si faccia, come la C alla D, così A alla G; sarà dunque il quadrato A al quadrato B, come la A alla G; e però le A, B, G sono tre continue proporzionali. Si trovino le altre due continue H, I, e perchè il biquadrato di A al biquadrato di B sta come la prima A alla quinta I; e la prima A alla quinta I sta, come il quadrato della prima A al quadrato della terza G (che è media fra le A, ed I) cioè come il quadrato della C al quadrato della D, (essendosi fatto il lato A al lato G, come il lato C al lato D) cioè come la E alla F, per supposizione: adunque il biquadrato di A al biquadrato di B sta, come la linea E alla linea F; il che ec.

Ovvero propongasi così in questi termini.

Proposizione LXX. Teor. XLVI.

Se il quadrato della prima al quadrato della seconda starà come la prima alla terza: e come il quadrato della prima al quadrato della terza, così la quarta alla quinta; sarà il biquadrato della prima al biquadrato della seconda, come la quarta alla quinta.

Poichè essendo il quadrato della prima al quadrato della seconda, come la prima alla terza, saranno la prima, la seconda, e la terza continue proporzionali. Si prendano l'altre due continue A, B (Fig. LXII) nella medesima proporzione. Sarà il biquadrato della prima al biquadrato della seconda, come la prima alla B; cioè come il quadrato della terza (perchè la prima, e la terza, e la B sono continue proporzionali) cioè come la quarta alla quinta, per supposizione. Adunque ec.

Proposizione LXXI. Teor. XLVII.

Se nella parabola C A S (Fig. LXIII.) il di cui asse è C X, sarà C B la tangente della cima, e la B A V parallela all'asse; e delle applicate I N, N M sia media proporzionale N L; siccome delle

O R, R Q sia media R P; e similmente delle S X, X V sia media X T, e così sempre: i punti L, P; A, T saranno in una parabola biquadratica.

Si applichi A Z al punto A, la quale nel parallelogrammo A C sarà uguale alla retta O R; dunque, come A Z a P R, così P R ad R Q; e perciò sarà il quadrato della prima A Z al quadrato della seconda P R, come la terza linea A Z alla quarta R Q; ma il quadrato della terza A Z al quadrato della quarta Q R, sta come la quinta linea C Z alla sesta R C; dunque per la prop. 69 starà il biquadrato della prima A Z, al biquadrato della seconda P R, come la quinta C Z alla sesta R C; e ciò sempre, dovunque sia condotta la O R; adunque la linea C P A è la parabola biquadratica; il che ec.

Si potea forse più speditamente dimostrare l'intento così. C Z a C R, ha doppia proporzione di A Z a Q R; ma A Z a Q R di nuovo ha proporzione doppia di quella, che ha A Z a P R; dunque C Z a C R ha proporzione quadrupla di A Z a P R; e per tanto Z C ad R C sta come la quarta potestà, cioè il biquadrato di A Z alla quarta potestà, cioè al biquadrato di P R; onde C P A, è parabola biquadratica; il che ec.

Proposizione LXXII. Teor. XLVIII

I momenti de' conì, e piramidi simili A B C, D E C (Fig. LXIV.) fuor del muro, resultanti da' pesi d' essi conì, e dalle leve B C, E C, sono fra loro, come i biquadrati delle lunghezze B C, E C.

Trovate le C F, C G, C H continue proporzionali, dopo le B C, E C: il momento del cono A B C, al momento del cono D E C averà la proporzione composta di quella del peso assoluto A B C al peso assoluto D E C (cioè del cono A B C al cono D E C, che è quanto dire del cubo B C al cubo C E, ovvero della prima B C alla quarta C G) e della leva B C alla leva C E, cioè della C G alla C H. Ma ancora la B C alla C H ha proporzione composta delle medesime B C, C G, e C G, C H; dunque il momento A B C al momento D E C sta, come la prima B C alla quinta C H, cioè come il biquadrato B C al biquadrato C E; il che si dovea dimostrare.

Corollario. La scala de' momenti di questi conì, o piramidi sta nelle linee E M, B N terminati alla parabola C M N biquadratica, della quale sia la cima C.

Chiamasi dal nostro Autore in questo luogo, ed in molti altri appresso *Scala di momenti, di pesi, o di resistenze*, una fi-

gura piana, che colle sue ordinate tra di loro parallele, e tirate perpendicolarmente ad una retta in ogni suo punto, dimostri colle dette ordinate la proporzione de' momenti, o de' pesi, o delle resistenze, che in detti punti si trovano; come nel nostro proposito, essendo $B N$ ad $E M$, come il biquadrato $B C$ al biquadrato $C E$, cioè come il momento del cono $A B C$, al momento del cono $D E C$, dovunque sia tirata la $M E$ parallela a $B N$, dicesi la figura $B C M N$ (che è una parabola biquadratica) la scala de' momenti di questi coni.

Proposizione LXXIII. Teor. II.

De' coni, o piramidi simili fitti nel muro orizzontalmente uno solo è quello, che gravato dal proprio peso appunto si spezza: ed ogni più corto riceve aggiunta di peso oltre al proprio; ogni più lungo è troppo grave.

Il momento della resistenza $A B$ al momento della resistenza $D E$ sta, come il cubo $A B$ al cubo $D E$ per la prop. 4 cioè come il cubo $B C$ al cubo $E C$, o pure come la prima $B C$ alla quarta $C G$; ma si è provato nell'antecedente, che il momento del peso $A B C$ al momento del peso $D E C$ sta, come la prima $B C$ alla quinta $C H$; adunque
Galileo Galilei. Vol. IX. 21

se il momento $A B C$ pareggia la resistenza $A B$, il momento $D E G$ non pareggia la resistenza $D E$, ma sarà tanto minore, quanto la $C H$, misura di detto momento, è minore della $C G$, misura della resistenza: o pure, quanto il cono, o piramide $D C E$ è più corto dell' $A B C$.

Proposizione LXXIV. Teor. L.

I momenti de' cunei $B D I$, $E G I$ fuori del muro, risultanti da' pesi assoluti di essi, e dalle leve $D I$, $G I$, sono fra loro come i cubi delle lunghezze fuori del muro, $D I$, $G I$.

Prendansi le $I L$, $I M$ continue proporzionali dopo le $D I$, $G I$. E perchè il momento del cuneo $B D I$ al momento del cuneo $E G I$ ha proporzione composta del peso assoluto $B D I$ al peso assoluto $E G I$ (cioè della base $C D I$ alla base $H G I$, o pure del quadrato $D I$ al quadrato $G I$, che è quanto dire della linea $D I$ alla $L I$) e della leva $D I$ alla $G I$ cioè della $L I$ alla $I M$; e la $D I$ alla $I M$ ha pure la proporzione composta delle medesime $D I$ ad $L I$, ed $L I$ ad $I M$; adunque il momento del cuneo $B D I$ al momento del cuneo $E G I$ sta, come la $D I$ alla $I M$, cioè come il cubo $D I$ al cubo $I G$; i quali sono i cubi delle lunghezze loro; il che ec.

Corollario. *La scala de' momenti di questi cunei sta nelle linee GP , DQ , terminate alla parabola cubica IPQ , la cui cima è in I .*

Proposizione LXXV. Teor. LI.

Un solo di questi cunei è quello, in cui il momento del proprio peso paragona quello della sua resistenza: e degli altri i più corti ricercano altro peso, ed i più lunghi sono troppo gravi.

Imperocchè il momento della resistenza BD (Fig. LXV.) al momento della resistenza EG per la prop. 3 sta, come il quadrato CD al quadrato HG , cioè come il quadrato DI al quadrato GI , che sono i quadrati delle lunghezze, e pure come la linea DI alla LI ; ma si è provato nella precedente, che il momento del peso BDI al momento del peso EGI , è come la linea DI alla MI ; dunque se la DI sarà misura della resistenza di BD , ed anche misura del momento di BDI , la LI sarà misura della resistenza EG , e la minore MI sarà misura del momento del peso EGI ; sicchè per pareggiare la resistenza EG gli manca tanto momento, quanto la LI M ; e però non solo ec. Il che si dovea dimostrare.

Corollario I. Se il cuneo DB il massimo, che possa reggersi col suo peso contro la resistenza della sua base, ogni altro più corto, come EGL potrà oltre il proprio peso reggerne un altro K , il quale stia al peso di tutto il cuneo BDI , come un terzo del rettangolo DGI sta al quadrato DI . Imperocchè si è veduto nella proposizione, che il momento, il quale manca al momento del cuneo EGL per pareggiare la resistenza della sua base EG , sta al momento del cuneo EGL , come LM ad MI ; ovvero (per la proporzionalità delle linee) come DG a GI , cioè come il rettangolo DGI al quadrato GI ; sia il momento suddetto, che manca per pareggiare la resistenza EG quello, che avrebbe il peso K pendente in I , il quale sarebbe uguale al momento del triplo di K posto nel centro di gravità del cuneo EGL che dista dalla base, cioè dal sostegno FG per un terzo di GI (ciò che è noto accadere nel triangolo della faccia del cuneo HGI) essendo così le distanze reciproche de' pesi; e però il momento del triplo di K posto nel centro di gravità del cuneo EGL al momento del peso di esso cuneo (il quale s'intende altresì applicato nel medesimo centro) o pure il triplo di K al peso del cuneo stesso, sta come il rettangolo DGI al quadrato IG ; ma il peso del cuneo EGL , al peso del cuneo BDI sta, come il triangolo HGI al

triangolo $C D I$, cioè come il quadrato $G I$ al quadrato $D I$; dunque per l'uguaglià sarà il triplo di K al peso del cuneo $B D I$, come il rettangolo $D G I$ al quadrato $D I$: e conseguentemente il solo peso K (da appendersi in I per uguagliare col peso del cuneo $E G I$ la resistenza della sua base) sta al peso del cuneo $B D I$ (il quale col proprio peso uguagli la resistenza della sua base) come un terzo del rettangolo $D G I$ al quadrato $D I$.

Corollario II. Onde i pesi, che potranno aggiugnersi all'estremo di questi cunei minori del massimo $B D I$, sono tra loro, come i rettangoli $D G I$ fatti da' segmenti della lunghezza $D I$.

Corollario III. E conseguentemente tra' cunei minori quello è capace di reggere maggior peso di tutti, che è di lunghezza suddupla del massimo; perchè di tutti i rettangoli $D G I$ fatti dalle parti della linea $D I$, il maggiore è quando il punto G cade nel mezzo appunto della $D I$.

Corollario IV. E perchè cadendo il punto G nel mezzo di $D I$, il rettangolo $D G I$ (che è il quadrato della metà di $D I$) è un quarto del quadrato $D I$, un terzo del rettangolo $D G I$ sarà allora un dodicesimo del quadrato $D I$; onde veniamo in cognizione, che il maggior peso, che reggere si possa da questi cunei attaccato al loro termine è la dodicesima parte

del peso, che aver potrebbe il cuneo; se fusse tanto lungo, che col suo peso equilibrasse la resistenza della sua base.

Proposizione LXXVI. Teor. LII.

I momenti del conoide parabolico fitto nel muro, ed allungato, ora in A B C (Fig. LXVI.) ed ora in D E C, risultanti da' proprj pesi, e dalle lunghezze F C, O C, sono tra loro come i cubi delle medesime lunghezze.

Poichè il momento di B A C al momento di E D C ha proporzione composta del peso assoluto A B C al peso assoluto E D C, cioè del conoide al conoide, o pure del quadrato dell'altezza F C al quadrato dell'altezza C O, cioè (prese le C G, C H continue proporzionali dopo le F C, C O) della linea F C alla terza C G: e della leva F C alla leva O C, cioè della C G alla C H; ma anche la F C alla C H ha proporzione composta delle medesime linee F C, C G, e C G, C H; dunque come F C a C H, cioè come il cubo F C al cubo C O, così il momento del conoide A B C al momento del conoide D E C; il che si dovea dimostrare.

Corollario. La scala del momento di questi conoidi è parimente la parabola cubica C P Q.

Assume l'Autore in questa dimostrazione, come cosa nota, che il conoide AB C al conoide DCE stia, come il quadrato FC al quadrato CO . Il che è chiaro, per essere i cerchi AB , DE proporzionali a' quadrati de' raggi AF , DO , cioè (per la natura della parabola) all'alttezze FC , CO , o pure all'ordinate in un triangolo fatto sulla base AF coll'altrezza FC ; e però il conoide, ed il detto triangolo sono grandezze proporzionalmente analoghe. Sicchè essendo i triangoli tagliati con linee parallele alla base, proporzionali a' quadrati dell'alttezze, ancora ne' conoidi parabolici, segati co' piani paralleli alla base, dee seguire il medesimo.

Proposizione LXXVII. Teor. LIII.

Uno solo è il conoide parabolico, che pareggi col suo peso la propria resistenza.

Il momento della resistenza di AB al momento della resistenza DE sta come il cubo AB al cubo di DE , per la prop. 4.

Cioè presa CI media proporzionale fra le alttezze FC , OC (le quali essendo proporzionali a' quadrati AB , DE , ed ancora a' quadrati FC , CI , danno AB a DE , come FC a CI) sarà il momento della resistenza AB al momento della resistenza DE , come il cubo FC al cubo

C I; ma il momento del peso A B C al momento del peso D E C sta, come il cubo F C al cubo C O, per l'antecedente; dunque se il momento della resistenza A B viene uguagliato dal momento del peso A B C, il momento poi della resistenza D E non potrà pareggiarsi dal momento del peso D E C; ma rimarrà quello tanto superiore a questo, quanto il cubo I C supera il cubo O C, ovvero quanto il cubo A B supera il cubo D E; onde unico sarà quel conoide, il quale col proprio peso uguagli la sua resistenza.

Corollario. Quando il conoide A B C fusse precisamente abile col suo peso ad uguagliare il momento della resistenza A B, se la porzione della lunghezza O C sarà tale, che il cubo della intera F C sia quadruplo del cubo della O C, potrà il conoide D E C oltre il suo peso sostenere il massimo, che sia possibile: essendo allora maggiore la differenza de' cubi I C, O C, che sia mai in altro caso possibile.

Proposizione LXXVIII. Quesito XXV.

Perchè un legno disteso orizzontalmente con maggiore facilità si pieghi, ch'essendo inclinato: e qual proporzione si trovi in diverse inclinazioni.

Un legno inclinato A B (Fig. LXVII.) più difficilmente si piega, e si rompe, che quando è disteso orizzontalmente, in ragione di A B a B C. Non però qualsivoglia peso abile a piegare un legno, può ancora spezzarlo, imperocchè un legno torcendosi viene tirato con minor forza, di quel che sia stando disteso orizzontalmente, per essere tirato con direzione ad angolo ottuso.

Certamente, se il legno A B, disteso fusse orizzontalmente, tutta la sua lunghezza A B servirebbe di leva, che appoggiata a' termini A, e B sarebbe forzata dalla potenza applicata nel mezzo F, secondo la direzione F D, che allora sarebbe perpendicolare all'orizzonte. Ma venendo lo stesso legno appoggiato col termine B al pavimento C B, e col termine A al muro C A, si scorcia la leva, e diventa della sola grandezza C B, che è la distanza perpendicolarmente frapposta a questi termini d'appoggio; e per questa ragione ben dice il Sig. Viviani, che in questo sito più difficile sia il piegare il legno; appunto in proporzione di A B a B C, che sono le leve adoperate dalla potenza nell'uno, e nell'altro caso. Ma circa allo spezzare il medesimo legno, parmi che oltre la considerazione della leva più corta, vi sia ancora maggior sezione, e conseguentemente maggiore resistenza da superare; perchè spingendo all'ingiù, se il legno di-

ateso fusse orizzontalmente, si farebbe la
 rottura nella sezione DF perpendicolare
 alla lunghezza d'esso legno: ma essendo
 obliquo, e volendo pure spingere diretta-
 mente abbasso (purchè i termini A , e B
 stessero fermi, sicchè una simil pressione
 non facesse smucciare il legno coll'estremo
 B per CB , e coll'estremo A per AC)
 ne seguirebbe lo spezzamento nella sezione
 FE perpendicolare all'orizzonte, ed obli-
 qua alla lunghezza di esso legno: la quale
 sezione è maggiore della prima in ragione
 di FE ad FD ; onde per la prop. 3
 cresce il momento della resistenza in pro-
 porzione del quadrato FE al quadrato ED ,
 che per la similitudine de' triangoli DFE ,
 CBA è la stessa colla ragione del
 quadrato AB al quadrato BC ; sicchè
 aggiungendoci la difficoltà, che dipende
 dallo scorciamento della leva, la quale
 cresce di nuovo in ragione di AB a BC :
 pare che se ne dovrebbe inferire, che
 cresca la difficoltà dello spezzamento in
 proporzione del cubo AB al cubo BC .
 Ma per illustrare meglio questo punto, si
 dovrebbe considerare la direzione d'ambi i
 sostegni B ed A , la quale non è la mede-
 sima, come quando disposti sono nella
 stessa linea orizzontale, e però ciò dareb-
 be campo a molte particolari speculazioni,
 alle quali per ora non posso applicare,
 avendo altre occupazioni alla mano, per
 cui ne vengo distratto.

Proposizione LXXIX. Quesito XXVI.

Sia qualunque solido A B, (Fig. LXVIII.) il quale sostenuto in qualsivoglia punto C, interposto fra gli estremi A, B, resti equilibrato dal peso delle sue parti, e de' pesi E, F attaccati ad essi estremi: sicchè sia in procinto di rampersi sopra l'appoggio C. Si cerca, se dovendo il medesimo solido star fitto nel muro, fino allo stesso punto C, di maniera, che l'una, o l'altra solamente delle sue parti, cioè A C, ovvero C B rimanesse fuori pendente in aria, vi si ricerchi lo stesso, o pur doppio peso di ciò, che prima si aveva in C A E, o in C B F, per fare che ne segua in tale stato lo strappamento?

Pare a prima vista, che doppio peso vi si ricerchi; imperocchè, mentre i pesi C A E, C B F superano la resistenza della sezione in C, è necessario, che l'uno, e l'altro abbia uguale momento, cioè che si equilibrino d'intorno al punto C, prima che ne segua la rottura; di maniera che il centro di gravità del solido, e de' pesi attaccati si ritrovi nel sostegno C; perchè qualunque volta il detto centro fosse dall'una, o dall'altra banda, come dentro la linea C A nel punto D, sareb-

be impossibile, che il solido si rompesse: mentre il centro di gravità di tutta la mole si potrebbe muovere abbasso; e però sarebbe costretto a discendere (per la prima supposizione) tirando allo ingiù il complesso del solido, e de' pesi attaccativi tutto intero, fino attanto che non incontrasse ostacolo alcuno, da cui venisse fermato. Se adunque il momento del peso C A E uguaglia il momento del peso C B F, ciò sarà lo stesso che dire, esservi d' uopo di due momenti uguali ciascuno al solo C A E, o al solo C B F, per superare la resistenza della sezione del solido in C. Quando adunque la parte C B F sarà impegnata dentro il muro, e la sola parte C A avanzerà fuori, la resistenza della sezione in C rimarrà la stessa di prima, e svanito essendo il momento del peso C B F, vi rimarrà solamente il momento del peso C A E, cioè la metà dei due momenti, che già cospiravano a fare la detta rottura; e però sarà necessario raddoppiare il momento C A E per fare che segua lo strappamento; di maniera che, se il peso E era di 100. libbre, ed il peso della parte del solido C A facea forza nell' estremo A come per libbre 20., onde tutto il momento fusse di libbre 120., pare che si dovrebbero aggiungere in A altre 120. libbre, per fare che il solido in C si rompesse.

Ma considerando meglio la cosa, ciò assolutamente non può essere, anzi si dee concludere, che lo stesso peso appunto basti in questo caso a fare lo strappamento, servendo il muro stesso per quel contrappeso C B F, che manca dall'altra parte.

L'apparente discorso addotto sul principio dal Sig. Viviani per concludere, che si ricercasse doppio peso per istrappare dal muro una di quelle parti del solido, che prima si equilibrava coll'altra sopra un sostegno posto nel mezzo d'entrambe, siccome passò per la mente al nostro Autore nella sua giovinezza; e fu poscia da lui avvedutamente corretto; così non è da stupirsi, che un altro Autore assai celebre in queste materie tacitamente supponesse ciò nella prop. 2. del lib. 2. *De resistentia solidorum*, come principio per se noto, ma è ben maraviglia, che nè meno in sua vecchiezza sapesse egli rinvenirsi dell'errore, anzi pretendesse con un simile paralogismo convincere me di grosso abbaglio commesso nel confutare la citata, con altre sue proposizioni. Veggasi il discorso di A. M. stampato in Lucca del 1714. alla pag. 47. ove supponendo, che un peso posto in C (Fig. LXIX.) si equilibri colla resistenza della base A E d'un prisma A C M fitto nel muro, ne raccoglie, che se il prisma staccato dal muro si ponesse in bilico sopra la linea F P posta nel mezzo del prisma, lo

stesso peso rimanente in C averebbe oramai la metà sola del momento di prima (il che sin qui è verissimo) e che però uguaglierebbe *la metà della resistenza* della sezione N O P F (uguale all' altra A B E D) onde supponendosi un altro peso attaccato al termine D, uguale a quello che era in C, si verrebbe ad equilibrare *l'altra metà della detta resistenza*; sicchè tra tutt' e due si equilibrerebbero colla medesima intera resistenza della sezione suddetta N O P F. Il che (con sua buona pace) non è vero altrimenti. Perchè l' altro peso attaccato in D, equilibrerà bensì il solido, sicchè non trabocchi dall' altra banda per l' azione del peso posto in C, ma non saranno già sufficienti tutti due que' pesi insieme ad equilibrare la resistenza O F, con mettere in procinto il solido di rompersi su l' appoggio P F. Essendo perciò necessario, che siccome il peso posto in C colla distanza C F ha solo la metà del momento, che aveva prima colla distanza C D, per vincere alla sua parte la resistenza della sezione; così nello stesso punto C, alla distanza C F si ponga un peso doppio di prima (ed altrettanto poi dall' altra banda in D) perchè giunga ad avere ciascuno d' essi dalla sua parte un momento uguale alla resistenza da superarsi: nulla giovando, che l' altro peso uguale al primo si ponga dall' altra parte in D, dove non è d' ajuto a tirare dalla banda di C, ma solo fa una

parte di quell' azione , che prima faceva il muro , quando vi era impegnato , dentro il solido , come acutamente ha avvertito in questo luogo il Sig. Viviani. Perchè in somma (come dico nella parte terza della mia risposta Apologetica, confutando il suddetto discorso cap. 5. n. 6.) l' effetto dello strappare un solido sempre ha da dipendere da due forze contrarie , delle quali l' una tiri per un verso , l' altra o tenghi forte dal canto suo , o tiri dalla banda opposta , sicchè non tutte le parti del solido si muovono verso le stesse bande , secondando l' impressione della forza attaccatavi.

Il che , a mio credere , dipende da questo , che la stessa coerenza delle parti del solido è cagionata da certe forze (qualunque elle sieno , o si riferiscano all' interna disposizione , ed intralciamento delle parti della materia , quinci e quindi contigue alla sezione , o provengano dalla pressione del fluido ambiente , o derivino da qualsivoglia glutine interposto) le quali premono l' una contro dell' altra , spingendo questa parte contro di quella , e quella viceudevolutamente contro di questa : appunto come due Lottatori , affrontatisi con ngual forza , si urtano e si sostengono reciprocamente , mantenendosi uniti ; onde per disgiungerli , non basta , che alquante forze si applichino per distaccare l' uno , se intanto altre forze uguali non accorrono a tener fermo l' altro , o a ritirarlo indietro

dalla lotta; altrimenti quello de' competitori, a cui niuna forza si applicasse, per tenerlo fermo, o per rimuoverlo dal contrasto, seguitando ad urtare il compagno, si lascierebbe trasportare a seconda dalla piena di quelli, che applicati fussero a ritirare l'altro dal duro cimento. E così è verissimo, che il muro, in cui sta fitto un solido, equivale appunto ad un contrappeso, che equilibrasse l'azione dello stesso solido, o de' pesi attaccativi, se in vece d'essere impegnato immobilmente nel muro, fusse posto in bilico nella stessa sezione: essendo che esso muro caricando la porzione del solido, che tanto o quanto entra dentro di esso, la ferma, e gl'impedisce di muoversi al movimento dell'altra parte del solido, che resta al di fuori; onde se l'azione di essa, e de' pesi aggiuntivi prevale alla coerenza delle fibre, che connettono una parte coll'altra, ne segue lo strappamento, e la separazione di questa da quella.

Proposizione LXXX. Quesito XXVII.

Se il cilindro A B (Fig. LXX.) fitto nel muro è bastante a spezzarsi in B, cioè a superare la resistenza B col proprio peso, e colla leva A B: aggiungendo dall'altra parte altrettanto cilindro B C, si

cerca , se la medesima resistenza B venga violentata con doppia forza ; e se per ispezzarsi col sostegno in mezzo , voglia essere la metà più sottile , o di lunghezza media proporzionale tra A B , e B D metà di A B ?

Secondo il Galileo , è manifesto che B C ugualmente grosso , ed ugualmente lungo di A B , tiene in equilibrio lo stesso A B , e tutte due insieme pareggiano la stessa resistenza della sezione B , che veniva pareggiata dal solo A B fitto nel muro colla sua testata B , mentro dice espressamente pag. 77. della presente edizione. *Il cilindro , che gravato dal proprio peso sarà ridotto alla massima lunghezza , oltre alla quale più non si sosterebbe , o sia retto nel mezzo da un solo sostegno , o da due nell'estremità , potrà essere lungo il doppio di quello , che sarebbe fitto nel muro , cioè sostenuto in un sol termine.* Ed il dubbio del Sig. Viviani resta di già risoluto da lui medesimo nella prop. antecedente , osservando , che quando A B è fitto nel muro , lo stesso muro fa la forza dell'altro contrappeso B C , di momento pari a quello della porzione B A , che sporge fuori del muro ; onde nell'uno e nell'altro caso la resistenza B è violentata dalla medesima azione di due forze uguali , e contrapposte ; ed è giusto , come se un filo si attaccasse coll'estremo suo ad un muro , e dall'altro

capo si tirasse fino ad essere in procinto di romperlo; o pure da un capo, e dall'altro si applicassero due forze opposte per istrapparlo, che sempre l'effetto dipenderebbe dalla stessa quantità di forze applicate, non giammai tutte da una banda, ma sempre parte da un capo, e parte dall'altro.

Circa poi il dover essere la lunghezza del cilindro posto in bilico tale, che ciascuna delle sue parti sia media proporzionale tra la AB , e la BD metà di essa, come accenna il nostro Autore; ciò si verifica, quando debba il cilindro appoggiarsi a due sostegni posti negli estremi, come avvertì Monsù de la Hire nella prop. 126. delle sue meccaniche; ma non già nel caso, che reggere si debba sopra un sostegno posto nel mezzo; ma anzi nè meno quando si regga da due bande, qualora venga caricato ancor per di sopra, e fortemente impegnato il cilindro dall'una, e dall'altra parte nel muro: nel qual caso è verissima la sentenza del Galileo di sopra accennata; conforme dissi nella mia risposta Apologetica pag. 123.

Che se alcuno bramasse la dimostrazione di ciò, che di sopra ho detto con Monsù de la Hire, acciocchè non nasca verun dubbio dalle opposizioni fattemi in contrario, quando nel luogo citato abbracciai quella dottrina, eccomi pronto a soddisfare.

Sostengasi il cilindro $A C$ sopra il sostegno corrispondente al suo mezzo B , equilibrato, ed in procinto di rompersi nella sezione B : e sia la lunghezza $E F$ d'un altro cilindro ugualmente grosso, appoggiato a due sostegni ne' termini E, F , media proporzionale fra tutta la $A C$, e la metà sua $A B$ (onde conseguentemente, dividendolo per mezzo in G , sarà la $G E$, ovvero la $G F$, media proporzionale tra la $A B$, e la sua metà $B D$). Dico che questo con uguale momento, verso la resistenza della sezione di mezzo G , rimarrà precisamente sopra i detti sostegni appunto equilibrato.

Imperocchè essendo la metà del peso $A C$, cioè il peso di $A B$, applicato nel suo centro di gravità D , e l'altra metà $B C$ nel suo centro H , per far forza sopra la resistenza della sezione B ; e similmente reggendosi la metà del peso $E F$ dal sostegno E , e l'altra metà dal sostegno F , colle distanze $G E$, $G F$ medie proporzionali fra le lunghezze $A B$, $B D$; sarà $A B$ ad $E G$, cioè la metà del peso $A C$ alla metà del peso $E F$, come reciprocamente la distanza $E G$ alla distanza $D B$, dalle quali dipendono; e però saranno uguali i loro momenti. Si dirà lo stesso dell'altre due metà d'ambi i pesi, applicate similmente a rompere l'uguali resistenze B, G ; adunque averà la stessa forza il cilindro A

C sopra la resistenza B, che il cilindro E F sopra una pari resistenza G: quando sia E G media tra l'intera A C, e la sua metà A B. Il che si dovea dimostrare.

Nè sarebbe ragionevole l'opporre, che la metà del peso E F, cioè E G penda dal sostegno E con una distanza uguale alla metà di E G; dove sarebbe il centro di gravità del cilindro E G, e non da tutta la E G, come si è supposto nell'addotta dimostrazione; perchè tutto il peso del cilindro E F gravitando nel suo centro G, è manifesto, doversi immaginare ambidue le metà di esso ivi raccolte nel punto G, e non altrimenti distribuite, sicchè l'una graviti nel punto di mezzo fra G ed E, e l'altra nel punto di mezzo fra G ed F, come accaderebbe se fossero staccate, e non connesse in G, che se la coerenza delle parti non le richiamasse tutte in un centro comune, ognuna dell'infinite parti, che il cilindro compongono, dovrebbe esercitare la sua forza in un centro particolare, e distinto, e non cospirerebbero tutte a maniera d'un solo peso, siccome fanno, avanti d'essere staccate l'una dall'altra.

Ma perchè la cosa è di grandissima importanza, nè manca chi ha preteso di oscurare la verità con apparenti ragioni, acutamente inventate per difendere il suo impeto, ed incaricare me di gravissimo sba-

glio, non sarà se non bene lo scoprire la fallacia di chi (Discorso di A. M. pag. 55.) francamente asserisce, che le due metà d' un cilindro, o prisma appoggiato ne' suoi estremi *non hanno per leve favorevoli, se non le metà delle lunghezze*, che sono dal mezzo a ciascun termine del solido, ed aggiugne (pag. 56.) che il peso di un cilindro allora solamente tutto si raccoglie, ed esercita la sua energia sul proprio centro di gravità, *quando pende in aria liberamente, senza esser retto da alcun sostegno*; ma quando è appoggiato ne' suoi estremi a due sostegni, *i quali vengono a scemarli la metà del suo peso, l'altra sua metà sola viene ad esercitare la sua forza nel centro di gravità*. Nella quale dottrina erronea molti sbagli si contengono, essendo cosa impossibile, *che un peso penda in aria, senza esser retto da alcun sostegno*; e però non farebbe mai forza un solido nel suo centro di gravità, se non in caso, che miracolosamente pendesse in aria senza che alcuna cosa il reggesse; nè essendo vero, che i sostegni *scemino la metà del peso d' un solido*, che sia appoggiato, onde gli rimanga solamente *l'altra metà da esercitarsi nel centro di gravità*; imperocchè i due sostegni reggono tutto il peso, e da esso con vicendevole azione sono premuti, di maniera però che mezzo il peso si appoggi all' uno, e mezzo all' altro, senza verun dispendio dell' azione della gra-

vità da esercitarsi appunto nel mezzo, dove è il centro del solido, con tutto il suo momento, il quale non viene diminuito, ma bensì equilibrato con azione contraria da' sostegni; altrimenti ne seguirebbe, che siccome al parere di questo Autore un solido appoggiato a due sostegni pesa nel centro per la metà sola della sua gravità; appoggiandosi poi a 4. ovvero 6. sostegni, dovrebbe premere con un quarto, o con un sesto solo della gravità sua; e sostenendosi sopra l'orlo d'un corpo stabile equivalente ad infiniti sostegni, non dovrebbe premere più per niente; e così un cavallo, che si regge su quattro piedi, un palco eretto sopra sei pilastri, una cupola d'ogn'intorno appoggiata sul cornicione, che la circonda, non dovrebbero aggravare nel centro loro, se non per una parte quarta, sesta, o infinitamente piccola del loro gran peso. Il che se è assurdo, si conclude, che i sostegni non iscemano adunque in conto alcuno la gravità de' solidi, nè impediscono, che non l'esercitino tutta nel centro loro: come forse meglio potrà intendersi colla seguente costruzione.

S' intenda sospeso il cilindro D F (Fig. LXXI.) con due fili D A, F B perpendicolari all'orizzonte, i quali passando per due troclee fisse per di sopra sieno tirati da' due pesi I, K abili ad equilibrarsi col medesimo solido D F; sarà certamente ciascun d'essi pesi uguale al peso della me-

tà del cilindro, e tutti e due insieme uguali al totale peso $D F$. E perchè in ogni equilibrio di forze contrapposte, ed ugualmente distanti dal centro del moto, come accade in questo caso, mercè le suddette troclee, fra i pesi K , ed I da una banda, ed il cilindro $D F$ dall'altra, conviene che ugualmente preme dal suo canto la forza, che tira da un canto, e l'altra, che tira dall'altro lato: egli è pure evidente, che il cilindro $D F$, con tutto che sia retto in ambi gli estremi, dovrà premere nel centro di gravità E con tutta la forza del suo peso, siccome li due contrappesi I , K con tutta l'energia del peso loro, uguale a quello del cilindro $D F$ premono altresì dal canto suo, ed è vanità l'immaginarsi, che il peso $D F$ per la metà sia sostenuto, e solo per l'altra metà graviti; ora lo stesso accade, se rotti i fili $D A$, $F B$, o rimossi i contrappesi I , K , si lascia posare il cilindro $D F$ sopra due sostegni sottoposti all'estremità: i quali sostegni lo spigneranno all'insù, e lo reggeranno, appunto come prima faceano i suddetti fili, ed i contrappesi attaccativi; e ciò senza impedire punto l'azione della totale gravità di esso cilindro, la quale si eserciterà come prima nel centro E con tutto il suo momento.

Del che per avere ancora più chiara idea si consideri, che la forza, d'onde dipende la coerenza delle fibre d'un solido, (come si è detto di sopra) dee essere se-

condo la direzione dell'asse del cilindro, che passa per tutti i centri di gravità delle sue sezioni: e che questa forza opera con due direzioni direttamente opposte, calcando una sezione contro l'altra contigua. Immaginandosi adunque la detta forza, che tiene unite le fibre del solido nella sezione E, rappresentarsi dalla linea DF, di cui la parte FE ci esprima l'azione che spinge da F verso E; e la parte DE ci figuri l'altra contrapposta azione, che ugualmente preme viceversa da D verso E, queste due forze essendo uguali, e direttamente opposte, si equilibrano; sicchè in virtù di esse le parti del cilindro stanno unite, movendosi di conserva, quando da una sola forza, quale sarebbe la gravità, venissero tirate al basso per la direzione EG, la quale non si oppone a veruna delle dette direzioni FE, DE, ma è loro indifferente. Ma essendovi di più due forze, che spingono al contrario di EG, come sono i contrappesi I, K, o in vece d'essi i sostegni D, F, da' quali viene retto il cilindro, per ritrovare ciò che risulterebbe da queste azioni, si faccia, come la forza, che premendo da F verso E contribuisce alla resistenza del cilindro, sta alla forza del sostegno F. ovvero del contrappeso K, così EF ad FB; e compiendo il rettangolo EFBH, si avrà nel diametro FH la forza composta da ambedue, come è notissimo a' Meccanici, e da

me fu dimostrato nell' *Epistola de momento gravium* pag. 13. e similmente dall'altra forza, che concorre alla resistenza della sezione E per la direzione D E, e dalla forza del sostegno D, o del contrappeso I, nella direzione D A, si comporrà la forza D H, che risulta da entrambe; e finalmente compiendo il parallelogrammo D H F G, si averà nel diametro G H la forza composta delle due F H, D H, cioè delle G D, G F; alla quale forza G H debbe essere uguale la forza del peso esercitato dal cilindro D F (o da un peso avventizio G sospeso in E, quando si astragga dal peso d'esso cilindro) mercecchè debbe contrastare alla detta forza, eludendone l'effetto coll'azione contraria nella direzione H G; e però il peso esercitato dal cilindro F D (o dal peso G surrogato in vece d'esso) nel centro E starà alla forza esercitata da ciascuno di detti sostegni (come F, o dall'equivalente contrappeso K) come H G ad F B, cioè ad H E, e però la detta forza di peso esercitata in E sarà dupla della forza del contrappeso K, o del sostegno F; sicchè essendo (come mostra la sperienza a chi non si appaga della ragione) il peso K una metà del peso totale del cilindro D F, dovrà esso cilindro esercitare nel centro E una forza uguale a tutto il suo peso: e similmente il peso G che (astraendo dalla gravità del cilindro) si dovesse a tale effetto in E sur-

rogare, essere dovrebbe uguale a tutto il peso d'esso cilindro, come io avea detto, e non alla sola metà, come pretende il censore.

Una sola opposizione di qualche momento mi fu fatta da un chiaro Geometra; ed è che se un cilindro $A D$ (Fig. LXXII.) è sostenuto ne' termini A, D per impedire la gravitazione di esso nel centro C , basterebbe sottoporvi il sostegno C , il quale ivi si opporrebbe all'azione della gravità del cilindro esercitata in C ; ma il sostegno C , dovendo reggere la metà della parte $C D$, e la metà dell'altra parte $C A$, non dovrà sostenere, se non la metà dell'intero cilindro $A D$; adunque pare, che la pressione esercitata da esso cilindro nel centro C non possa essere se non uguale alla metà del peso $A D$.

A ciò risposi, che primieramente il discorso proverebbe, che in qualsivoglia punto B fuori del centro C del cilindro, operi la gravità di esso colla metà sola della sua azione; perchè similmente collocando un sostegno B per sostenerne la forza, questo si troverebbe carico della metà di $B D$, e della metà di $B A$, cioè della metà di tutta la $A D$; e però in ogni luogo il cilindro premerebbe colla metà del suo peso, quando presso a' sostegni non può avere azione così sensibile.

In secondo luogo conviene avvertire, che quando si sottopone il sostegno C al

mezzo del cilindro A D, ciascuno de' sostegni estremi A, e D viene sollevato dal peso, che prima sorreggeva, essendo che prima ognuno d'essi sosteneva la metà del cilindro A D, ed ora solamente ne reggono un quarto per uno: cioè al D tocca una metà del cilindro C D, ed all' A una metà dell' A C, gli altri due quarti rimanendo appoggiati al sostegno C; d'onde si deduce, che il sostegno C non regge altrimenti tutta l'azione, che il cilindro A D esercitava in C, ma la divide in due ugualmente; sicchè quindi innanzi tutta la parte A C graviti nel mezzo fra A, e C; e tutto il resto graviti nel mezzo fra C, e D, come se fossero due cilindri divisi; e per tanto ciò nulla serve per provare, che in C, avanti che si ponesse il sostegno, gravitasse il cilindro colla metà del suo peso, piuttosto che col peso totale di se stesso.

Proposizione LXXXI. Quesito XXVIII.

Sia il cilindro grave A E (Fig. LXIII.), sostenuto fuori del mezzo in G. Cercasi il peso, che si dee attaccare in E, acciocchè la parte B E del cilindro faccia equilibrio coll' altra parte A G.

Si faccia, come la leva B C alla B A, ovvero come il peso B E al peso B D,

così il peso B D ad un altro, dal quale si cavi il peso B E; e dell' avanzo si prenda la metà F, che questa sarà il peso, il quale attaccato in E, colla parte B E equilibrerà l'altra parte B D.

Imperocchè tal momento ha il peso F attaccato in E, quanto averebbe il doppio di esso attaccato nel mezzo di G E (per essere così i pesi reciprochi alle distanze) dove pure s'intende che faccia forza nel suo centro di gravità il peso della parte B E; siccome il peso dell'altra B D fa forza nel mezzo della D G; dunque, in caso d'equilibrio, debb' essere, come B C a B A, o come il peso B E al peso B D, così B D all'aggregato di B E, e del doppio di quel peso, che dee a tale effetto attaccarsi in E; e però il peso da attaccarsi in E è la metà di ciò, che rimane, cavando dal detto peso quarto proporzionale, il peso B E, come dice il Sig. Viviani.

Proposizione LXXXII. Quesito XXIX.

Sia il cilindro grave A B (Fig. LXXIV.), orizzontale sostenuto fuori del mezzo della sua lunghezza, come in E; è chiaro, che la parte maggiore A E prepondererà. Cercasi, per mantenerlo orizzontale quanto peso si dovrà sospendere nell'estremità B.

Sia B D metà della lunghezza B C , e facciasi come B E ad E D , così il peso di tutto il cilindro A B , al peso F , che questo sarà il cercato da sospendersi in B .

Poichè di tutto il cilindro A B il centro di gravità è nel mezzo , cioè in D ; e del peso F il centro di gravità è sospeso in B ; adunque il centro comune di gravità del cilindro , e del peso F sarà in quel punto , che divide la distanza dei centri in reciproca proporzione de' pesi . Ma si fece , come il cilindro A B al peso F , così B E ad E D ; adunque in E sarà l'equilibrio . Il che ec .

Questa è la stessa colla precedente , ma ho stimato bene di aggiungerla , per l'ingegnosa , ed elegante maniera adoperata nel dimostrarla , con provare , che così il centro comune di gravità del cilindro , e del peso attaccato corrisponde al luogo del sostegno E ; onde non potendo questo muoversi allo ingiù , è forza che il tutto stia fermo in equilibrio , a tenore della terza supposizione .

Proposizione LXXXIII. Quesito XXX.

Per lo contrario , se un peso F sarà attaccato all'estremità d'un cilindro , come A B , cercasi in qual punto della sua lunghezza si debba sottomettere un soste-

gno, in modo che, stando il cilindro orizzontale, si faccia l'equilibrio?

Dividasi CB per mezzo in D , e facciasi, come il peso del cilindro AB al peso F , così BE ad ED , che il punto E sarà il cercato, e si dimostrerà come sopra, perchè i detti pesi sono sospesi con i loro centri di gravità in distanze reciproche dal sostegno E ; che però ec.

Corollario I. Se dunque il peso F da appendersi all'estremità B , sarà dato uguale al peso del cilindro AB , si dovrà mettere il sostegno E in tal luogo, che la lunghezza CE sia tripla della BE ; perchè divisa per mezzo CE in D , sarà allora la EB uguale alla ED ; ma per la precedente proposizione, facendosi come BE ad ED , così il peso AB al peso F , questo è quello, che debbe appendersi in B , acciocchè si equilibri col dato cilindro nel sostegno E : adunque il peso AB è uguale al peso F .

Corollario II. E se vorremo, che il peso AB al peso F abbi una data proporzione di GB a BH , sarà necessario dividere la BD in modo, che la EB alla ED abbia la proporzione di GB a BH ; ed il punto E sarà il sostegno.

Corollario III. Ma se vorremo mettere il sostegno in luogo, che poi tanto pesi la parte del cilindro BE , quanto il solido F ; dovrà dividersi la DB in modo, che il rettangolo di tutta la CB nel-

la parte di mezzo D E, sia uguale al quadrato B E, perchè allora sarà, come D E ad E B, così il peso F al peso A B, ovvero così E B alla C B; ma come E B alla C B, così il peso di B E allo stesso peso A B; adunque tanto pesa F, che B E.

Corollario IV. E se vorremo, che il peso F pesi tanto, quanto la parte C E: si dovrà segare la D B in E in modo, che il rettangolo di tutta la C B nella parte di mezzo D E sia uguale al rettangolo C E B; perchè allora sarà, come C B a C E, così E B a D E; ma C B a C E sta come il peso A B al peso A E, ed E B a D E sta come lo stesso peso A B al peso F, quando si fa l'equilibrio; adunque i pesi A E, ed F sono uguali.

I due problemi supposti dal Sig. Viviani nel corollario 3. e 4. si sciolgono nella seguente maniera.

Data una retta C B (Fig. LXXV.) (fig. 1. divisa per mezzo, o più generalmente divisa in qualsivoglia proporzione) nel punto D: talmente di nuovo segarla in E, che il rettangolo di C B in D E uguagli il quadrato di E B.

Alla retta C B si applichi un rettangolo eccedente d'una figura quadrata, ed uguale al dato C B D; e sia questo C I B; ed alla B I pongasi uguale la B E; poichè dunque il rettangolo C B D, cioè i due C B E, e C B in D E, uguale ugua-

gliano il rettangolo $C I B$, cioè la somma del rettangolo $C B I$, e del quadrato $B I$, ovvero i due $C B E$, e quadrato $B E$; tolto di comune il rettangolo $C B E$, sarà $C B$ in $D E$ uguale al quadrato di $E B$; il che *de.*

Ma se data la retta $C B$ (fig. 2. divisa per mezzo) o in qualsivoglia ragione in D , si vorrà dividerla altrove in E in maniera, che il rettangolo di $C B$ in $D E$ uguagli il rettangolo $C E B$.

Alla retta $C B$ si ponga per diritto la $C I$ uguale ad essa; ed alla retta $I B$ si applichi un rettangolo uguale al dato $C B D$, mancante però d'una figura quadrata; e sia questo rettangolo $I E B$. Adunque il rettangolo $C B D$, cioè la somma de' rettangoli $C B E$, e $C B$, in $D E$, uguaglia il rettangolo $I E B$, che è quanto dire i due rettangoli $I C$ in $E B$, e $C E B$; tolgansi da questa, e da quella parte i rettangoli $C B E$, ed $I C$ in $E B$, che sono uguali, rimarrà $C B$ in $D E$ uguale al rettangolo $C E B$. Il che *ec.*

Proposizione LXXXIV. Teor. LIV.

La scala de' momenti di pesi uguali G, D (Fig. LXXVI.) attaccati ad una libra sostenuta ne' suoi estremi A, B , sta nelle linee $E G, F H$ della parabola $A H B$,

parallele al diametro ; essendo la libra A B base di detta parabola.

Imperocchè i detti momenti sono , come i rettangoli A E B , A F B , fatti dalle parti di essa libra , come dimostra il Galileo nella proposizione 13. Ma a questi rettangoli sono proporzionali le linee G E , H F tirate nella parabola parallele al diametro. Dunque ec.

Proposizione LXXXV. Teor. LV.

Le resistenze d'un cilindro ne' punti A , B , C , D , E ; L , (Fig. LXXVII.) ec. sono come le linee A 1 , B 2 , C 3 , D 4 , E 5 ec. terze proporzionali dopo l'applicate nella parabola , e nel parallelogramma circoscritto , equidistanti al diametro.

Poichè la resistenza in A alla resistenza in C sta , come il rettangolo G C F al rettangolo G A F , secondo il Galileo , cioè come la linea C H alla A 1 , cioè come C O a C 3 , ovvero come A 1 a C 3 ; dunque se la resistenza A si ponga essere la A 1 , la resistenza in C sarà la C 3 ; e così dell' altre ; il che ec.

E perchè la linea 1 2 3 4 non corre mai colla retta G 8 , di qui è manifesto , che le resistenze verso il punto G vanno crescendo sempre , facendosi mag-

Galileo Galilei Vol. IX. 23

giori di qualunque data forza, e nel punto G volervi forza infinita, perchè la linea G B, che è terza proporzionale dopo il punto G, e la linea G M, è infinita:

Nota la curva 1 2 3 4 è una iperbola seconda.

Molte sono le curve, che possono meritare il nome di *seconda iperbola*; però non avendo il Sig. Viviani dichiarato particolarmente il suo pensiero, non sarà superfluo l'esaminare in questo luogo, come verificare si possa il suo detto, acciocchè alcuno ingannato non rimanga, pensando ch'egli intenda dell'*iperbola quadratica*, che più comunemente per *seconda iperbola* viene computata: quella cioè, in cui i quadrati delle ordinate ad un asintoto, sono reciprocamente come le porzioni d'esso asintoto tagliate dal centro: e pure di quella, in cui i quadrati dell'ordinate ad un diametro fossero come i parallelepipedi contenuti dal quadrato d'una parte, e dalla lunghezza dell'altra parte d'esso diametro intercette fra detta ordinata, ed i termini del trasverso; o in somma d'altra curva, che abbia più manifesta relazione, ed analogia coll'iperbola ordinaria, che non ha veramente la curva in questo luogo descritta.

Si osservi per tanto, che il profondo, e celebratissimo Matematico d'Inghilterra il Cav. Isaccò Nevvton, nel trattato che stampò delle linee del terz'ordine, acutamente

notò, potersi dividere le iperbole in più generi, secondo il numero degli asintoti, che ad esse potevano convenire, dicendo: *Hyperbola primi generis duas habet asymptotos, ea secundi tres, ea tertii quatuor, et non plures habere potest, et sic in reliquis.* Quindi si rifletta, che continuando la descrizione della curva proposta dal nostro Autore, con adattare la stessa costruzione alla parabola prolungata per di sotto, prendendo le $c\ 3$, $c\ 3$ (Fig. LXXVIII.) da per tutto terze proporzionali alle $c\ h$, $c\ o$; dal che si vede, che oltre la parte superiore $3\ 1\ 5$ della curva, che giace fra due asintoti paralleli $G\ 8$, $F\ 9$, ne nascono due altre parti, o gambe inferiori $3\ 3$, $3\ 3$, alle quali, oltre i suddetti due asintoti continuati, si aggiunge per terzo asintoto la $G\ F$ prolungata; e però, secondo la distribuzione fatta dal suddetto Nevvton, si riconosce questa curva per un' *iperbola del secondo genere*; ed è appunto quella, che da lui si descrive per la specie sessagesima, e si asserisce essere un *iperbolismo della iperbola*, che in ordine è il quarto: intendendo per iperbolismo la figura nata dall'applicare il rettangolo contenuto dall'ordinata di una sezione conica, e di una data retta, alla porzione comune tagliata nel diametro da uno de' suoi termini. Come nel nostro caso, essendo l'iperbole opposte E , A e, il cui asse trasverso sia A , ed il secondo asse conjuga-

to sia uguale a ciascuna delle rette AG ; AF ; e presa qualunque ordinata dell'iperbola DE , si faccia come AD a DE , così AI a $D3$ (e similmente nell'opposta sezione, come Ad a de , così Aa a $d3$) la figura 13 , coll'altre sue parti 33 quindi nate, chiamasi dal Nevvton *iperbolismo dell'iperbola*, ed è la sessagesima specie dell'iperbole del secondo genere.

Ora questa non essere altra, che la curva sopra descritta dal Sig. Viviani, si dimostra così. Essendo il quadrato AD al quadrato DE , come il quadrato AI al quadrato $D3$, cioè al quadrato AC ; ed il quadrato DE al rettangolo IDA essendo nell'iperbola, come il quadrato del secondo diametro AG al quadrato di AI : sarà per l'ugualità perturbata, il quadrato AD al rettangolo IDA , come il quadrato AG al quadrato AC ; e per la conversione di ragione, il quadrato AD al rettangolo DAI (cioè la retta DA , o pure 3 alla AI) sarà come il quadrato AG al rettangolo GCF , che nella parabola è appunto, come la AI alla CH ; onde la $C3$ è terza proportionale dopo le due CH , AI , secondo la costruzione del Sig. Viviani; e per tanto la curva da lui qui descritta è la medesima con questa specie di seconda iperbola considerata dal Nevvton.

È manifesto, che il lato retto dell'iperbole IE , Ae è lo stesso con quello della

parabola $G I F$, cioè la terza proporzionele dopo le due $I A$, ed $A G$.

Proposizione LXXXVI. Teor. LVI.

Sia il prisma triangolare $A B N$ (Fig. LXXIX.), di cui la faccia rettangola $A N$ sia parallela all'orizzonte, e sia sostenuto sopra l'estremità $O A, C N$; e sia il peso I nel mezzo della leva $A C$, che pareggi la resistenza della sezione di mezzo $B E$; e l'altro peso L fuori del mezzo, che pareggi la resistenza della sezione $F G$; Dico che tali pesi assoluti I, L hanno tra di loro la proporzione delle parti disuguali $C H, H A$.

Poichè inteso in H il peso M uguale ad I , essendo il momento del peso L uguale al momento della resistenza $F G$, ed il momento I pareggiando il momento della resistenza $B E$, sarà il momento di L al momento di I , come il momento della resistenza $F G$, al momento della resistenza $B E$, cioè per la prop. 3. come il quadrato $F H$ al quadrato $B D$, o pure come il quadrato $A H$ al quadrato $A D$, cioè al rettangolo $A D C$; ma il momento I al momento M , per la prop. 84. sta come il rettangolo $A D C$ al rettangolo $C H A$; dunque per l'ugual proporzione, il momento di L al momento di M , cioè

il peso assoluto di L al peso assoluto di M, ovvero al peso assoluto 1, sta come il quadrato A H al rettangolo C H A: cioè come la linea A H alla H C; il che si dovea dimostrare.

Proposizione LXXXVII. Quesito XXXI.

Si cerca la scala, che dimostri, con quale proporzione vadano scemando dal mezzo D i pesi assoluti, che pareggiano le resistenze di varie sezioni nel suddetto prisma triangolare.

Prolungata la B D (Fig. LXXX.), si faccia ad essa uguale la D Q, e intorno al triangolo A B C facciasi il rettangolo A S P C, e con gli asintoti P S, P C, pel punto Q descrivasi l'iperbola Q A, che necessariamente passerà per A (essendo il rettangolo S D uguale al B C, cioè al D R, ed aggiunto di comune B C riuscendo tutto lo S C uguale a tutto il B R, e però i punti Q, A essendo nella medesima iperbola, riguardante gli asintoti S P R) e similmente con gli asintoti S A, S P descrivasi per lo stesso punto Q l'iperbola Q C, che pure passerà (per la stessa ragione) per C. Dico, che l'applicate D Q, H X, L V., E G ec. sono le misure de' pesi assoluti O, N, M, ec. che pareggiano i momenti delle sezioni D

B, H F, L I ec. Imperocchè uguagliandosi i rettangoli, per esempio, A P, X P: tolto di comune H P, sarà il rettangolo S H uguale al rettangolo H Z, onde A H ad H C (cioè per il precedente, il peso N al peso O) sarà come X H ad H et, cioè a D B, o pure a D Q; onde in dette linee X H, D Q sta la proporzione dei pesi N, O; e però l'iperbola descritta è la scala, che si cercava.

Proposizione LXXXVIII. Teor. LVII.

Sia il prisma parabolico A B C (Fig. LXXXI.), di cui la base rettangola A G sia parallela all'orizzonte, e sia sostenuto nell'estremità A C; e sia inteso segato con due piani paralleli B D, E F retti alla base. Dico, che i pesi assoluti H, I, che pareggiano i momenti delle resistenze B D, E F, sono tra loro, come le medesime sezioni B D, E F, o come l'altezze B L, E M delle medesime sezioni.

Poichè immaginato un peso N eguale ad H, ed appeso in M F, e presa la M O terza proporzionale delle B L, E M; essendo che il momento di N al momento di H sta, come il rettangolo C M A al rettangolo C L A, cioè (per la prop. 84.) come la linea E M alla B L; ed il

momento di H al momento di I , sta come il momento della resistenza $B D$ al momento della resistenza $E F$ (pareggiandole) cioè, come il quadrato dell'altezza $B L$ al quadrato dell'altezza $E M$ (per la prop. 3.) o pure come la prima $B L$ alla terza $M O$; adunque per l'ugual proporzione, il momento di N al momento di I sta come la $E M$ alla $M O$; cioè come la $B L$ alla $E M$; ma il momento di N al momento I sta come il peso assoluto di N al peso assoluto di I , cioè come il peso assoluto di H al peso assoluto di I ; adunque il peso assoluto di H al peso assoluto di I sta come $B L$ ad $E M$, che sono l'altezze delle sezioni, o come la medesima sezione $B D$ alla sezione $E F$; il che ec.

Corollario. Quindi è chiaro, che la scala de' pesi, che spezzano tal solido, sta nelle linee applicate parallele al diametro della stessa parabola $A B C$.

Proposizione LXXXIX. Teor. LVIII.

Siano le due parabole $A B D$, $C B D$ (Fig. LXXXII.) sopra la stessa base $B D$, e con gli assi uguali $A D$, $C D$ posti in dirittura, e sia la superficie $A B C$ la faccia anteriore di un solido prismatico, che abbia l'opposta faccia simile, ed

uguale alla stessa $A B C$; il quale solido sia posato sopra il sostegno D posto nel mezzo della linea $A C$; ed i pesi E, F nell'estremità $A C$ attaccati sieno tra di loro uguali, e pareggino la resistenza della sezione $B D$. Dico, che se lo stesso solido fosse altrove appoggiato, come in G , e che i pesi I, L posti nelle stesse estremità, e fra di loro equilibrati, pareggiassero la resistenza della sezione $G H$, sarebbe il peso I uguale al peso E , ovvero all'altro F .

Imperocchè pareggiandosi da' pesi I , ed L la resistenza della sezione $G H$, ed equilibrandosi nelle distanze $A G, G C$, sopra il sostegno G , secondo ciò che si è concluso nella prop. 79. lo stesso peso I pareggerebbe dal suo canto la resistenza della medesima sezione $G H$, quando la sola parte $H G A$ sporgesse fuori del muro; ma il peso, da cui si pareggia in tale stato la resistenza della sezione $G H$, è il medesimo, ovvero è uguale a quello, che pareggerebbe la resistenza dell'altra sezione $B D$, quando $B D A$ sporgesse fuori del muro, per la famosa proposizione del Galileo circa il prisma parabolico: ed allora lo stesso peso E (per la proposizione 79.) pareggerebbe la stessa resistenza $B D$; adunque il peso I è uguale al peso E , ovvero al peso F . Il che ec.

Proposizione XC. Teorema LIX.

Poste le medesime cose, si dimostrerà, che l'aggregato de' pesi E, F, i quali si equilibrano d'intorno al sostegno D colla resistenza D B, all'aggregato de' pesi, I, L, i quali si equilibrano d'intorno ad un altro punto G colla resistenza G H, sta reciprocamente, come la parte maggiore G C alla D C, che è la metà di tutta la A C.

Imperocchè per l'equilibrio starà L ad I, come A G a G C; e componendo, L ed I insieme sta ad I, come tutta la A C alla C G; ma I è uguale ad E, di cui il doppio sarebbe l'aggregato de' pesi E, F; dunque starà I al detto aggregato dei pesi E, F, come D C ad A C; e per l'uguaglià perturbata, sarà l'aggregato dei pesi I, L, all'aggregato de' pesi E, F, come D C a C G; onde convertendo, è manifesta la verità di quanto si era proposto. Il che ec.

Corollario. Se intenderemo lo stesso solido appoggiarsi a' due sostegni posti nei termini A, C; è manifesto che il peso, il quale equilibrerebbe la resistenza B D, essendo appeso nel mezzo di A C in D, sarebbe uguale appunto a' due pesi E, F; ed il peso, che posto altrove, come in G

uguaglierebbe la resistenza GH , dovrebbe altresì pareggiare l'aggregato de' pesi I , L ; per la qual cosa, il peso abile precisamente a rompere il detto solido in D , al peso che fusse sufficiente a romperlo in G , starà come CG a DC .

Proposizione XCI. Teor. LX.

Nel cuneo, o prisma triangolare ABH (Fig. LXXXIII.), sostenuto in A , B , e segato per mezzo in D , ed altrove in C ; il peso abile a spezzare in C al peso abile a spezzare in D sta, come la parte BC alla CA .

Stendasi la sezione DG in E , fino che l'altezza DE sia uguale alla CF . Dunque il peso abile a spezzare la sezione CF a quello, che è abile a spezzare l'ugual sezione DE , sta secondo il Galileo, come il rettangolo BDA al rettangolo BCA , ed il peso abile a spezzare la sezione DE a quello, che spezzerebbe la sezione DG , sta (per la prop. 3.) come il quadrato DE , cioè il CF , al quadrato DG ; ovvero come il quadrato BC al quadrato BD , cioè al rettangolo BDA ; dunque, per l'uguaglianza perturbata, il peso abile a spezzare la sezione CF a quello, che è abile a spezzare la DG , sta, come il quadrato CB al

rettangolo B C A , cioè come la B C alla C A . Il che ec.

Corollario. Il peso abile a spezzare in C F al peso abile a spezzare in M L sta, come il rettangolo di B C in A M al rettangolo di A C in M B , ovvero è in ragione composta di B C ad A C , e di A M ad M B ; perchè il peso equivalente alla sezione C F a quello , che equivale alla sezione M L , ha ragione composta dell'equivalente alla sezione F C all'equivalente alla D G , e di questo all'equivalente alla M L ; ma la prima ragione è , come di B C ad A C , e la seconda è come di A M ad M B , per questa proposizione ; dunque i pesi equivalenti alle sezioni C F , M L sono in ragione composta delle dette proporzioni ; o pure sono come il rettangolo di B C in A M al rettangolo di A C in M B ; il che ec.

Proposizione XCII. Teor. LXI.

Nel cuneo parabolico I B A (Fig. LXXXIV.) il peso equivalente alla resistenza della sezione C F al peso equivalente alla resistenza della sezione D G , sta come il quadrato della media proporzionale B H tra B C , e B D , al rettangolo B C A .

Si stenda D G in E , sicchè la sezione D E sia uguale , e di pari altezza alla

C F; dunque il peso equivalente alla sezione **C F** all'equivalente alla sezione **D E** sta reciprocamente, come il rettangolo **B D A** al rettangolo **B C A**; ma il peso equivalente alla **D E** a quello, che pareggerebbe la **D G** sta, come il momento della resistenza **D E** a quello della **G D**, cioè per la prop. 3. come il quadrato **D E**, ovvero **C F**, al quadrato **D G**, o pure come la **C B** alla **B D**, o come il rettangolo **B C A** al rettangolo di **B D** in **C A**; dunque per l'ugual proporzione il peso equivalente alla sezione **C F** all'equivalente alla **D G** sta, come il rettangolo **B D A** al rettangolo di **B D** in **C A**; cioè sta, come **D A** a **C A**; e quando il punto **D** fusse nel mezzo della retta **B A** (come tacitamente qui suppone il Viviani, in coerenza di ciò, che espressamente ha supposto nell'antecedente) sarà il primo peso al secondo, come **B D** a **C A**, o come **C B D** a **B C A**, o come il quadrato della **B H**, media tra **B C**, e **B D**, al detto rettangolo **B C A**; ma generalmente la proporzione del peso, che rompe in **C** a quello che rompe in **D**, è, come **D A** a **C A**, come si è mostrato; ed è per accidente, che essendo il punto **D** nel mezzo si possa in vece della **D A** prendere la **D B**, e cavarne la proporzione di sopra enunziata dal nostro Autore.

Proposizione XCIII. Quesito XXXII.

In questi solidi cuneiformi, ed in altri su questo andare, cercare le sezioni di minor resistenza, se ve ne sono; o quelle d'ugual resistenza, se in diversi punti vi si ritrovano.

Nel cuneo triangolare, e nel parabolico di sopra considerati non vi è altrimenti sezione alcuna, che dir si possa di minima resistenza; e nè meno due sezioni ugualmente resistenti assegnare si possono; essendo sempre le sezioni più vicine alla testata del cuneo di maggior resistenza, che le più vicine al taglio del medesimo; ed il simile avviene in qualsivoglia sorte di cuneo, che generato fusse da alcuna dell' infinite parabole, o iperbole riferite al suo diametro; siccome ancora ne' cunei semicircolari, o semiellittici, come con simile progresso si può dimostrare.

Proposizione XCIV. Teor. LXII.

Nell' emisfero, o emisferoide A B C (Fig. LXXXV.), che sia col piano orizzontale sostenuto nell' estremità A C, si dimostrerà, che i pesi assoluti H, I, dai

quali si pareggiano le resistenze delle sezioni $B D$, $E F$ rette al piano $A C$, e tra di loro parallele, sono, come l'altezza delle simili sezioni $B L$, $E M$.

1. Poichè, prese le $M O$, $M G$ continue proporzionali dopo le $B L$, $E M$, e considerato il peso N uguale ad H appeso in M , sarà il momento di N al momento di H : come il rettangolo $C M A$ al rettangolo $C L A$, cioè come il quadrato $E M$ al quadrato $B L$ (nel mezzo cerchio, o mezza ellisse $A B C$) cioè come la linea $M O$ alla $B L$; ed il momento di H al momento di I sta, come la resistenza della sezione $B D L$ alla resistenza della sezione $E F M$ (pareggiandole per ipotesi) cioè come il cubo $B L$ al cubo $E M$ (per la prop. 4) o pure come la prima $B L$ alla quarta $M G$; adunque per l'ugual proporzione il momento di N al momento di I sta, come la $M O$ alla $M G$, cioè come la $B L$ alla $E M$; ma il momento di N al momento I sta come il peso assoluto di N , cioè come il peso assoluto H al peso assoluto I ; adunque detti pesi sono come l'altezza delle sezioni corrispondenti. Il che ec.

Proposizione XCV. Teorema LXIII.

Nel prisma parabolico, sostenuto come si vede in M , N (Fig. LXXXVI.), pa-

reggi il peso E il momento di resistenza della sezione $A B$, e sia qualunque altra sezione $C D$. Dico, che un altro peso F , uguale all' E , pareggerà il momento di resistenza della sezione $C D$; cioè, che detto prisma è da per tutto di eguale resistenza.

Poichè il momento di E al momento di F sta, come il rettangolo $M I N$ al rettangolo $M L N$, cioè come $G I$ alla $H L$ (mercè della parabola $M G H N$.) o pure come i loro doppi $G B$, $H D$; cioè, per la prop. 2. come il momento delle resistenze nelle sezioni $A B$, $C D$; e permutando il momento del peso E al momento della resistenza $A B$ sta, come il momento del peso F al momento della resistenza $C D$; ma il momento E pareggia la resistenza $A B$, adunque anche il momento F pareggia la resistenza $C D$; e però questo prisma è ugualmente resistente per tutto. Il che era da dimostrarsi.

È chiaro dal contesto, essere le figure $M G N$, $M B N$ due parabole uguali fatte sopra la base comune $M N$, e colle cime rivoltate alla banda opposta; e che però il cuneo parabolico, di cui parla il Galileo, mostrandolo ugualmente resistente, quando si sporga fuori del muro a qualsivoglia lunghezza (quale sarebbe il solido $I G H N P C A E$, se il punto G fusse la cima della parabola $M G N$, ed il punto A dell'opposta $Q A P$, e se collocato fusse col

rettangolo $E A G I$ orizzontale, e coll'altro $E I N P$ stesso fitto nel muro verticale; e qual ancora sarebbe, raddoppiandolo il solido $M G N P A Q$ similmente posto col rettangolo $Q M N P$ nel muro, sicchè le rette $Q M, P N$ fossero orizzontali) è un solido d'uguale resistenza ancora essendo sostenuto da ambi gli estremi, purchè si ponga in sito convenevole, cioè facendo giacere la parabola $M G N$ nel piano orizzontale, sostenuto negli estremi della base della parabola M, N : o si pigli il solo $Q G N P$ (che è un duplicato cuneo parabolico) o si raddoppi questo di nuovo, come ha fatto il Sig. Viviani, per maggiore stabilità, e vaghezza, nel solido prismatico $G N B M Q O P A$; sicchè è verissimo ciò che asserì il Galileo, potersi ne' travamenti delle navi levare un terzo di peso a tutte le travi, senza diminuirne la gagliardia; essendo il presente solido appunto due terzi del prisma rettangolo, che gli fusse circoscritto, e di cui tutte le sezioni fussero uguali alla $A B$. Onde questa speculazione del Sig. Viviani serve appunto a confutare la calunnia opposta al Galileo, prima da Monsù Blondello in Francia, e poi dal Sig. Marchetti in Italia, spacciando, ch'egli altamente s'ingannasse nel proporre che il suo solido parabolico fusse utile a praticarsi con risparmio di più di 33. per 100. senza dispendio di ro-

bustezza; il che sebbene non si verifica ne' solidi parabolici disposti come nelle prop. 88. 90. e 92. esaminati a tal fine dal nostro Autore, basta, che si dimostri vero nella presente situazione, che del pari è sufficiente a salvare il detto di quel grand' Uomo: oltre di che altre maniere non mancano da difenderlo in questo proposito, come si può vedere nella mia risposta Apologetica par. 1. cap. 7. n. 6. pag. 131. e seguenti.

Proposizione XCVI. Teor. LXIV.

Negli emicilindri di base circolare, o di base ellittica, come nelle figure si vede, sostenuti nell'estremità M, N (Fig. LXXXVII.). Dico pure, che se il peso E pareggia la resistenza A B, anche il peso F, uguale ad E, pareggerà la resistenza C D.

Perchè il momento di E al momento di F sta come il rettangolo M I N al rettangolo M L N cioè come il quadrato A G. al quadrato C H (per la natura del semicircolo, o della semiellisse) cioè come il momento di resistenza della sezione A B, al momento di resistenza della sezione C D, per la prop. 3. e permutando il momento di E al momento di resistenza della sezione A B, starà come il mo-

mento di F al momento della resistenza $C D$; dunque se i primi momenti si pareggiano, come vuole la supposizione, ancora i secondi saranno uguali, cioè il momento F pareggerà altresì la resistenza $C D$. Il che *ec.*

Questi appunto sono i solidi d'uguale resistenza, trovati dal Blondello, e dal Marchetti, per surrogarsi al solido parabolico del Galileo, da essi creduto incapace di adattarsi a tale effetto; ma molto prima già inventati dal nostro Autore, oltre gli altri di simile proprietà.

Proposizione XCVII. Teor. LXV.

Ancora con un mezzo cerchio, e con una semiellisse, ovvero con due semiellissi di uguale diametro orizzontale, e di diverso diametro perpendicolare, si possono avere solidi, ch'essendo sostenuti ne' loro termini, siano d'uguale resistenza in riguardo ad un dato peso collocato in qualsivoglia punto interposto fra i suoi sostegni.

Questa proposizione è solo brevissimamente accennata con un semplice sbizzo, o piuttosto intrigo di linee, da cui nulla può ricavarisi; ma credo, che il vero sentimento dell'Autore sia il seguente.

Intendasi sopra la retta orizzontale $M N$ (Fig. LXXXVIII.) l'ellisse $M A N$, ed

il semicircolo $M B N$; o pure le due ellissi diversamente alte, $M A N$, $M B N$; e si intendano alcuni prismi, o per parlare con maggiore proprietà, certe volte a mezza botte, fatti colla grossezza espressa dalle lunette $M B N A M$: sicchè la volta inferiore abbia per centina la curva $M B N$, e la superiore si termini all'altra curva $M A N$: Dico, esser queste volte solidi nel loro massiccio da per tutto d'uguale resistenza; perchè se il peso E fosse abile a sforzare la grandezza $A B$, ed il peso F uguale ad E tirasse perpendicolarmente l'altra grossezza $C D$; essendo tanto il quadrato $A G$ al quadrato $C H$, quanto il quadrato $B G$ al quadrato $D H$, nella proporzione del rettangolo $N G N$ al rettangolo $M H N$, sarà $A G$ ad $H C$, come $B G$ a $D H$; e permutando $A G$ a $G B$, come $C H$ a $D H$; e dividendo $A B$ a $B G$, come $C D$ a $D H$; e di nuovo permutando, $A B$ a $C D$, come $B G$ a $D H$; ed il quadrato $A B$ al quadrato $C D$, (cioè, per la proposizione 3. il momento della resistenza $A B$ al momento della resistenza $C D$) sarà come il quadrato $B G$ al quadrato $D H$, ovvero come il rettangolo $M G N$ al rettangolo $M H N$, cioè come il momento del peso E al momento dell'ugual peso F , secondo il Galileo; onde siccome il momento primo pareggia il terzo, così il secondo esser debbe uguale al quarto; cioè se il momento di resistenza della grossezza $A B$

è uguale al momento del peso E, altresì il momento di resistenza nella grossezza C D dee riuscire uguale al momento del peso F; e per tanto la volta da ambe le parti convessa, e concava-ellittica, o dall'una ellittica, e dall'altra circolare (purchè abbiano lo stesso asse traverso le due curvature) sarà da per tutto di uguale resistenza, in riguardo al medesimo peso, dovunque le si posi sul dosso, o venga sospeso da qualsivoglia punto della sua concavità. Il che ec.

Proposizione XCVIII. Teor. LXVI.

Se sarà la parabola A B C D E (Fig. LXXXIX.) la cui base A E, l'asse C F, e d'intorno ad essa il rettangolo G E, in cui applicandosi le rette I L, M N, O P, parallele a C F, si ritrovino tra I L, L Q due medie L S, L R; e tra M N, N B due medie proporzionali N V, N T; e tra O P, P D due medie P Z, P X; e così sempre. Dico, che i punti A S V C Z E sono in una certa curva, la quale se si rivolterà d'intorno alla base A E descriverà un solido rotondo, che sarà da per tutto d'ugual resistenza, sostenendosi negli estremi A, E.

Imperocchè il momento della resistenza nel cerchio descritto da C F, al momento della resistenza nel cerchio de;

Proposizione IC. Teor. LXVII.

La scala delle forze, o pesi da appendersi in diversi luoghi d'una leva, ed equivalenti ad una data invariabile resistenza posta nella contralleva, sta nelle linee parallele alla perpendicolare tirata dal sostegno sopra la leva, e terminate da qualunque iperbola, di cui le asintote siano la detta leva e la perpendicolare.

Sia la leva A B (Fig. LXL.) sostenuta in C, e nell'estremo della contralleva C A sia la resistenza D, che da qualsivoglia punti F, B ec. sia equilibrata dagli equivalenti pesi, o forze G, E; e nell'angolo retto B C H sia descritta qualunque iperbola L I, di cui siano asintote le linee C B, C H, e dai punti F, B siano le F I, B L, parallele all'asintoto medesimo C H. Dico, che gli equivalenti G, E sono fra loro, come l'intercette E I, B L.

Poichè essendo le forze G, ed E equivalenti alla resistenza D, sarà G a D, come la distanza A G alla C F; e D ad E, come la B C alla A C: adunque per l'uguaglianza perturbata, come G ad E, così B C a C F, ovvero F I a B L, per essere il rettangolo C B L uguale al C F I, per la proprietà dell'iperbola; se dunque F I rappresenta la misura dell'equi-

valente G, la B L rappresenta l'equivalente E, e così tutte l'altre intercette; sicchè la scala di tali forze, o pesi equivalenti sta nelle dette intercette ec.

Proposizione C. Teor. LXVIII.

La scala de' pesi d' ugal momento al momento variabile d' uno stesso peso nella leva, che successivamente muti centro, o sostegno, stante la medesima distanza de' contrappesi, è nelle parallele condotte dentro l'angolo asintotale della iperbola (ma però terminate fra la curva, ed una parallela all'asintoto.

Penda il peso I (Fig. LXXI.) dal punto D della libra D C, e con esso si equilibri il peso K, posto il sostegno in varj punti della detta libra, come in E, e. Pongasi perpendicolare a D C la E G, ovvero *e g* proporzionale al peso K, essendo D H proporzionale al peso I; sarà dunque D E ad E C, come K ad I, cioè come G E a D H; e per tutto il rettangolo E D H sarà uguale al rettangolo C E G; ed aggiunto di comune F E C, sarà il rettangolo H D C uguale al G' F B; e però i punti D, G saranno nell'iperbola D G, che riguarda gli asintoti H B, B C; e similmente, posto il sostegno *e* oltre il punto D, e fatta la stessa costruzione, saranno uguali i rettangoli *e* D H, C *e* g; i

quali tolti di comune dallo stesso rettangolo $C \sigma f$, rimarrà $H D C$ uguale al $g f B$; ed i punti D, g nella stessa iperbola, fra l'angolo asintotale $H B C$, onde se $D H$ rappresenta il peso I , le $G E, g e$ terminate fra l'iperbola, e la $D C$ parallela all'asintoto $B H$, rappresenteranno i contrappesi K equivalenti allo stesso I , posto che la libra $D C$ sia sostenuta in qualsivoglia punto E , ovvero e ; che però la scala di cotesti pesi sta nelle parallele condotte dentro l'angolo asintotale, ma determinate dalla iperbola, e dalla retta condotta parallela, ad uno degli asintoti; il che ec.

Proposizione CI. Teor. LXIX.

La scala de' momenti di tutte l'uguali linee $A B, C D, E F$ (Fig. LXII.) intercette da linee parallele: o pure di tutti i piani $A B, C D, E F$, in un parallelepipedo prisma, o cilindro ec. sta fra le linee $B G, D H, F I$, nell'angolo rettilineo $F L I$ intercette.

Questo è chiaro, perchè le grandezze $A B, C D, E F$, essendo uguali, i momenti loro sono come le distanze dal sostegno, $L B, L D, L F$: e però ancora sono proporzionali all'ordinate del triangolo $B G, D H, F I$. Il che si dovea dimostrare.

Corollario I. Quindi ancora i momenti de' pesi, o cilindri uguali $A B$, $C D$ (Fig. LXLIII.) posti in varie lontananze, e contrappesati dallo stesso invariabile momento del peso O , crescono, come le parallele tirate sotto ad un angolo rettilineo.

Corollario II. Se la cassa $A B$ (Fig. LXLIV.) sarà piena d'acqua, e s' intenderà muoversi il diaframma $K B$, sempre parallelo a se stesso, si anderà abbassando l'acqua nel continuo slontanamento di esso diaframma; ed il momento del peso di tutta la detta acqua contro il momento dello stesso contrappeso O , anderà crescendo, come le linee parallele nel triangolo $B L G$.

Perchè il peso dell'acqua sarà uguale, ed il suo momento sarà proporzionale alle distanze del suo centro di gravità dal sostegno L , ovvero come le loro duple, cioè come l' intere lunghezze $L B$, $L D$, o pure come l' ordinate $B G$, $D H$, nel detto triangolo. Il che ee.

Proposizione CII. Teor. LXX.

I momenti delle linee $D E$, $F G$, $L M$ (Fig. LXLV.) nel triangolo $A B C$, crescono, e scemano, come le linee $E H$, $G I$, $M O$ nella parabola quadratica $A I O C$, la cui base $A C$; o pure sono,

come i rettangoli $D E A$, $F G A$, $L M A$ ec.

Perchè il momento di $D E$ al momento di $F G$ (posto il sostegno in A) è in ragione composta della $D E$ alla $F G$: che è quanto dire di $E C$ a $G C$, e della distanza $E A$ alla distanza $A G$; ma di queste proporzioni si compone ancora la ragione del rettangolo $A E C$ al rettangolo $A G C$; dunque il momento $D E$ al momento $F G$ sta, come il rettangolo $A E C$ al rettangolo $A G C$, ovvero come le linee $E H$, $G I$ condotte nella parabola parallele al diametro: ed essendo similmente la ragione de' rettangoli $D E A$, $F G A$, composta di quella delle distanze $A E$, $A G$, e di quella delle grandezze $E D$, $G F$, come appunto la ragione de' momenti suddetti: è chiaro, essere i detti momenti proporzionali ancora a que' rettangoli; il che ec.

Corollario. I. Se girando il triangolo $B A C$ d'intorno il lato $A B$ ne nascerà un cono, le superficie cilindriche descritte dalle linee $D E$, $F G$ saranno altresì, come i rettangoli $D E A$, $F G A$; e però riusciranno, come i momenti delle suddette linee. Il che però è generale di tutte le figure $A B C$ sostenute in A , convenendo a qualsivoglia specie di figura, l'essere i momenti delle ordinate alla base $A C$ proporzionali a' rettangoli di dette ordinate nelle distanze dal sostegno; e conseguente-

mente alle superficie cilindriche generate da esse ordinate nel solido rotondo, che nasce rivolgendosi la figura d'intorno all'asse A B.

Corollario II. Lo stesso segue ne' momenti de' piani, o circoli D E, F G (Fig. LXLVI.) nel conoide parabolico quadratico A B C; imperocchè questi piani crescono, e scemano proporzionalmente alle linee del triangolo suddetto A B C; e però sono detti momenti misurati dalle rette E H, G I parallele al diametro della parabola fatta sopra la base A C.

Corollario III. Perchè poi la maggiore di tutte queste linee condotte nella parabola è il diametro, che corrisponde al mezzo della lunghezza del triangolo, o del conoide; quindi il massimo momento delle ordinate nel triangolo, o de' piani paralleli alla base di esso conoide è nel mezzo di tutta la lunghezza A C.

Proposizione CIII. Teor. LXXI.

La scala de' momenti di tutte le linee sottotese ad un angolo rettilineo (posto il sostegno nel detto angolo) sono, come le linee determinate dal trilineo parabolico.

Imperocchè i momenti delle linee C B, E F (Fig. LXLVII.) sono come i qua-

drati delle distanze B A , F A ; e però sono , come le rette B D , F G che ad esse corrispondono nel trilineo della parabola quadratica.

Corollario. Quindi i momenti de' rettangoli , de' prismi , de' cilindri , tirati fuori d' un muro ; ed in somma di tutte le grandezze . che sono crescenti a misura delle distanze , crescono come le linee intercette dal detto trilineo della quadratica parabola.

Proposizione CIV. Teor. LXXII.

I momenti delle grandezze , le quali crescono in ragione de' quadrati delle distanze , come sarebbero le linee intercette dal trilineo parabolico quadratico , B C , D E (Fig. LXLVIII.) ovvero i cerchi N C , M E del cono M A E , ovvero i piani di una piramide ec. sono , come le linee C F , E G intercette dal trilineo parabolico cubico E A G.

Perchè ne' momenti di tali grandezze , alla ragione di esse , la quale già si suppone duplicata di quella delle distanze , si aggiunge un' altra volta la ragione delle stesse distanze ; onde si compone la ragione de' momenti B C , D E , ovvero N C , M E triplicata della ragione A C , A E , la quale è la stessa de' cubi A C , A E , cioè delle linee C F , E G nel trilineo

della parabola cubica; onde è manifesto ciò che era proposto da dimostrarsi..

Corollario. Quindi i momenti de' triangoli simili, e de' prismi triangolari, e de' conoidi parabolici cavati fuori d'un muro, sono proporzionali alle linee del medesimo trilineo della cubica parabola; essendo queste grandezze, che crescono come i quadrati delle loro distanze dal sostegno, a cui si appoggiano, come nelle prop. 74, e 76 fu dimostrato.

Proposizione CV. Teor. LXXIII.

I momenti delle grandezze crescenti in ragione de' cubi delle distanze, crescono come le linee intercette dal trilineo parabolico biquadratico.

La dimostrazione è simile alle precedenti: aggiungendosi sempre alla ragione delle grandezze quella delle distanze, per fare la ragione de' momenti; onde generalmente si può dire che se le grandezze crescono in qualche ragione moltiplicata di quella delle distanze, i momenti vengono ad aumentarsi in una ragione sempre un grado più alta; e però le grandezze essendo come i cubi, i momenti diventano, come i biquadrati delle distanze.

Corollario. I. Quindi i momenti delle linee intercette nell'angolo cubico parabolo-

lico, crescono come le linee interposte al trilineo parabolico biquadratico.

Corollario II. I momenti de' trilinei della parabola quadratica, ovvero i momenti de' coni, e piramidi simili, cavati fuori d'un muro, sono come le dette linee sottotese all'angolo, che fa la tangente della cima colla curva parabolica biquadratica (come nella prop. 72 si è veduto)

Proposizione CVI. Teor. LXXIV.

I momenti dell' applicate DE , BC (Fig. 1c.) nella parabola quadratica ABD , sono come i cubi delle medesime DE , BC .

Imperocchè i detti momenti hanno ragione composta delle linee DE , BC , e delle distanze EA , CA , o pure (per la natura della parabola quadratica) dei quadrati DE , BC : ma ancora il cubo DE al cubo BC ha la ragione composta di quella della linea DE alla BC , e di quella del quadrato DE al quadrato BC ; dunque il momento della linea DE al momento della BC è, come il cubo DE al cubo BC . Il che si dovea dimostrare.

Corollario I. Perchè nella parabola quadratica il cubo DE al cubo BC sta, come la superficie DAE alla superficie

B A C (per la prop. 62) saranno i momenti delle dette ordinate proporzionali alle medesime superficie.

Corollario II. Che se A B D E sard un conoide parabolico quadratico, i momenti de' cerchi D E, B C saranno, come i quadrati delle distanze E A, C A ec.

Corollario III. E se fusse A B D E la parabola cubica, sarebbero i momenti delle linee D E, B C, come il biquadrato D E, al biquadrato B C ec.

Corollario IV. In tutte quelle figure piane, e solide, che dal Sig. Viviani nella prop. 61 si appellano di proporzionale aumento, cioè che al rettangolo, o cilindro, o prisma circoscritto hanno sempre una istessa determinata ragione, sempre si verifica, che i momenti dell'ordinate, o dei piani paralleli alla base, stando la figura appoggiata al sostegno nella sua cima, sono come le stesse parti della figura, che dalla cima restano tagliate dalle ordinate medesime, o da' piani paralleli alla base. Imperocchè queste porzioni di figure, come quelle che sono proporzionali a' rettangoli, o cilindri, o prismi circoscritti, sono in ragione composta di quella delle basi, e delle altezze, che sono le lontananze di dette basi dalla cima; ma ancora i momenti di esse basi, cioè delle rette, o piani paralleli, sono in ragione composta delle medesime; dunque sono proporzionali

i momenti di esse alle figure medesime tagliate dalla sua cima.

Corollario V. In tutte le suddette figure, essendo l'ordinate, o i piani paralleli proporzionali a qualsivoglia dignità delle distanze dalla cima; i momenti, che oltre la ragione delle grandezze importano un'altra volta le ragioni delle dette distanze, saranno proporzionali alle dignità di esse distanze, di un grado superiori, cioè denominate da un numero maggior di una unità di quello, da cui erano denominate le dignità delle distanze medesime, proporzionali alle ordinate, ovvero a' piani paralleli alla base nella figura, che sta appoggiata nella stessa sua cima.

Proposizione CVII. Teor. LXXV.

I momenti di tutte le linee C D, E F (Fig. c.) nella parabola quadratica A B G, sostenuta su l'appoggio A corrispondente alla base A B, sono tra di loro, come i rettangoli C D A, E F A ec.

Già ho avvisato nel coroll. 1 della proposizione 102 essere ciò generalmente vero in qualsivoglia genere di figura; onde non accade altra dimostrazione, bastando il discorso fatto in tale proposito nel luogo citato.

Galileo Galilei Vol. IX. 25

Corollario. Perchè il massimo di tali rettangoli è A H I, dove la A G talmente resta divisa in H, che la G A sia sesquialtera di A H; dunque il massimo momento sarà quello dell'applicata H I, in distanza di due terzi dalla base A B.

Che sia A H I (Fig. cr.) il maggiore di tutti i rettangoli iscritti nella parabola, essendo A G sesquialtera di A H, si prova così. Condotta per I la tangente K I L, sarà H L dupla di H G; e però sarà la stessa H L uguale ad A H, che supponevasi parimente dupla di H G; dunque il rettangolo A H I M è adattato alla metà della linea A L, mancando della figura I H L simile ad N D L, per cui mancherebbe qualunque altro rettangolo A D N applicato altrove alla stessa linea; e però, secondo Euclide, I H A M maggiore di qualunque A D N iscritto nello stesso triangolo K L A; ma A D N è maggiore di A D C iscritto nella parabola; dunque tanto più I H A M è maggiore di qualunque altro rettangolo A D C iscritto nella parabola colla larghezza A D minore, o maggiore di A H sopra determinata; per tanto il detto triangolo è il massimo di tutti; il che ec.

Proposizione CVIII. Teor. LXXVI.

I momenti de' piani C D , E F (Fig. cit.) paralleli alla base A B nel solido rotondo parabolico cubico A B G , sostenuto in A , sono come i parallelepipedi , o prismi rettangoli , che abbiano per loro basi i quadrati C D , E F , e per altezze le distanze A D , A F.

Ciò parimente si verifica in qualsivoglia solido rotondo , o piramidale , o prismatico , o d' altra maniera , che abbia per sezioni tante figure simili proporzionali ai quadrati de' diametri , o de' lati omologhi , come delle C D , E F (ed ancora quando non fossero figure simili , prendendo quadrati uguali , o proporzionali ad esse , e surrogandoli in vece de' quadrati C D , E F) alla proporzione de' quali aggiungendosi quella delle distanze A D , A F , si compone la ragione de' momenti di essi piani paralleli , uguale a quella de' parallelepipedi , o prismi rettangoli , nella proposta del Viviani enunziati.

A P P E N D I C E.

Questo è quanto si è trovato esistente nel fascetto de' fogli raccolti dal Viviani, per illustrare questa importante materia delle resistenze, sigillato col sigillo del Sereniss. Sig. Cardinale Leopoldo di Toscana, e fermato di propria mano di S. A. Reverendissima fin sotto il dì 2 Marzo 1667 ab Incarn. come raccontai nella mia risposta Apologetica parte 1 pag. 88. Nell'ordinare la quale opera, se io abbia gran fatica durato, non accade, che stia ad esagerarlo, che ben potrà il Lettore da se comprenderlo riflettendo, che si trattava di dare forma di libro ad una materia del tutto indigesta, ed abbandonata affatto dal proprio Autore, il quale, disperando di potere aver ozio sufficiente a perfezionarla, sol tanto a fine di autenticare la verità d'aver egli un tempo fa intrapresa cotal fatica, ne raccolse in fretta, e senza scelta, ed ordine veruno le cartucce, nelle quali si trovava di avere disteso alcuna cosa a tal materia attinente, e fecele dal suddetto Principe sigillare.

Come che non erano le proposizioni disposte col metodo convenevole, io le ho ridotte a quello, che ho creduto essere il migliore, e che rendeva le proposizioni

più tra di loro connesse, e dipendenti l'una dall'altra, con passare dalle cose più semplici alle più composte. Le proposizioni meccaniche attenenti a' momenti di varj pesi, disposti diversamente in varie libbre, erano dall'Autore distinte con nome di *Lemmi*; ma io, ad imitazione d'altri Matematici, le ho ridotte in ordine di Proposizioni; e solamente alcune Proposte sono state da me chiamate *Quesiti*, perchè corrispondevano ad alcune Proposte, nelle quali l'Autore non avea per anco determinata la sua sentenza, ma solo proponeva d'investigare ciò che si dovesse tenere; e l'altre indifferentemente le ho volute nominare *Teoremi*. In molte cose mi è convenuto farla più da Indovino, che da Geometra, per essere solo toccate in iscorcio le proposte, e con maniera alquanto oscura, come accade nelle cose, che notiamo per un semplice nostro ricordo, senza mettersi in pena, che possono essere intese da altri; nel che se non avrò sempre felicemente incontrato il vero sentimento dell'Autore, sarò degno di qualche compatimento. Io posso attestare con tutta sincerità d'aver sempre addotte fedelmente le sue parole, non alterandole giammai, se non molto di rado, in qualche minuzia, per rendere più chiaro, e compiuto il senso della proposta: è ben vero, ch'essendo alcune proposizioni distese in toscano, ed altre in latino (anzi taluna mezza nell'uso,

e mezza nell' altro idioma) ho stimato bene il darle tutte con uniforme stile nella nostra favella distese , senza però mai dipartirmi dal sentimento dell' Autore , e dal metodo di dimostrare da lui usato : come si può tuttavia riscontrare nell' originale : avendo a bella posta citate sempre le pagine del M. S. dove corrispondono le proposizioni di esso da me riferite ; ed avendo ancora distinto il testo di lui da ciò , che di mio vi ho aggiunto per illustrarlo ; acciocchè niuno possa prendere sbaglio in attribuire a me le profonde speculazioni da esso ritrovate , o viceversa in ascrivere a lui que' difetti , che per avventura mi saranno scorsi dalla penna. Se avesse potuto l' Autore medesimo perfezionare quest' opera , non vi ha dubbio , che l' averemmo assai più compiuta , e stesa a cose di maggiore rilievo , che non si è potuto fare dalla mia debolezza : e sopra tutto , alcune definizioni , ed alcune proposizioni , le quali ora ci pajono superflue , o non attenenti alla materia delle Resistenze , e sono come semi d' altre profonde ricerche , rimasi sterili , e senza frutto , perchè abbandonati dalla cultura di chi li piantò , allora non ci comparirebbero tanto inutili , ed inopportune al nostro proposito , ma fecondissime si troverebbero di nuove importantissime verità. Comunque sia , gradisca il Lettore queste poche notizie ripescate , alla meglio che si è potuto , dall' obliuione , in

cui giaciate sarebbero, se l'attenta cura di chi presiede alla nuova edizione dell'opere del Galileo, non rifletteva ad eseguire almeno in parte l'idea, che già ebbe il Sig. Viviani, d'arricchirle co' suoi pensieri a tal fine insieme raccolti.

E perchè nella mia risposta Apologetica parte 1 cap. 7 n. 11 oltre i solidi di uguale resistenza ritrovati dal nostro Autore, nelle prop. 48 53 55 57 58 59 60 63 95 96 97 98 ho dimostrato, come ritrovare si possano infiniti solidi d'uguale resistenza, sì nel caso, che da una parte sola siano fitti nel muro, e sì quando vengano retti in ambidue gli estremi: e tanto prescindendo dal proprio loro peso, quanto computandolo; ed ancora paragonando tra di loro, non già le parti di un medesimo solido, ma più, e diversi solidi dello stesso nome (come fa il Viviani nelle prop. 67 e 68) stimo bene di soggiungere qui tradotti dal latino i problemi da me nel citato luogo spiegati, acciocchè servano di corteggio alle suddette proposizioni del nostro Autore, le quali in queste proposte si confermano, e si ampliano a più universale applicazione, con gran vantaggio della pratica, di cui in oggi si suole far tanto caso nelle ricerche della meccanica.

Tutto l'artificio ivi esposto consiste nel considerare le sue figure, dalle quali può intendersi generato un solido: cioè quella, che esprime il suo profilo, e quella

che gli serve di pianta; come per cagione d'esempio, nel cuneo parabolico $I A B N$ (Fig. ciii.) si vede che nasce dalla parabola verticale $I F B A$, e dal rettangolo orizzontale $B A K$, moltiplicandosi le ordinate $A I$, $C F$ della prima figura, che mostra il profilo del solido coll'ordinate $A K$, $R C$ della seconda, che gli serve di pianta, onde ne provengono i rettangoli $I A K N$, $F C R M$, che sono le varie sezioni del solido: ed essendo data o la verticale figura del profilo, o l'orizzontale della pianta, si dimostra come geometricamente possa determinarsi l'altra, in maniera tale, che da ambidue ne nasca un solido di uguale resistenza, secondo le condizioni, che si ricercano; sicchè potendosi variare in infinito qualsivoglia delle due figure generatrici, a cui possiamo per avventura essere obbligati, o dalla materia stessa, che ce la porga bell'e fatta, o dal luogo, che non sia comodamente capace d'altra figura, o dall'arbitrio di chi voglia il solido di un tale determinato contorno, è manifesto, che infiniti solidi d'uguale resistenza si potranno assegnare: per non dir nulla, che quanto qui si dice de' solidi, le di cui sezioni sono tanti rettangoli, agevolmente applicare si potrebbe a' corpi, le sezioni de' quali fussero tanti rettangoli, o tante parabole di qualsivoglia grado, o tante ellissi, o in somma tali omogenee figure, che più ci piacciono, purchè sieno proporzionali a' rettangoli circoscritti.

Problema I.

Data la figura orizzontale $A F b B$ (Fig. civ.) d'una trave, che debba impegnarsi nel muro col suo termine A , ritrovare la figura verticale $A E G B$, da combinarsi coll'altra, perchè ne risulti un solido d'uguale resistenza, in riguardo al peso da attaccarsi al termine B di esso.

Condotta la linea $B F$, e tirando qualsivoglia ordinata $D L$ all'asse $A B$, che segghi $F B$ in M , si faccia, come $D L$ ad $L M$, così il quadrato di qualunque data linea $A E$, al quadrato d'un'altra $G L$, ordinata al medesimo asse nel punto L parallela ad $A E$. Dico, che i punti E, G saranno nella nuova curva $E G C$, corrispondente all'effetto, che si desidera. Imperocchè la ragione di $A F$ ad $L M$ (cioè della lunghezza $A B$ ad $L B$) sarà composta delle ragioni di $A F$ ad $L D$, e di $L D$ ad $L M$, cioè del quadrato $A E$ al quadrato $L G$; per la qual cosa, se si compariranno i rettangoli $F A E$, $D L G$, e così gli altri in simigliante maniera ritrovati, fin tanto che se ne faccia un solido, che abbia per base la data figura $A F b B$, e per profilo verticale l'altra $A E G C B$ ora determinata: questo sarà tale, che i momenti delle resistenze nello sue varie

sezioni (essendo in ragione composta delle basi $A F$, $L D$, e de' quadrati dell'altzze $A E$, $L G$) saranno proporzionali alle lunghezze tagliate dal suo termine B ; cioè a' momenti di un medesimo peso ivi attaccato: e però sarà di uguale resistenza il solido, o si appoggi nel taglio del muro sopra l'ordinata $A F$, o sopra l'ordinata $L D$ della data base orizzontale. Il che ec.

Corollario I. Se la base $A F b$ (Fig. cv.) sarà un rettangolo, cioè se l'ordinata $A F$ sarà da per tutto uguale alla $L D$, sarà il quadrato $E A$ al quadrato $G L$, come $F A$ ad $L M$; ovvero come $A B$ a $B I$; E però la curva $E G B$ sarà una parabola, il cui asse $B A$, ed il solido quindi prodotto è il cuneo, o prisma parabolico già considerato dal Galileo.

Corollario II. Se $F B A$ (Fig. cvi.) fusse un triangolo, sarebbe $D L$ uguale ad $L M$; e però ancora il quadrato $E A$ uguaglierebbe il quadrato $L G$: sicchè la faccia verticale sarebbe un rettangolo; ed il solido quindi nato diventerebbe il cuneo triangolare già ritrovato dal Sig. Viviani prop. 48.

Corollario III. Ma quando $F B A$ (Fig. cvii.) fosse una parabola cubica, sarebbe la ragione di $F A$ a $D L$ suttriplicata della ragione di $A B$ a $B L$, o di $F A$ ad $L M$; onde quella di $D L$ ad $L M$ sarebbe duplicata di quella di $F A$ a $D L$, ma la stessa, per costruzione, deb-

h' essere duplicata di A E ad L G (dovendo corrispondere a' quadrati loro) adunque la ragione di A F a D L, sarà la stessa con quella di A E ad L G; onde ancora la curva E G B sarà una parabola cubica; ed il solido fatto da' quadrati delle sue ordinate, o il conoide generato da cotai figura nel rivoltarsi d'intorno al suo asse, come composto di cerchi nati dall'applicate, e proporzionali a' detti quadrati, sarà d'una uguale resistenza, come notò il Sig. Viviani alla prop. 53.

Corollario IV. Generalmente, se la data figura sarà qualunque dell' infinite parabole, o iperbole, le di cui ordinate y si riferiscano a qualsivoglia potestà delle porzioni tagliate dall'asse x , secondo l' universale equazione $y = x^m$ (dinotando m qualunque esponente positivo, o negativo, intiero, o rotto) La natura dell' altra curva ricercata sarà tale, che la sua ordinata z dovrà riferirsi alle potestà delle medesime x tagliate dalla cima dell' asse, l' esponente delle quali potestà sia la metà dell' eccello di 1 sopra m ; cioè, che la sua equazione sarà $z = x^{\frac{1-m}{2}}$ Di maniera che la curva cercata sarà parimente qualche specie di parabola, qualunque volta il detto esponente riesca positivo (cioè quando m è minore dell' unità, sicchè possa da essa sottrarsi) ma negli altri casi sarà qualche razza d' iperbola, rimanendo l' indice

negativo (quando non rimanga nullo, il che darebbe l'ordinate tutte uguali, come nel caso del rettangolo ritrovato nel corollario 2) col sottrarsi il numero maggiore m dalla detta unità: ciò che sempre accade, quando la data curva è un trilineo parabolico, in cui le applicate si riferiscono alle porzioni della tangente verticale.

Corollario V. Se la data curva $F D B$ fusse un quarto d'ellisse, o di circolo, ne verrebbe la curva cercata $E G B$ di tale natura, che la porzione dell'asse $B L$ al doppio di $B A$ sarebbe come il biquadrato dell'ordinata $G L$ alla somma de' biquadrati d'ambidue le $G L$, $E A$.

Problema II.

Dato il profilo verticale della curva $E C B$ (Fig. civ.), ritrovare l'altra figura, che aver debbe la base orizzontale, per ottenere lo stesso effetto.

Si faccia qualunque triangolo $B A F$; indi, come il quadrato $G L$ al quadrato $E A$, così stia la retta $L M$ intercetta nel detto triangolo, alla retta $L D$, che questa sarà una dell'ordinate alla curva, che si cerca; e nella stessa maniera si troveranno tutte l'altre: come è chiaro per lo converso della precedente costruzione. O pure, congiunta la $B E$, che sega in H l'ordinata

G L, si faccia, come il quadrato G L al rettangolo di A E in H L, così A F ad L D; e sarà similmente il punto D nella curva F D B ricercata; mercecchè questa costruzione confronta appuato con quella di sopra.

Corollario I. Quindi ancora si potrà dedurre la stessa costruzione de' solidi ritrovati dal Galileo e dal Viviani, secondo che vorrà suppersi la data figura verticale, o una parabola, o un rettangolo, o una parabola cubica, imperocchè l'altra figura orizzontale riuscirà rispettivamente un rettangolo, o un triangolo, o una simile cubica parabola.

Corollario II. Che se la figura A E G B (Fig. cviii.) fusse un triangolo, l'altra F D b sarebbe una iperbola tra gli asintoti A B b; imperocchè essendo G L uguale ad H L, sarà il quadrato G L al quadrato A E, come il quadrato L M al quadrato A F; e per tanto essendo nella stessa ragione L M, ad L D saranno L M, A F, L D continuamente proporzionali; cioè L D ad A F, come A F ad L M, o come A B a B L (o ancora come A E a G L) per la qual cosa il rettangolo D L B sarà uguale al rettangolo F A B, come richiede la natura dell' iperbola; ed oltre a ciò non solamente le sezioni del solido, che ne risulta, sarebbero d' uguale resistenza, ma sarebbero uguali di spa-

zio, per essere i rettangoli $A E F$, $L G D$ tra di loro uguali.

Corollario III. Se la data curva è un quarto di cerchio, o d'ellisse, l'altra $F D b$ (Fig. cix.) diventa una iperbola toccata in F dalla retta $F B$, di cui un asintoto sarebbe la retta $A B$, l'altro sarebbe $K I$ perpendicolare ad $A B$ nella distanza $A I$ uguale ad $A B$, sicchè il centro d'essa sarebbe oltre il punto A nella $B A$ altrettanto prolungata.

Corollario IV. Se fusse la proposta curva (Fig. cx.) $E G B$ una iperbola, con la cima in B , e l'asse $B A$, ancora la curva $F D b$ sarebbe iperbola, di cui un asintoto $A B$, l'altro $I K$ distante dal punto B per tutta la quantità del lato trasverso della detta iperbola $E G B$. Di maniera che il centro I di questa nuova curva $F D b$ caderebbe nella cima dell'iperbola opposta alla data $E G B$.

Corollario V. Se finalmente la data curva $E G B$ sarà qualunque dell'infinite parabole, o iperbole riferite all'asintoto, ancora la curva, che si cerca sarà iperbolica, o parabolica, come nel simile corollario 4. della precedente si è veduto.

Problema III.

Data la figura orizzontale $A F b B$ (Fig. civ.) d'una trave da appoggiarsi a due sostegni ne' suoi termini $A B$: ritrovare la figura verticale $A E G B$, che combinata coll'altra, faccia un solido ugualmente resistente da per tutto, dovunque si ponga un dato peso, che lo aggravi ne' punti di mezzo a' suoi estremi.

Si faccia, come la $D L$ a qualunque data $A F$, così il rettangolo $A L B$ al quadrato $L G$. Sarà il punto G nella curva che si cerca, la quale soddisfarà al quesito. Imperocchè il prodotto degli estremi, cioè del quadrato $L G$ nella $D L$ (il quale prodotto è proporzionale al momento di resistenza nella sezione $L D G$, per essere in ragione composta del quadrato dell'altezza $L G$, e della base $L D$) uguaglierà il prodotto de' mezzani, cioè della costante $A F$ nel rettangolo $A L B$ (il quale secondo il Galileo è proporzionale al momento d'un dato peso espresso per la costante $A F$, ed applicato nel punto L al vette $A B$) adunque il peso precisamente bastante a spezzare il solido in una di dette sezioni, è bastante altresì a romperlo in qualunque altra dovunque resti applicato; e non potendo vincere la resistenza d'una

di tali sezioni, nè meno sarebbe abile a vincerne verun'altra. Il che ec.

Corollario I. Se la base $A F b B$ (Fig. cxI.) sarà rettangola, averà qualunque ordinata $L D$ la stessa ragione alla costante $A F$; onde il rettangolo $A L B$ al quadrato $L G$ avrà altresì una medesima data ragione; e però la figura verticale $A G B$ sarà un circolo, o un'ellisse, sicchè quindi ne nascerà il prisma semicircolare, o semiellittico trovato prima dal Viviani nella prop. 106. e poi dal Blondello, e dal Marchetti, e quindi da altri moderni osservato.

Corollario II. E se la data curva orizzontale fusse una parabola $A D B$ (Fig. cxII.) descritta sopra la base $A B$, essendo l'applicate $D L$ parallele all'asse, proporzionali a' rettangoli $A L B$, sarà la ragione della $D L$ alla costante $A F$, uguale alla ragione del rettangolo $A L B$ ad un costante quadrato $G L$; sicchè la figura verticale $A E C B$ sarà un rettangolo d'una data altezza; e però il solido quindi generato, sarà il prisma parabolico dal Sig. Viviani nella prop. 95. e poscia dal Blondello, e da altri moderni avvertito.

Corollario III. Se $A D B$ (Fig. cxIII.) fusse una ellisse di tal natura, che il cubo dell'ordinata $D L$ fusse proporzionale al rettangolo delle parti del diametro $A L B$, o uguale al solido, che avesse per base il detto rettangolo, e per altezza la costante

A F, come suo lato retto: allora sarebbe L D ad A F, come il rettangolo A L B al quadrato L D; ma per costruzione è altresì il rettangolo A L B al quadrato L G, nella stessa ragione di L D ad A F; dunque il quadrato L G sarebbe uguale ad L D; e però la curva verticale A G B sarebbe la stessa di specie, e di numero, colla data orizzontale A D B, onde il solido quindi nato avrebbe nelle sue sezioni tanti quadrati dell'ordinate L D; e conseguentemente, girando la detta ellisse cubica A D B intorno l'asse A B, produrrebbe un solido rotondo, le cui sezioni essendo i cerchi fatti dall'applicate L D proporzionali a' suddetti quadrati, si avrebbe una sferoide d'uguale resistenza, come osservò, prima d'ogn' altro, il Sig. Viviani alla proposizione 98.

Corollario IV. Se la data figura orizzontale fusse il triangolo A F B, (Fig. cxiv.) la verticale sarebbe una parabola A b descritta coll'asse A B; imperocchè L D ad A F è come B L ad A B, ovvero come il rettangolo A L B al rettangolo L A B; e nella stessa ragione dovendo essere il rettangolo A L B al quadrato L G, sarà questo uguale al rettangolo L A B; di maniera che B A sarebbe il lato retto di questa parabola A G b. Onde si ha un'altra nuova specie di solido parabolico d'uguale resistenza, ancora quando è sostepu-

to da ambi' gli estremi: e si potrebbe ancora utilmente adattare a maniera di cupola, retta sopra un pilastro di mezzo sottoposto al centro B, ed intorno in tutto il suo giro appoggiata ne' lati d' un poligono Ff , che facessero il recinto d' un edificio rotondo.

Corollario V. Generalmente, se la curva orizzontale sarà qualunque dell' infinite parabole, o iperbole riferite all' asintoto AB, di maniera che l' ordinate di essa corrispondano alle potestà delle porzioni dell' asse, indicate dall' esponente m , sempre la verticale figura sarà una specie di ellisse, in cui i quadrati dell' ordinate sieno, come il prodotto da un segmento del diametro nella potestà del residuo, indicata dall' eccesso dell' unità sopra l' esponente m ; cioè da $1 - m$.

Problema IV.

Data la curva verticale A E G B, (Fig. civ.) ritrovare viceversa l' orizzontale A F D B atta al medesimo effetto.

Si faccia, come il quadrato dell' ordinata G L al rettangolo de' segmenti della base A L B, così una retta costante A F, scelta ad arbitrio, all' ordinata L D. Sarà il punto D nella curva, che si cerca; co-

me è manifesto per la costruzione della precedente.

Corollario I. Facil cosa è il dedurre ancora di qui gli stessi solidi d'eguale resistenza determinati dal Viviani, e dagli altri, e da noi nella precedente; perchè supponendo essere la curva verticale un semicircolo, o semiellisse, si ha subito nell'orizzontale il rettangolo: e supponendo ivi il rettangolo, qui si ha la parabola ordinaria descritta sopra la base AB ; e se ivi si ha l'ellisse cubica, qui nasce la stessa specie di figura; e se ivi si mette la parabola adiacente all'asse AB , qui nasce il triangolo ec.

Corollario II. Se la data EGB (Fig. cxv.) fusse un triangolo, l'altra $FADb$ sarebbe una iperbola, il cui asintoto sarebbe la retta CB , ed essa curva passerebbe per lo punto A , ed il centro C sarebbe sopra il punto B d'un intervallo dato BC , quarto proporzionale dopo i quadrati AE , AB , e la retta AF .

Corollario III. Ma essendo EGB qualunque dell'infinite parabole, o iperbole, in cui le potestà dell'ordinate, che hanno per esponente il numero m sieno proporzionali alle parti dell'asse tagliate dalla cima B , sarà la curva orizzontale ricercata una tale specie d'ellisse, le di cui ordinate sieno come i prodotti dall'una delle parti dell'asse nella potestà della rima-

nente, indicata dall' eccesso dell' unità sopra il duplo di m , cioè da $1 - 2m$.

Problema V.

Se ad una trave, che sporga in fuori da una parte, si dovesse soprapporre qualche solido prismatico, o cilindrico, o vi si dovesse alzare sopra una parete d' uguale grossezza, ed altezza da per tutto; ritrovare infinite figure, secondo le quali segando la detta trave, riesca in qualunque suo punto egualmente gagliarda, e forte; per reggere il peso soprapposto.

Si proponga ad arbitrio l' una, o l' altra delle due figure $E D B$ (Fig. civ.) orizzontale, ovvero $E G B$ verticale, che per trovare l' altra basta discorrere così. I momenti de' pesi delle grandezze prismatiche, corrispondenti alle lunghezze $A B$, $L B$; sono per la prop. 3. del Galileo (o per la 20. del Viviani, o per lo corollario della prop. 103. del medesimo) come i quadrati di tali lunghezze. Bisogna dunque, che ancora i momenti delle resistenze nelle varie sezioni d' un solido, i quali sono come il prodotto della base nel quadrato dell' altezza, sieno proporzionali a' quadrati delle lunghezze. Si faccia pertanto, come il quadrato dell' ordinata verticale $G L$ al quadrato della porzione dell' asse $L B$,

così una retta costante $A F$ ad $L D$: che questa sarà la corrispondente ordinata nella figura orizzontale. O pure viceversa, come $L D$ ad $A F$, così stia il quadrato di $B L$ al quadrato di $L G$, che sarà questa l'ordinata nella figura verticale. Imperocchè il prodotto della base $L D$ nel quadrato dell'altezza $L G$ sarà in vigore di questa costruzione uguale al prodotto della costante $A F$ nel quadrato di $L B$; e però sarà proporzionale al detto quadrato: onde essendo i momenti delle resistenze proporzionali a' momenti de' pesi sovrapposti; se tutto il peso non romperà tutto il solido nella sezione $E A F$ impegnata nel muro; nè meno la porzione del peso corrispondente alla sola lunghezza $L B$, sarà abile a romperlo nella sezione $G L D$; che però tutto il solido sarà in questo senso da per tutto ugualmente resistente. Il che ec.

Corollario I. Se $A F D B$ (Fig. cxvi.) sarà un rettangolo, sarà $A E G B$ un triangolo, onde ne nascerà il prisma triangolare, proposto già per tale effetto dal Sig. Leibnizio negli atti di Lipsia del 1684, e da Monsù Varignon nelle memorie dell'Accademia di Parigi del 1702. art. 17. essendo il quadrato $L D$ uguale, o in una data ragione, al quadrato de' arbitraria $A F$, e però ancora il quadrato $B L$, riuscendo uguale, o in una costante ragione, al quadrato $L G$.

Corollario II. Ma se sarà $A E C B$

(Fig. cxvii.) un rettangolo, ne verrà AF DB un trilineo parabolico adiacente alla tangente verticale AB ; e raddoppiando la figura $AFDB$ d'intorno la retta BA , si averà un cuneo parabolico assai vago, ed opportuno all'effetto bramato:

Corollario III. Se la figura orizzontale sarà un triangolo AFB , (Fig. cxviii.) la verticale sarà una parabola d'intorno l'asse AB , onde ne nasce il solido $AH B$, quale si dimostra nella figura.

Corollario IV. Se la verticale sarà un quadro di cerchio, o di ellisse EGB (Fig. cxix.) l'orizzontale $BD F$ diventa una iperbola, il di cui asintoto NE parallelo ad AB , ma distante da esso per un dato intervallo, uguale alla costante AF .

Corollario V. Se l'una, e l'altra di queste figure sarà una parabola cubica, (Fig. cxx.) del secondo ordine, in cui i cubi dall'ordinate corrispondono a' quadrati delle porzioni dell'asse, ancora l'altra sarà della stessa natura; di maniera che un solido fatto da' quadrati di cotale parabola, o piuttosto un solido rotondo fatto da' cerchi, generati dall'ordinate nel rivolgersi la figura d'intorno al suo asse, (tagliandolo per mezzo, per ispianarne il dosso di sopra, ad effetto di adattarvi il peso da soprapporvi) sarà di uguale resistenza, come mostra la figura.

Corollario VI. Generalmente se la curva orizzontale sarà alcuna delle parabole,

o iperbole infinite, le cui ordinate siano, come le potestà denominate da m appartenenti alle porzioni dell'asse; la curva verticale avrà i quadrati dell'ordinate proporzionali alle potestà indicate dall'eccesso di 2 sopra m , cioè da $2-m$, e considerate nelle porzioni dell'asse.

Corollario VII. Ma quando la figura verticale fosse una di cotali curve paraboliche, o iperboliche, in cui l'ordinate corrispondessero alle potestà dell'asse denominate da m ; l'ordinate nella curva orizzontale corrisponderebbero alle potestà delle porzioni dell'asse, denominate dall'eccesso di 2 sopra il doppio di m , cioè da $2-2m$.

Problema VI.

Ritrovare infiniti solidi, i quali essendo in uno de' suoi termini impegnati nel muro, siano d'uguale resistenza in riguardo del proprio peso di essi.

Si prenda per curva verticale il trilineo parabolico, che serve di compimento all'ordinaria parabola, cioè le di cui ordinate si applicano alla tangente della cima: e per la figura orizzontale si pigli un rettangolo, o pure un triangolo, o ancora qualsivoglia dell'infinite parabole, che abbiano la medesima cima, e le di cui ordi-

nate siano come le potestà delle porzioni dell' asse, denominate da qualunque numero m . Dico, che il solido risultante dall'una, e dall'altra delle dette figure sarà tale, che in riguardo al proprio suo peso, sarà da per tutto d'una eguale resistenza: di maniera che, se tutto non potrà rompersi nella sezione aderente al muro, nè meno veruna porzione, in vigore del proprio peso, potrà staccarsi da qualunque sezione parallela al muro, quando pure in essa fusse il solido sostenuto. Imperocchè cotali solidi sempre saranno al solido prismatico circoscritto nella stessa ragione (qualunque porzione d'essa voglia considerarsi) cioè in quella di 1 ad $m + 3$; e la distanza del centro di gravità di questi solidi, e di ciascuna porzione loro, dalla base, è sempre proporzionale alla lunghezza dell' asse in proporzione di $m + 2$ a' $2m + 5$ (se non che nel caso del rettangolo orizzontale, essendo $m = 0$, la ragione di 1 ad $m + 3$ rimane solamente di 1 a 3, e da quella di $m + 2$ a' $2m + 5$, resta di 2 a 5.) E per tanto il momento di qualunque porzione d'un tale solido sarà sempre come il prodotto $y \times x \times x$ (esprimendo y l'altezza verticale della sezione, z la sua base, e x la porzione dell' asse) imperocchè il peso del solido è proporzionale al prisma circoscritto $y \times z \times x$, e la distanza del centro di gravità dal sostegno di nuovo è proporzionata ad x . Ma

il momento della resistenza di qualsivoglia sezione è proporzionale al prodotto del quadrato dell' altezza nella sua base, cioè a' $y y x$; ed è y proporzionale ad $x x$, per essere la verticale figura un trilineo parabolico, onde $y y z$ è eguale a' $y z x x$; adunque il momento del peso di qualunque porzione di cotal solido, stesa oltre la sua base, è proporzionale al momento di resistenza della base medesima; e però ugualmente da per tutto è gagliardo il solido in riguarda del proprio peso; il che ec.

Corollario I. Se la figura orizzontale sarà il rettangolo, nè verrà un cuneo parabolico, quale fu considerato nella prop. 55. proposto ancora dal Leibnizio, e dal Varignon ne' luoghi citati.

Corollario II. Se l' esponente m è uguale a' 2 la figura orizzontale riesce un altro uguale trilineo parabolico: sicchè il solido fatto dall' applicate di questo spazio, e però ancora la tromba parabolica, nata dal avvolgimento dello stesso trilineo intorno la tangente verticale, di cui parlano i suddetti Autori, e da noi fu trattato nella prop. 57. del Sig. Viviani, sarà di uguale resistenza, essendo composta da' cerchi generati dall' applicate, proporzionali a' detti quadrati.

Corollario III. In luogo dell' infinite parabole, si potrebbero a tale proposito adattare infinite iperbole, paragonando i solidi, che quindi nascono, a' prismi iscrit-

ti, in vece de' circoscritti; militando in questi ugualmente; che in quelli, la ragione medesima.

Corollario IV. Un altro prisma d'uguale resistenza, e d'una data altezza, si potrebbe assegnare, che avesse per base lo spazio logaritmico, imperocchè essendo gli spazj tra la curva logaritmica, ed il suo asintoto interposti, tra di loro, come l'ordinate (per ciò, che dimostrai negli Ugeniani capo 3. n. 7.) ed essendo i centri di gravità d'essi spazj, sempre distanti dalla base per lo stesso intervallo della subtangente (come ivi dimostrai cap. 11. n. 1.) i momenti de' pesi ne' prismi, eretti ad una data altezza sopra di essi spazj, e sostenuti sopra qualunque loro ordinata, saranno come le stesse ordinate; ma ancora i momenti delle resistenze nelle sezioni della medesima altezza sono come le basi (per la prop. 2.) cioè, come le dette ordinate; saranno adunque proporzionali i momenti de' pesi, a' momenti delle resistenze; onde cotali prismi riusciranno d'uguale resistenza, come già si è avvertito alla pag. 58. del Sig. Viviani.

Problema VII.

Ad una data lunghezza $A L$ (Fig. cx_{11} .) applicare infiniti solidi prismatici, o cilindrici, i quali in riguardo allo stesso peso pendente da un termine di essi (quando nell'altro solamente siano sostenuti i solidi) o pure applicato nel mezzo della lunghezza loro (in caso che si appoggino a' sostegni posti in ambi gli estremi) abbiano una resistenza uguale a quella di un dato prisma, o cilindro, la di cui lunghezza sia $A E$, l'altezza $A F$, e la lunghezza $F G$.

Si faccia, come $A E$ ad $A L$, così $F G$ ad $F D$; e per lo punto D , fra gli asintoti $E A F$, s'intenda descritta l'iperbola quadratica $D C$, in cui l'ordinate $F D$, $B C$ siano reciprocamente, come i quadrati delle $B A$, $F A$; di maniera che il prodotto del quadrato $B A$ nell'altezza $B C$ uguagli sempre le stesso prodotto del quadrato $A F$ nell'altezza $F D$. Dico, che qualsivoglia prisma dell'altezza arbitraria $B A$, e della corrispondente lunghezza $B C$, colla data lunghezza $A L$, soddisfarà al quesito; imperocchè essendo come $A E$ ad $A L$, cioè come il momento d'un peso pendente dalla lunghezza $A E$ al momento dello stesso pendente dalla lunghezza $A L$, così

FG ad F D: ovvero così il prodotto di FG nel quadrato AF al prodotto di FD nel medesimo quadrato AF; cioè come il momento di resistenza della sezione AFG risultante nel dato prisma al momento di resistenza nella sezione AFD; è manifesto, che il momento di resistenza del dato prisma al momento di resistenza di un altro, la cui altezza AF larghezza FD, lunghezza AL, sarà come il momento del peso pendente dal primo prisma al momento dello stesso pendente dal secondo; e per tanto la resistenza di questo sarà uguale alla resistenza di quello. Ma essendo uguali i prodotti di FG nel quadrato AF, e di CB nel quadrato AB, sarà lo stesso il momento di resistenza nella sezione del prisma contenuto dalle rette AL, BA, BC, che dell'altro compreso dalla stessa lunghezza AL, dall'altezza AF, e dalla larghezza FD; adunque qualsivoglia de' sopradetti prismi sarà d'uguale resistenza col prisma proposto, e sarà applicato alla medesima data lunghezza AL; il che ec.

Problema VIII.

Ritrovare infiniti solidi prismatici d'una data lunghezza, i quali a riguardo del proprio peso sieno della medesima resistenza, o si reggano sopra un sostegno solo

corrispondente ad uno de' suoi termini, o siano in ambi gli estremi sostenuti.

Si descriva coll'asse AB (Fig. cxxi.) la parabola AH nell'antecedente figura. Dico, qualunque prisma della lunghezza IB , e dell'altezza BA , colla data larghezza, soddisfare al quesito. Imperocchè essendo AB ad AF (ovvero moltiplicando l'una e l'altra per BAF , il prodotto del quadrato AB in AF al prodotto del quadrato AF in AB) come il quadrato BI al quadrato FH : sarà il prodotto de' quadrati AF , BI , e della retta AB ; e però il quadrato AB al quadrato di AF (cioè, per la comune larghezza de' prismi, il momento di resistenza nella sezione dell'altezza AB , al momento di quella, che avesse per altezza AF , per la proposizione 3. del Viviani) sarà, come il prodotto del quadrato della lunghezza IB nell'altezza AB , al prodotto del quadrato della lunghezza HF nell'altezza AF , cioè (per la medesima larghezza di ciascun prisma) come il momento del peso del prisma, a cui nella lunghezza IB serva di altezza la AB , al momento del peso d'un prisma, la cui lunghezza fusse HF , e l'altezza AF , in pari larghezza d'ambidue; onde nell'uno, e nell'altro sarà la stessa resistenza in riguardo del proprio peso; il che ec.

Corollario. Quindi l'ungula solida parabolica, tagliata dal cilindro eretto sopra la parabola AIB (Fig. cxxii.) raddoppia-

ta all'altra parte dell'asse AB , col piano PGA , che passando per la cima A della parabola, fosse inclinato a qualsivoglia angolo colla base: sarebbe un solido in qualunque sua parte ugualmente resistente, in riguardo del proprio suo peso: o fosse sostenuto sopra la linea AB , o fosse retto da' sostegni sottoposti d'intorno al suo perimetro $IHA b i$. Imperocchè dividendo il diametro AB in quante si voglia parti, e per ogni punto della divisione alzando tanti piani cretti alla base sopra tutte l'ordinate della parabola; ne risulterebbero altrettanti prismi iscritti a quest'ungula, tutti (per le cose ora dimostrate) d'eguale resistenza in riguardo al proprio peso; i quali prismi esaurirebbero tutta la solidità della detta ungula (accrescendo in infinito il numero d'essi, e scemandone in infinito altresì la larghezza) onde lo stesso effetto produrrebbe la medesima ungula intera, in cui verrebbero a terminare: e sarebbe cotesto solido ungulare uguale a $\frac{3}{5}$ quinti dell'intero prisma ugualmente alto eretto sopra la parabola stessa, per le cose da me dimostrate nello scolio della proposizione 28. de' problemi Vivianiani.

Si potrebbero qui aggiugnere due altri problemi della stessa natura de' precedenti, assai eleganti, ed adattati ad illustrare vie più questa stessa materia delle resistenze, proposti già nel tomo 15. del

Giornale Veneto articolo quarto. Ma potendosi agevolmente ivi vedere la soluzione data ad essi da me, e dal Sig. Giulio Fagnani, stimo bene di porre una volta termine ed alla fatica mia, ed al tedio de' Lettori, dando a questa operetta il bramato fine.



INDICE

Di ciò che si contiene
in questo Volume.




G <i>Giornata IV. Dialogo IV. De Motu projectorum.</i>	pag. 5
<i>Appendix, in qua continentur Theoremata, eorumque demonstrationes, quae a Galileo circa centrum gravitatis solidorum olim conscripta fuerunt.</i>	83
<i>Principio della V. Giornata del Galileo.</i>	117
<i>Giornata VI. del Galileo Della forza della Percossa.</i>	147
<i>Galileo Galilei Vol. IX.</i>	27

<u>Trattato delle resistenze principiato da Vincenzio Viviani per illustrar l' Opere del Galileo , e ora compiuto e riordinato , coll' aggiunta di quelle dimostrazioni , che vi mancavano dal P. D. Guido Grandi Abate Camaldolese.</u>	pag. 192
<u>Appendice del suddetto P. D. Guido Grandi intorno al Trattato delle resistenze.</u>	388


Fine del Volume Nono.

41492


		ERRORI	CORREZIONI
P. 88	l. 20	eum	cum
	27	ed	et
107	8	<i>hahentibus</i>	<i>habentibus</i>
174	6	perternatu-rale	preternatu-rale
205	15	dell'	dell'
215	8	viene	viene
337	13	mentro	mentre




F. 7.



F. 12.



F. 13.



F. 18.





Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 25.









Fig. 31.









F. 69.




F. 71.




F. 76.



F. 83.





F. 88.






25.


F. 96.




F. 103.




F. 111.



F. 112.



F. 119.



F. 120.

